CALENDARIO DE AGRICULTURA BIOLOGICO DINAMICA 1996

MARIA THUN Y MATTHIAS K. THUN

Días de siembra y recolección
Constelaciones
Fases lunares
Apicultura

EDITORIAL RUDOLF STEINER

"Girasoles" de Walter Thun

INDICE

Girasol – acuarela de Walter Thun	2
Girasoles	4
Girasol maduro en otoño. Pintura al óleo de Walter Thun	5
Estrella de Venus y roseta de Venus	6
Sobre nuestro trabajo con frutos oleaginosos	7
La Calabaza oleaginosa	8
Experimentos de constelaciones con trigo en 1994/95	10
El año 1995/96	10
La Luna Sideral	13
El zodiaco y los trígonos	14
Clasificación de las plantas para siembra y cosecha	15
Instrucciones sobre el calendario	18
Periodos desfavorables	19
La apicultura	20
Experimentos con patatas aplicando infusiones en 1994	21
Experimentos con rabanitos en constelaciones de 1995	23
Época de plantación	24
Análisis	25
Experimentos con tomates	25
La viticultura	26
Comparaciones de fechas de plantación y de conservación de cebollas en 1994/95	27
Enero	31
Comentarios a enero - La elaboración de la leche	32
Febrero	33
Comentarios a febrero - El abono y el suelo	34
Marzo	35
Comentarios a marzo – Fechas favorable para la recolección de las plantas utilizadas en la elaboración de los preparados	36
Abril	37
Comentarios a abril – El corte de césped	38
Mayo	39
Comentarios a mayo – Hongos en la planta	40
Junio	41
Comentarios a junio - Parásitos	42
Julio	43
Comentarios a julio. La alimentación invernal de las abejas	44
Agosto	45
Comentarios a agosto. Recolección y conservación	46
Septiembre	47
Comentarios a septiembre - Compost de malas hierbas	48
Octubre	49
Comentarios a octubre – La elaboración del pan	50
Noviembre	51
Comentarios a noviembre - La invasión de pulgones	52
Diciembre	53
Comentarios a diciembre – Fechas para talar árboles	54

Girasoles

Es el verano del año 1949. Hay una abundancia de sol y de calor como apenas se conoce en nuestras latitudes centroeuropeas. Los mayores cuentan: "Así fue el verano de 1911", o sea algo extraordinario.

En la orilla del río Lahn hay un girasol con una flor gigantesca y radiante. El corazón del pintor se desborda de alegría y pronto está plasmado en un lienzo.

A la hija de cuatro años se le permite mirar cuando el padre pinta. Ella quiere tener también estos girasoles. En el jardín puede sembrar un bancal de girasoles. Diariamente visita el bancal y finalmente, al cabo de diez días, ellos se abren camino por la tierra y salen. La alegría es grande. Pero ahora hay que esperar mucho tiempo hasta que florezcan. La impaciencia infantil es grande pero entonces le viene la idea salvadora: "Padre, préstame tu cuadro de girasoles. No hace falta que me lo regales, sólo préstamelo. Quiero ponerlo en mi jardín para que mis girasoles sepan cómo han de ser".

Pasan muchos años. Llega el otoño. Una vez más el pintor está sentado frente a un girasol y le entrega enteramente su corazón. En medio de esta experiencia se le acerca un claro espíritu del mundo y le aguza al pintor la visión de un ser del ámbito de los espíritus naturales, que está tratando cariñosamente de ayudar al girasol que está envejeciendo en desarrollar bien las semillas.

En el girasol juvenil el pintor había descubierto la estrella pentagonal, el signo de la diosa Venus. Una vez caídas las flores, vuelven a manifestarse movimientos cósmicos en la distribución de las semillas.

"Girasol maduro en otoño" de Walter Thun

Ligando gráficamente los puntos inferiores de la conjunción de Venus con el Sol aparece la siguiente estrella pentagonal. Los puntos se siguen moviendo lentamente. Una revolución dura ocho años. En cien años su posición varía solamente 30º.

Siguiendo la línea de movimientos de Venus, que se ha formado cuando termina su danza alrededor del Sol en un ritmo de ocho años, nos encontramos con la roseta de cinco bucles que se refleja en el orden de las semillas en la flor del girasol.

Así han quedado grabados completamente los ritmos de Venus en la formación del rostro del girasol.



SOBRE NUESTRO TRABAJO CON PLANTAS OLEAGINOSAS

Desde hace treinta años realizamos experimentos con girasoles y otras semillas oleaginosas. Partíamos de agricultores que cultivaban girasoles al sur de los Alpes y que preguntaban por el día más favorable de la siembra para alcanzar el rendimiento más alto en sus semillas. Realizamos muchísimas comparaciones entre fechas de siembra, y quedó demostrado sin dejar lugar a dudas que el mejor período son los días-fruto.

Surgieron otras preguntas referentes a las fechas de cava y la aplicación del Preparado de Sílice. En los experimentos Zodiacales se realizaron las cavas y la aplicación del Sílice bajo un ritmo de trígono en los correspondientes días de siembra excepto en los testigos. Sin embargo, no siempre el rendimiento más alto de semillas tenía también el mayor contenido de aceite. Así se tenían que diseñar de nuevo los experimentos para que se aclarasen estas nuevas preguntas.

Para este fin se seleccionaron mayores superficies con el mismo cultivo anterior y allí fueron sembradas uniformemente en el mismo día semillas de una misma procedencia.



Después de brotar se repartieron las superficies en parcelas. Tomamos cuatro parcelas exclusivamente para las cavas, cuatro parcelas en las que se aplicaba adicionalmente el Preparado de Sílice y otras cuatro como testigos. Todo esto se repitió tres veces.

Estos experimentos debían esclarecer la importancia de los trabajos que se realizan en el suelo de acuerdo con los ritmos cósmicos así como la fecha de aplicación del Preparado de Sílice, particularmente de cara a los contenidos de aceite en las semillas de diferentes plantas oleaginosas.

Ya muchos años antes comparaciones con el Preparado de sílice en la menta y en la melisa habían demostrado que las aplicaciones en días-flor proporcionan el contenido más alto de aceite esencial en las hojas. Ahora trabajamos con la colza, la mostaza, el rábano oleaginoso, el rabanito, la adormidera, el lino, el cardo oleaginoso, el girasol y la calabaza oleaginosa.

Comprobamos si las cavas en días-raíz, días-hoja, días-flor o días-fruto tenían, aparte de la influencia sobre el rendimiento de la semilla, también un efecto sobre la formación de aceite. La misma pregunta se hizo en la aplicación adicional del Preparado de Sílice.

Estos fueron los resultados en las cavas y aplicaciones de preparados. En comparación con los testigos se podía observar en los días-hoja un ligero aumento del contenido de

aceite. Otro aumento fue debido a los impulsos de los días-fruto.

El impulso de días-raíz hizo que el contenido del aceite bajara en la mayoría de los casos por debajo del contenido de los testigos o que estuviera muy cerca de ellos.

En los tratamientos realizados en días-flor notábamos una mayor formación de aceite en las semillas. Como entonces aún no podíamos efectuar análisis cualitativos, realizamos comparaciones de conservación probándolos al cabo de diez años.

En el análisis de sabor de los aceites procedentes de cavas, y aplicaciones de sílice en días-hoja o en días-raíz daban un olor desagradable y sabían totalmente a rancio. En los tratamientos en días-fruto tenían un olor neutro y el sabor de tal manera que ya no se podría haber vendido. Los aceites procedentes de fechas de cavas y rociados en días-flor olían como recién prensados, eran aromáticos y tenían buen sabor. Puesto que de estos tratamientos habíamos obtenido también el mayor rendimiento de aceite, recomendamos estos días para el cuidado de las plantas oleaginosas mientras que para las siembras siguen siendo más favorables los días-fruto.

Todo esto es igualmente válido para los girasoles.

El pintor Walter Thun mezclaba él mismo muchas de sus pinturas al óleo y estaba entusiasmado de nuestro trabajo con las semillas oleaginosas. Como daba mucha importancia a la resistencia a la acción de la luz para sus pinturas utilizaba aceites de nuestros diferentes tratamientos para sus mezclas. Las pintaba sobre tablillas y las colocaba durante semanas en la parte sur de nuestro tejado. Los resultados eran sorprendentes. Las pinturas de aceites de días-hoja o días-raíz habían perdido su color, las de días-fruto se habían oscurecido y las de días-flor eran de colores fuertes sin ninguna variación. De ahí en adelante utilizó nuestros propios aceites de días-flor para sus pinturas. Habíamos planeado algunos otros experimentos de este tipo pero desgraciadamente el tiempo de que dispuso fue muy limitado.

EXPERIMENTOS DE CONSTELACION CON TRIGO

En otoño del año 1993 se habían cultivado en el campo experimental "Heckacker" diez tipos de trigo que debían ser analizados como comparaciones de diferentes tipos. Fueron cosechados en verano del 1994 durante doce diferentes constelaciones planetarias y posiciones de la Luna. Durante muchos años el mejor periodo para la cosecha de cereales había sido siempre con la posición Luna frente a Leo. Esta comparación de cosecha debía comprobar qué períodos de cosecha eran similares o iguales a los días de Leo. En Octubre se sembraron los diez tipos en el mismo día y bajo las mismas condiciones en el campo experimental de "Thalacker". Cada tipo disponía de 150 m^2. Antes de sembrar se aplicó dos veces el Preparado de Sílice. Desgraciadamente no se han comprobado aún todos los factores como por ejemplo el peso de mil granos etc. y aún no se han efectuado comparaciones de cocción. En cuanto a los rendimientos no se acerca ninguna otra constelación a los días de cosecha en Leo. Los pesos más bajos coincidieron en los diez tipos en un día de cosecha el año pasado durante un eclipse de Marte. Estos periodos desfavorables están tachados en el Calendario y se deberían evitar tanto para la cosecha como para la siembra. Los resultados globales confirmaban las recomendaciones dadas en este Calendario de Agricultura biológico-dinámica.

EL AÑO 1995/96

En el "Calendario 1995" habíamos insinuado que en los periodos en los que Júpiter está en retrogradación frente a la constelación Escorpio, en la formación del tiempo se podían encontrar situaciones parecidas y en los cuatro meses de cada retrogradación se podía observar una tendencia a precipitaciones casi diarias.
Hemos comparado ahora los años 1959, 1971 y 1983 con el año 1995 y hemos encontrado muchas más similitudes de las que habíamos supuesto el año pasado. Para la retrogradación, en la oposición al Sol hasta su circunvalación por la derecha, Júpiter necesita cuatro meses.

Lo que es idéntico en todos los años nombrados son las tormentas con fuertes lluvias que empiezan ya en Marzo y las heladas nocturnas que hay aún en Abril, Mayo y Junio. Además trajo precipitaciones el paso de Júpiter por el Meridiano. Luego hay días singulares con temperaturas muy altas, a veces de hasta 39ºC, que provocan temporales con grandes inundaciones. En otras regiones de Europa se dan zonas secas con malas cosechas en la agricultura. A veces las zonas de inundaciones y las zonas secas están separadas nada más 300 o 400 km. Generalmente en las zonas secas empieza a haber precipitaciones alrededor del 20 al 22 de Agosto. Estos enormes extremos los encontramos sobre todo en los años en los que Júpiter pasa frente a la constelación de Escorpio.

Ahora tenemos mucha curiosidad por saber qué sorpresas nos depara Junio de 1996. El 6 de Junio, el día de Corpus Cristi, está en nodo con la eclíptica. El 8 de Junio Venus pasa por el nodo descendente y el 20 de Junio Marte atraviesa el nodo ascendente. En los planetas rápidos el efecto del nodo cesa al cabo de uno o dos días, mientras que Marte necesita aproximadamente tres días hasta que se haya dejado todo atrás. Júpiter, que es mucho más lento, necesita unas seis semanas hasta que se haya alejado de la zona de actuación del nodo. En su última posición de nodo ascendente en Febrero de 1990 causó pánico entre los propietarios forestales de Europa. Los ciclones arrancaron árboles de cien años en los bosques o los rompieron como cerillas a alturas de uno o dos metros. Levantaron tejados y destruyeron casas como si fueran de juguete. ¿Causará también tantos desastres cuando pase por el nodo ascendente?

Pero tal vez suceda en otra región de la Tierra y nos interese menos.

¿Quién en Europa se pregunta por los miles de personas que han muerto en las inundaciones de los doce meses pasados? Desde que existen sustancias que rebajan la tensión superficial del agua de fregar, el agua ha perdido sus fuerzas formativas. Estas sustancias suben con el agua a mayores altitudes. Desde entonces echamos de menos el fenómeno de la lluvia continua y ya solamente conocemos

inundaciones porque la gota ha perdido su propia solidez, su forma. Si encima se dan constelaciones cósmicas que favorecen estas precipitaciones nos enfrentamos a las grandes catástrofes.

Pero éstas no son las únicas constelaciones del año 1996. En las hojas de los meses hemos mirado sobre todo los aspectos de los planetas más cercanos y todos los planetas tienen también sus lados agradables. Normalmente nos alegran con el verano para hacer vacaciones y con el invierno para los aficionados a esquiar o con otros acontecimientos agradables en la naturaleza. A los lectores del "Calendario" les interesan además cuestiones de la agricultura y del cuidado de los animales. Júpiter se mueve en el año 1996 frente a Sagitario y transmite desde allí fuerzas de fertilidad para el crecimiento de las plantas. Cuando otros planetas se sitúen frente a Géminis estarán en oposición con Júpiter y estos días serán muy favorables para las siembras de fanerógamas y plantas fructíferas. Saturno se encontrará todo el año frente a Piscis y entrará en oposición con todos los planetas que pasen por la constelación de Virgo. Urano está frente a Capricornio. Neptuno frente a Sagitario y Plutón frente a Escorpio. Este año Mercurio se sitúa ya el 7 de Abril frente a Sagitario y Plutón frente a Escorpio. Este año Mercurio se sitúa ya el 7 de Abril frente a Aries lo cual nos da esperanzas de una primavera algo más temprana.

En julio tenemos seis oposiciones planetarias. Esto significa que las fuerzas de seis pares de planetas impregnan las capas de la Tierra y la penetran. Durante este proceso impulsan el crecimiento de las plantas. Estimulan lo "sanguíneo" en la naturaleza mientras que las acumulaciones de conjunciones provocan la melancolía porque las fuerzas de los planetas más cercanos no dejan pasar las de los más lejanos.

Los trígonos de planetas transmiten únicamente efectos de Zodíaco. Utilizan en última instancia los elementos que transmite la Luna. En estos casos, en el Calendario se recomienda otro órgano vegetal diferente al que impulsaría la Luna. Por consiguiente, esto no son erratas sino hechos cósmicos reales.

Se sobreentiende que este tipo de recomendaciones se puede dar solamente después de 43 años de experimentos como los llevamos nosotros. Muchas recomendaciones que hoy día se dan en "Calendarios Lunares" carecen de cualquier base experimental. Por este motivo rogamos que el lector no se dirija a nosotros por otras recomendaciones. Nosotros solamente recomendamos lo que se ha confirmado en largos años de experimentación y lo que está de acuerdo con el recorrido de los planetas y de la Luna frente al cielo de las estrellas fijas.

LA LUNA SIDERAL

La Luna tarda 27 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra, pasando delante de las doce constelaciones zodiacales y dando impulsos a la Tierra que se notan a través de los elementos clásicos. Esto hace que en la planta haya formaciones de frutos en los cuatro diferentes órganos de la planta. A través de la fecha de la siembra, de los trabajos de cultivo y de la cosecha podemos fomentar el crecimiento y la salud de la planta.

De forma similar actúan estas fuerzas en las abejas. Se aíslan en su colmena del exterior, impermeabilizando todo una especie de resina. Cuando abrimos la colmena para realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» entre las abejas. En este tumulto puede haber un nuevo impulso cósmico, orientador para las abejas hasta la próxima vez que se abra la colmena.

A continuación resumimos los resultados que hemos encontrado en experimentos con plantas, en la agricultura y en las observaciones meteorológicas, en el siguiente esquema:

Constelación Zodiacal		Elemento	Tendencia del clima	Órgano vegetal	Actividad apícola
Piscis	♓	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Aries	♈	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Tauro	♉	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Géminis	♊	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Cáncer	♋	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Leo	♌	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Virgo	♍	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Libra	♎	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Escorpio	♏	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Sagitario	♐	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Capricornio	♑	Tierra	Fresco/frío	Raíz.	Construcción panales
Acuario	♒	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen

La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. Este esquema básico puede alterarse de vez en cuando. Las oposiciones entre planetas por ejemplo pueden superponer sus impulsos en días concretos, o las posiciones "trígono" pueden activar otro elemento que el que la Luna iba a transmitir ese día. También los días en que la Luna ascendente o descendente llega a tocar la eclíptica (♋ ♌) suelen tener efectos negativos que son aumentados si además dos planetas se encuentran en los puntos de intersección de sus órbitas, en los llamados "nodos".

En casos así hay eclipses y eclipses parciales y el planeta que está más cerca de la Tierra interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Semejantes periodos son muy poco indicados para la siembra y la cosecha.

EL ZODÍACO

El zodíaco comprende las constelaciones frente a las que la Luna y los planetas pasan en el curso de su órbita. Al pasar frente a una determinada constelación, se activan fuerzas que tienen efectos específicos en la Tierra.

Los trígonos



Hablamos de trígonos cuando los planetas están en una posición 120° uno del otro. La Luna se sitúa aproximadamente cada 9 días frente el mismo trígono, de modo que a través de los cavados o aplicaciones de sílice que realizamos en un ritmo de un trígono podemos estimular nuevamente el impulso que había el día de siembra.

CLASIFICACIÓN DE LAS PLANTAS PARA SIEMBRA, Y COSECHA

Llamamos plantas cultivadas a las plantas en las que determinados órganos se transforman en «fruto». Según nuestros experimentos podemos dividirlas en cuatro grupos:

Plantas-raíz y los días-raíz: formación del fruto en el ámbito de la raíz.

A este grupo pertenecen el rabanito, el rábano, el colinabo, la remolacha azucarera, la remolacha roja, el apio, la zanahoria, la escorzonera la patata la cebolla, etc. Trabajos realizados en días-raíz dan buenos rendimientos y una muy buena calidad de almacenaje de la cosecha.

P*lantas-hoja y los días de hoja.* Formación del fruto en el ámbito de la hoja.

A este grupo pertenecen los diferentes tipos de col, la lechuga, espinacas, el rapónchigo, la escarola, el perejil, hierbas de las que se utilizan las hojas, y plantas forrajeras.

Los días-hoja son favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, sin embargo, no para la recolección de frutos destinados al almacenaje y de hierbas para infusiones. Tanto para estos trabajos como para la

recolección col para la producción de chucrut recomendamos los días-flor y los días-fruto.

Plantas-flor y los días-flor: formación del fruto en el ámbito de la flor. Son flores la alcachofa y la coliflor.

Estos días son propicios para la siembra y los cuidados de todas las fanerógamas (plantas con flores) así como para cavar y aplicar sílice a plantas oleaginosas como el lino, la colza, el girasol, etc. Si se cortan flores para ponerlas en florero, en días-flor el aroma es más intenso, se mantienen frescas durante mucho tiempo y la planta echará muchos renuevos.

Las flores secas cortadas en los días-flor mantienen la plena viveza de sus colores mientras que en otros días pierden pronto su color. Las semillas oleaginosas se recogen mejor en días-flor.

Plantas-fruto y los días-fruto: Formación del fruto en el ámbito de la semilla.

A este grupo pertenecen la alubia, el guisante, la lenteja, la soja, el maíz, el tomate, el pepino, la calabaza, el calabacín así como los cereales de invierno y de verano. Los mejores rendimientos de semillas oleaginosas se consiguen sembrándolas en estos días. El mejor rendimiento de aceite lo obtendremos realizando más tarde los cuidados en días-flor. Los días en que la Luna está frente Leo son muy propicios para el cultivo de simientes. Las plantas-fruto se recogen mejor en días-fruto, pues estos días contribuyen a que los frutos se mantengan frescos durante el almacenamiento y fomentan la fuerza de regeneración. Para fruta destinada al almacenaje recomendamos además el período de la luna ascendente (◡).



Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita frente la constelación de Sagitario empieza a ascender. Cada día describe una circunferencia más grande en el cielo. Sus lugares de salida se desplazan cada vez más hacia el noreste y los lugares en que se pone más hacia el noroeste. No se le debe confundir con la luna creciente.

Durante la luna ascendente sube más la savia en las plantas. En sus partes superiores la planta está llena de savia y de fuerzas. Es buena época para cortar injertos. Se puede aumentar el efecto aprovechando en plantas-fruto los días-fruto que coincidan en este período y en plantas-flor los correspondientes días-flor. Lo mismo se puede aplicar a los días apropiados para injertar. Durante. La fruta destinada al almacenaje recogida en este tiempo, se mantiene por más tiempo fresca y jugosa. Esta época es también apropiada para talar árboles de Navidad, pues las hojas de pino tardan más en caer. El aroma es más agradable cuando se talan en días-flor.

Cuando la Luna se encuentra en el punto máximo de su órbita mensual frente la constelación de Géminis, empieza a descender (♋). Sus circunferencias en el sur del cielo son cada vez más bajas, los lugares de salida se desplazan cada vez más hacia el sudeste y los lugares en que se pone más hacia el sudoeste.

En el Hemisferio Sur se invierten estas circunstancias (♋♑).

Con «siembra» denominamos siempre el momento en el que ponemos la semilla en el suelo. Sin embargo, cuando llevamos plantas de un sitio a otro hablamos de «trasplantar».

Este es el caso cuando plantitas jóvenes se cambian del bancal de siembra protegido al lugar definitivo de su crecimiento, pero también cuando el jardinero trasplanta plantas jóvenes, a veces incluso varias veces, para un fortalecimiento del desarrollo de la raíz, como es el caso en plantaciones de frutales, de arbustos y macetas. Aquí elegimos la época de la Luna descendente, que no se debe confundir con las fases luminosas de la Luna menguante.

Durante la época de plantación, las plantas arraigan bien y se unen rápidamente con el nuevo lugar. Se puede aumentar este impulso en cada especie de planta eligiendo en esta época los días-hoja para plantas-hoja (Cáncer o Escorpio), los días-raíz para las plantas-raíz como el apio (Virgo), y los días-fruto para el pepino o el tomate (Leo), de modo que aparte del impulso de enraizamiento, se ha conseguido además un fomento del tipo de fructificación.

En este período las savias suben poco en las plantas, por este motivo es recomendable para talar árboles, setos vivos y madera para la construcción y para abonar prados, pastos y plantaciones de frutales.

INSTRUCCIONES SOBRE EL CALENDARIO

A menudo nos llegan preguntas de lectores que tienen problemas con lo que indicamos en las hojas de los meses. Casi siempre preguntan por los números. Se puede decir que se trata casi siempre de las horas del día. Rogamos lean atentamente los párrafos que acompañan a cada mes, ya que allí encontrarán la respuesta a tales preguntas. Muchas gracias.

- Junto a la fecha y el día de la semana está indicada la constelación zodiacal frente la cual se encuentra la Luna durante ese día, con la hora de entrada en dicha constelación. Permanece ante esta constelación hasta que se indica una nueva.
- En la siguiente columna están otras posiciones importantes para el crecimiento de las plantas.
- La próxima columna indica especialmente al agricultor cual

es el «Elemento» más influenciado en ese día. Las influencias caloríficas en tiempos de tormenta se especifican como «tendencia a tormenta» (Ta). En la siguiente columna se indican junto con los órganos de las plantas que están favorecidos por la siembra y los trabajos de cultivo en ese día, otros fenómenos naturales o predicciones meteorológicas que afectan a la disposición general del clima. Si en un mismo día se mencionan elementos diferentes de los que corresponderían a la posición lunar en ese momento, no se trata de errores sino de alteraciones debidas a otras posiciones cósmicas. Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa y pueden ser convertidas a la «hora local» en otros continentes. El cambio de horario de verano no está considerado.

Símbolos de constelaciones, planetas, posiciones, abreviaturas

♓ Piscis	♁ Tierra	Luna llena	Tendencia a:
♈ Aries	♀ Venus	Luna nueva	Td Tempestad
♉ Tauro	☿ Mercurio	☊ Nodo ascendente	Ta Tormenta
♊ Géminis	♂ Marte	☋ Nodo descendente	To Terremoto
♋ Cáncer	♃ Júpiter	Luna ascendente	DC Día conflictivo
♌ Leo	♄ Saturno	Luna descendente	E Erupción
♍ Virgo	♅ Urano	Pg Perigeo (Luna cerca)	P Precipitaciones
♎ Libra	♆ Neptuno	Ag Apogeo (Luna lejos)	G Granizo
♏ Escorpio	♇ Plutón	Eclipse	
♐ Sagitario	☉ Sol	Eclipse	Tiempo de plantación:
♑ Capricornio	☍ Oposición	△ Trígono	Inicio
♒ Acuario	☌ Conjunción		Fin

PERIODOS DESFAVORABLES

Los períodos en los que se producen eclipses, nodo de la Luna o de los planetas u otras constelaciones que influyen de forma negativa en las plantas, son épocas desfavorables que hemos omitido en el calendario. Si por motivos de apuro de tiempo nos vemos obligados a sembrar en aquellos días, podemos elegir días más propicios para realizar los trabajos de cavados y conseguir de esta manera una mejora considerable.

LA APICULTURA

El enjambre vive en la colmena aislándose del mundo exterior. Como protección adicional impermeabiliza la colmena con propóleo para mantener las malas influencias lejos de la colmena. El contacto directo con el mundo exterior se establece a través de las abejas que salen de la colmena.

Si el apicultor quiere aprovecharse de las fuerzas cósmicas debería crear a las abejas una situación similar a la que crea el agricultor en el cuidado de sus plantas. Trabaja el suelo. Con el aire penetran fuerzas cósmicas en el suelo que son asimiladas por la planta y que se pueden aprovechar hasta que se remueva el suelo la próxima vez.

El apicultor ha de abrir la colmena y la capa de propóleo. Así se crea una alteración a través de la cual las fuerzas cósmicas pueden actuar en la colmena hasta el próximo control. De esta manera el apicultor puede transmitir a sus abejas muy puntualmente fuerzas cósmicas.

No es indiferente qué fuerzas se activan a través de la fecha en la que se realizan los cuidados. Aquí el apicultor puede intervenir conscientemente y aprovechar los días que favorecen a la colmena en su desarrollo y en la elaboración de las sustancias alimenticias. La colmena se lo agradece al apicultor y le dejará parte de las sustancias recogidas y bien elaboradas en forma de miel.

Así se puede recomendar para los trabajos de cuidados los dias-tierra-raíz si el enjambre debe construir más panal. Trabajar en días-luz-flor estimula la puesta, apoyando con ello el crecimiento de la población. Los dias-calor-fruto estimulan la recolección del néctar. Los días-hoja- agua no son propicios para efectuar labores, recogerles la miel ni centrifugarla.

Desde finales de los años setenta se ha extendido el ácaro de la Varroa en la mayoría de las colmenas europeas. Después de varias comparaciones de incineración recomendamos incinerar los ácaros, dinamizar la ceniza y potenciarla como lo hemos hecho con gran éxito en escarabajos de la patata y otros parásitos vegetales. Las costumbres vitales de la Varroa mostraban un éxito total de

la D-8 líquida solamente en una parte de los apicultores. Así que buscamos otros caminos para su aplicación.

La ceniza pulverizada y dinamizada durante una hora, ya no fue potenciada con agua sino aplicada directamente en las ranuras entre los panales espolvoreándolas muy finamente con un salero. La producción de la ceniza así como su aplicación en las colmenas se mantiene en la fecha cósmica de Sol y Luna frente a Tauro. En 1996 caen estos días en Mayo y Junio. En los próximos meses se puede repetir el tratamiento cuando la Luna esté frente a Tauro pero las aplicaciones se deberían concluir en Octubre. Este método está ya muy comprobado.

EXPERIMENTOS CON PATATAS APLICANDO INFUSIONES EN 1994

El año pasado comentamos experimentos en los que trabajamos aparte de con los preparados biológico-dinámicos también con infusiones de plantas. Entre otras muchas plantas, trabajamos también con patatas.

En un campo de trigo cosechado echamos 20.000 kg de estiércol compostado térreo, lo mezclamos a poca profundidad con la tierra y luego lo aramos para el invierno.

En primavera realizamos unos cuidados durante la constelación de Leo para fomentar la germinación de malas hierbas. Para preparar la cama de siembra rociamos toda la superficie una vez con el Preparado María Thun y llevamos a cabo la plantación el 30 de Mayo.

En la víspera hervimos las infusiones tal como describimos en los comentarios de Julio y durante la noche introdujimos en estos líquidos las patatas para plantar. Al mismo tiempo preparamos el Preparado María Thun y metimos una serie de patatas. Además preparamos una serie de testigos con agua. A la mañana siguiente plantamos 110 bulbos de cada variante. A otra variante adicional no tratada se aplicó en la plantación dos veces el Preparado Maria Thun en una superficie de 500 m2.

Los tres rociados de hojas se realizaron en días-raíz. Las variantes de corteza de roble mostraron un crecimiento abundante de hojas aunque decepcionaron en el rendimiento de bulbos. En los experimentos con tomates el efecto de la infusión de corteza de roble sobre el rendimiento fue muy bueno. Aún estamos esperando al cultivo tardío del año pasado de patatas, tomates, rabanitos, lechuga, berro, espinacas y cebollas. Lo que se puede observar en las plantas de los cultivos posteriores, lo que dicen los análisis y lo que se puede concluir de las elaboraciones en más o menos la calidad que es importante para la alimentación del hombre. Intentamos enterarnos con qué tratamientos

adicionales y especiales se puede aumentar aún más la eficacia de los métodos biodinámicos y biológicos.

Aplicaciones	Rociados	Rendimiento En kg/ha	Rendimiento Materia seca Por ha	% Materia seca
Baño de agua	3 veces agua	272	66,40	24,4
500 baño	----------	26	64,60	21,1
500 baño	3x Preparado Silice	332	2,56	21,9
Infusión milenrama	3x Rociado de infusión	286	58,08	21,0
Infusión manzanilla	3x Rociado de infusión	281	60,08	21,3
Infusión de ortiga	3x Rociado de infusión	287	66,00	23,0
Infusión Corteza roble	3x Rociado de infusión	275	55,28	20,09
Infusión Diente de león	3x Rociado de infusión	277	62,08	22,36
Infusión Valeriana	3x Rociado de infusión	275	60,24	21,89
Ningún baño en plantación	2 x 500 m2	307	69,56	22,90
Baño de Cola de Caballo	3x Rociado de infusión	330	71,04	21,08

EXPERIMENTOS CON RABANITOS EN CONSTELACIONES DE 1995

En 1995 se plantaron además de lechuga, espinacas, lentejas, berro, cebollas, reseda, judías, alfalfa y facelia diferentes series de rabanitos para comparaciones de fechas de siembra. Aquí podíamos aprovechar en la siembra, aparte de los ritmos de la Luna Sideral, un eclipse lunar, un nodo lunar, un eclipse solar y trígonos de planetas. Es el 44 año en que realizamos experimentos con rabanitos y sin embargo existen aún constelaciones de las que no tenemos suficientes repeticiones porque se dan raras veces, por ejemplo determinadas posiciones angulares con Urano frente a Capricornio. Estas constelaciones se dieron hace 84 años pero entonces aún no se hacía este tipo de experimentos. Entretanto también el Sol se ha movido un grado para nosotros en la Tierra. Por eso tampoco son correctos los pronósticos campesinos que se referían a determinados días del año y que dependían de la posición solar. La foto *nº* 12 muestra rabanitos del 1995. Las formas son diferentes y

también los rendimientos. Los rabanitos de períodos desfavorables que habíamos omitido en el "Calendario1995" estaban llenos de orugas y no se podían comer ni vender.



LA EPOCA DE PLANTACION

Las plantas que se cambian de sitio durante la época de plantación vuelven a arraigar rápidamente. Lo mismo es válido para estacas de plantas secas. Nuestra foto muestra rosas musgosas que se plantaron como ramitas pequeñas en macetas el 11 de Marzo. El 23 de Junio están en pleno desarrollo floral y a finales de Agosto tenemos la segunda serie de flores. También pueden ser una alegría para jardineros caseros.

ANALISIS

Desde hace muchos años investigamos en nuestro trabajo una indicación que dio Rudolf Steiner que dio en el "Curso sobre Agricultura biológico-dinámica". "Las fuerzas

de la Tierra y del Cosmos actúan a través de las sustancias de la tierra".



En una comparación de fechas de siembra con ocho plantas se recogen las plantas de acuerdo con los ritmos, se secan en el armario secador y se analizan durante la época invernal que es más tranquila para encontrar las condiciones en que las plantas alimenticias se vuelven más sustanciosas.

EXPERIMENTOS CON TOMATES

Habíamos guardado semillas de los experimentos hechos con tomates en 1994 en los que habíamos aplicado infusiones de hierbas y en 1995 plantamos un cultivo posterior de todas las variantes tratadas. Hasta en el cultivo posterior se notan grandes diferencias también en el sabor. La cosecha no se ha concluido aún.

Los múltiples resultados de estos trabajos experimentales los redactaremos para nuestros lectores en una pequeña publicación que saldrá en invierno.

LA VITICULTURA

Como ya describimos en la octava edición de nuestro cuaderno "Constelaciones y agricultura biodinámica" existe desde hace muchos años una fructífera cooperación con viticultores franceses. Sin embargo, como se interesaban grupos mayores de diferentes regiones en este trabajo, hacían falta nuevos experimentos. Así plantamos sarmientos que nos debían mostrar si también en regiones climáticamente difíciles la vid se podía desarrollar bien con nuestros métodos y dar buenos frutos. Por este motivo estamos probando diferentes tratamientos homeopáticos y dinámicos.

Rociados por la mañana temprano, poco después de la salida del sol.



Estudiantes evaluando la productividad del suelo de la viña.

COMPARACIONES DE FECHAS DE PLANTACION Y DE CONSERVACION DE CEBOLLAS EN 1994/95

En algunas regiones europeas la cebolla pertenece a las plantas alimenticias más importantes por lo cual sus consumidores están especial interesados en un buen sabor, la conservación y el tiempo de almacenaje. Para aquel que las cultiva importa además un buen rendimiento.

Cuando el Sol se haya situado frente a Virgo el 15 de Septiembre utilizamos el primer día-raíz para la siembra de las cebollas y las cosechamos en un día-raíz en Noviembre. En el año siguiente plantamos cebolletas durante 12 a 15 constelaciones diferentes, cosechándolas también durante los períodos correspondientes. Hemos comparado muchas posibilidades de almacenaje diferentes. En el invierno se conservan mejor en el henil, entre el heno y la paja. Los rendimientos de días-raíz y días- hoja son similares pero se conservan mejor las cebollas de días-raíz.



La foto nº 18 muestra una serie que se sacó el día 10 de Junio del almacén del sótano. Las cebollas de días-raíz son como recién cosechadas, las de días-flor y días-fruto han brotado mucho y las de perigeo, tiempos de nodos y algunos días-hoja están podridas. El 18 de agosto hacemos otra foto. Ahora, un año después de la cosecha, empiezan a brotar también las cebollas de días-raíz. Foto nº 19, Capricornio.



Como base de los cálculos astronómicos sirvieron: "Raphael's astronomical Ephemeris of the Planet's Places far

1996" Londres, y algunos resultados de los trabajos experimentales.

Bibliografía recomendada:

1) Curso sobre agricultura biológico-dinámica. Ed. Rudolf Steiner; Madrid
2) Los ritmos de las estrellas, Schultz - Vetter.
3) El calendario de estrellas Dornach.

Las publicaciones sobre la agricultura biológica o biodinámica se pueden comprar en el comercio especializado; no las podemos nombrar todas.

En nuestra estación experimental damos cursillos sobre los diferentes campos tratados en nuestras investigaciones y publicaciones. Se pueden pedir informaciones. Las publicaciones anunciadas en las páginas 47 - 49 así como reproducciones en color de las pinturas de Walter Thun se pueden pedir directamente a la Editorial AUSSAATIAGE M. Thun Verlag, Postfach 1518, D-35205 Biedenkopf. Rogamos pidan un prospecto.

DIAS DE SIEMBRA. ENERO 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Lunes	♉ 14	☉ – ♐	Calor/tierra	------ Tendencia a tempestad, día conflictivo.
2. Martes	♉		Tierra	Raíz.
3. Miércoles	♉		Tierra	Raíz.
4. Jueves	♊ 14	☽ 5	Tierra/luz	Raíz hasta las 13 h, flor a partir de las 14 h, * Comienzo época de plantación a las 5 h.
5. Viernes	♊	Ag 13 ♋ 22	Luz	Flor.
6. Sábado	♋ 23		Luz/agua	Flor hasta las 22 h, hoja a partir de las 23 h.
7. Domingo	♋	♀ ☊	Agua	----------
8. Lunes	☊ 17		Agua/calor	Hoja hasta las 16 h, fruto a partir de las 17 h, tendencia a erupciones.
9. Martes	☊		Calor	Fruto (por ejemplo tomate, pepino, pimientos para el invernadero).
10. Miércoles	☊		Calor	Fruto.
11. Jueves	♍ 14		Calor/tierra	Fruto hasta las 13 h, raíz a partir de las 14 h.
12. Viernes	♍		Tierra	Raíz.
13. Sábado	♍	☊ 19	Tierra	Raíz hasta las 17 h y a partir de las 21 h. Tendencia a terremoto y erupciones.
14. Domingo	♍		Tierra	Raíz.
15. Lunes	♎ 3		Tierra/luz	Raíz hasta las 2 h, flor a partir de las 3 h.
16. Martes	♏ 10		Luz/agua	Flor hasta las 9 h, hoja a partir de las 10 h. Tendencia a tempestad.
17. Miércoles	♏		Agua	Hoja, tendencia a erupciones.
18. Jueves	♐ 12	☉–♑ ☽ 7	Agua/calor	Hoja hasta las 11 h, fruto a partir de las 12 h, # Final época de plant., tend. a tempestad.
19. Viernes	♐	Pg 24	Calor	----------
20. Sábado	♑ 11	♒ 14	Calor/tierra	---------- Tendencia a tempestad.
21. Domingo	♑		Tierra	Raíz, tendencia a tempestad.
22. Lunes	♒ 8		Tierra/luz	Raíz hasta las 7 h, flor a partir de las 8 h.
23. Martes	♒		Luz	Flor, tendencia a terremoto.
24. Miércoles	♓ 1		Luz/agua	Hoja a partir de la 1 h.
25. Jueves	♓		Agua	Hoja, tendencia a erupciones.
26. Viernes	♈ 22	♉ 5	Agua/calor	Hoja de 7 a 21 h, fruto a partir de las 22 h, día conflictivo.
27. Sábado	♈		Calor	Fruto.
28. Domingo	♉ 20		Calor/tierra	Fruto hasta las 19 h, raíz a partir de las 20 h, tendencia a tormenta y tempestad.
29. Lunes	♉		Tierra	Raíz, día conflictivo.
30. Martes	♉		Tierra	Raíz.
31. Miércoles	♊ 20	☽ 12	Tierra/luz	Raíz hasta las 19 h, flor a partir de las 20 h, * Comienzo época de plantación a las 12 h.

Anotaciones

Comentarios a Enero.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

En este mes tienen lugar nueve conjunciones planetarias. Debido a estas acumulaciones, Enero no es precisamente favorable para las siembras. La falta de fuerzas formativas fomenta el crecimiento de hongos. Las fuerzas constructivas son bloqueadas, las destructivas se fomentan. Es recomendable rociar preventivamente la tierra en la que se va a plantar, con una infusión de cola de caballo. Para fomentar el crecimiento se puede aplicar infusiones de milenrama. No hay oposiciones planetarias por lo que falta la luz opuesta. En el ser humano existe la tendencia a resfriados. Ingerir remolacha roja y fruta fresca es una medida dietética preventiva.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A principios de mes Mercurio y Venus transmitirán frío. A partir del 12 Venus nos traerá más luz y Mercurio efectos calurosos a partir del 19. Las conjunciones nos proporcionan precipitaciones. El día de Reyes Marte le hace compañía a Urano en la región invernal de Capricornio.

• *Época de plantación* del 4 al 17. Favorable para podar árboles frutales, setos y viñas, preferiblemente los días-fruto.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Para el apicultor:

A partir del 12 se debería despejar las piqueras.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

La elaboración de la leche

Para la producción de mantequillas y quesos buenos se recomienda evitar las fechas omitidas en el calendario. La mayor cantidad de mantequilla se obtiene de la leche que se ha ordeñado en días-calor-fruto y en días con tendencia a tormenta. Los días de perigeo son casi siempre desfavorables para la elaboración de la leche y el yogur. Las elaboraciones lácteas de estos días se estropean fácilmente por lo cual se recomienda preparar un día antes una cantidad doble. La leche prefiere los días-luz y los días-calar, los días-hoja (de agua) no son propicios (3).

28.
29.
30.
31.

DIAS DE SIEMBRA. FEBRERO 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Jueves	♊	☉–♋ Ag 17	Luz	Flor, * Época de plantación, tendencia a tempestad.
2. Viernes	♊		Luz	Flor.
3. Sábado	♋ 5		Luz/agua	Flor hasta las 4 h, hoja a partir de las 5 h.
4. Domingo	♌ 23	☽ 17	Agua/calor	Hoja hasta las 22 h, fruto a partir de las 23 h, día conflictivo.
5. Lunes	♌		Calor	Fruto.
6. Martes	♌		Calor	Fruto, tendencia a tempestad.
7. Miércoles	♍ 19		Calor/tierra	Fruto hasta las 18 h, raíz a partir de las 19 h.
8. Jueves	♍		Tierra	Raíz, por ejemplo apio para el invernadero.
9. Viernes	♍	☊ 20	Tierra	Raíz hasta las 18 h y a partir de las 22 h.
10. Sábado	♍		Tierra	Raíz, tendencia a terremoto.
11. Domingo	♎ 9		Tierra/luz	Raíz hasta las 8 h, hoja a partir de las 9 h, tendencia a tempestad.
12. Lunes	♏ 17		Luz/agua	Flor hasta las 16 h, hoja a partir de las 17 h.
13. Martes	♏		Agua	Hoja, ≠ Final época de plantación.
14. Miércoles	♐ 22	♀♉☽ 17	Agua/calor	---------- Tendencia a temporal y tempestad.
15. Jueves	♐	☉–♎	Calor	Fruto a partir de las 10 h.
16. Viernes	♑ 22		Calor/tierra	Fruto hasta las 20 h, día conflictivo.
17. Sábado	♑	♀♉ Pg 10	Tierra	----------
18. Domingo	♒ 19		Tierra/luz	Raíz de 10 a 18 h, flor a partir de las 19 h, tendencia a tempestad.
19. Lunes	♒	♍ 1	Luz	Flor, tendencia a erupciones.
20. Martes	♓ 12		Luz/agua	Flor hasta las 11 h, hoja a partir de las 12 h.
21. Miércoles	♓		Agua	Hoja, día conflictivo, tendencia a temporal y tempestad.
22. Jueves	♓	♀♂♉ 10	Agua	Hoja a partir de las 12 h, tendencia a erupciones.
23. Viernes	♈ 7		Agua/calor	Hoja hasta las 6 h, fruto a partir de las 7 h.
24. Sábado	♈		Calor	Fruto.
25. Domingo	♉ 4		Calor/tierra	Fruto hasta las 3 h, raíz a partir de las 4 h.
26. Lunes	♉		Tierra	Raíz, día conflictivo, tendencia a tempestad.
27. Martes	♉	♎ 20	Tierra	Raíz, * Comienzo época de plantación, tendencia a tempestad.
28. Miércoles	♊ 3		Tierra/luz	Raíz hasta las 2 h, flor a partir de las 3 h.
29. Jueves	♊	Ag 8	Luz	Flor.

Calendario Agricultura Biodinámica 1996 – María Thun
http://www.editorialrudolfsteiner.com/

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Comentarios a Febrero.

Al principio Mercurio está en retrogradación frente a la constelación calurosa de Sagitario. El 13 se sitúa junto a Marte y Urano que se encuentran frente a la región de alto invierno de Capricornio. Venus se acerca a Saturno que se encuentra frente a la región acuosa de Piscis. Marte se sitúa el día 10 frente a la región luminosa de Acuario. Júpiter y Neptuno estarán todo el año frente a la constelación calurosa de Sagitario y Plutón frente al Escorpio acuoso. De esta manera tenemos una repartición relativamente armoniosa en los diferentes elementos. Febrero nos proporciona aún tres conjunciones pero ninguna oposición ni trígono. Así las recomendaciones dietéticas son válidas también para Febrero.

• *Época de plantación* del 1 al 13 y 28/29 de Febrero. Favorable para podar árboles, *setos* y viñas. Los días 15/16 y 23/24 son especialmente apropiados para cortar injertos de árboles frutales

El abono y el suelo

En relación al abono no basta con saber qué sustancias extrae la planta del suelo y cómo se las podemos devolver, puesto que no se han considerado ni las fuerzas que actúan en el suelo ni los organismos que lo crean y lo estructuran. Tampoco se puede sacar conclusiones de suelos de bosques para suelos en los que deben crecer plantas cultivadas.

El suelo es un organismo vivo que se sitúa entre la planta y el mineral de los suelos. De los restos orgánicos del reino animal y vegetal se forma una tierra nueva a través del compostaje. En un compostaje correcto, las fuerzas del mundo animal y vegetal son unidas a lo térreo. A través de los organismos del suelo el compost y las sustancias arcillosas se estructuran en una nueva unidad, y el abono tiene un efecto vivificador en el suelo. Suelo vivificado quiere decir que, con la ayuda de las fuerzas vitales de las sustancias de origen orgánico, elevamos las sustancias procedentes del reino mineral medio escalafón hacia la planta. Cuando removemos este suelo, las fuerzas cósmicas penetran en él y la planta puede tratarlas. El agricultor puede aprovecharse de los efectos cósmicos favorables y evitar los desfavorables.

DIAS DE SIEMBRA. MARZO 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Viernes	♋ 12	☉ – ♒	Luz/agua	Flor hasta las 11 h, hoja a partir de las 12 h, *época de plantación, tend. a terremoto.
2. Sábado	♋		Agua	Hoja, tendencia a terremoto del 1 al 4 de marzo.
3. Domingo	☊ 6		Agua/calor	Hoja hasta las 5 h, fruto a partir de las 6 h, tendencia a tempestad.
4. Lunes	☊		Calor	Fruto.
5. Martes	☊	☺ 10	Calor	Fruto (por ejemplo apropiado para tomates y pepinos del invernadero).
6. Miércoles	♍ 2		Calor/tierra	Fruto hasta la 1 h, raíz a partir de las 2 h.
7. Jueves	♍	☊ 23	Tierra	Raíz hasta las 21 h.
8. Viernes	♍		Tierra	Raíz a partir de la 1 h, tendencia a temporales.
9. Sábado	♎ 15		Tierra/luz	Raíz hasta las 14 h, flor a partir de las 15 h, tendencia a temporales.
10. Domingo	♏ 23		Luz/agua	Flor hasta las 22 h, hoja a partir de las 23 h.
11. Lunes	♏	☉ – ♓	Agua	Hoja.
12. Martes	♏	☽ 24	Agua	Hoja, # Final época de plantación a las 22 h.
13. Miércoles	♐ 4		Agua/calor	Hoja hasta las 3 h, fruto a partir de las 4 h. Tendencia a tempestad.
14. Jueves	♐		Calor	Fruto, tendencia a terremoto.
15. Viernes	♑ 6		Calor/tierra	Fruto hasta las 5 h, raíz de 6 a 17 h.
16. Sábado	♑	Pg 7	Tierra	---------- Raíz a partir de las 18 h, día conflictivo.
17. Domingo	♒ 5		Tierra/luz	Raíz hasta las 4 h, flor a partir de las 5 h.
18. Lunes	♓ 22		Luz/agua	Flor hasta las 21 h, hoja a partir de las 22 h, tendencia a tormenta.
19. Martes	♓	♍ 12	Agua	Fruto, día conflictivo.
20. Miércoles	♓	♉ 19	Agua	Hoja hasta las 17 h. y a partir de las 21 h.
21. Jueves	♈ 16		Agua/calor	Hoja hasta las 15 h, fruto a partir de las 16 h. Tendencia a terremoto.
22. Viernes	♈		Calor	Fruto, día conflictivo.
23. Sábado	♉ 13		Calor/tierra	Hoja.
24. Domingo	♉		Tierra	Raíz.
25. Lunes	♉		Tierra	Raíz hasta las 10 h, hoja a partir de las 11 h.
26. Martes	♊ 11	♈ 4	Tierra/luz	Raíz hasta las 10 h, flor a partir de las 11 h. * Comienzo época de plant. a las 4 h.
27. Miércoles	♊		Luz	Flor (cortar esquejes de setos y plantarlos).
28. Jueves	♋ 20	Ag 4	Luz/agua	Flor hasta las 4 h, hoja a partir de las 5 h, día conflictivo.
29. Viernes	♋		Agua	Hoja, tendencia a terremoto, día conflictivo.
30. Sábado	☊ 14		Agua/calor	Hoja hasta las 13 h, fruto a partir de las 14 h.
31. Domingo	☊		Calor	Fruto.

Calendario Agricultura Biodinámica 1996 – María Thun
http://www.editorialrudolfsteiner.com/

Anotaciones

Comentarios a Marzo.

Marzo nos depara otra vez seis conjunciones lo cual conlleva dificultades similares a las descritas en Enero. Sus efectos serán reforzados por dos trígonos acuosos. Un trígono de calor el día 19 es un verdadero rayo de luz y puede ser utilizado tanto para la siembra en días-fruto como para echarle un primer vistazo a las abejas. La segunda semana de Marzo será seguramente ya propicia para trabajar en la colmena y en sitios más calurosos para sembrar avena y habas.

• *Época de plantación* del 1 al 2 y del 26 al 31. Otra vez favorable para podar árboles, frutales, arbustos y viñas.

Fechas favorables para la recolección de las plantas utilizadas en la elaboración de los preparados

El diente de león se recoge en días-luz-flor por la mañana, justo después de haberse abierto y estando el centro de la flor todavía cerrado.

La milenrama se recoge en días-calor-fruto, más o menos cuando el sol está frente a la constelación de Leo, o sea, a partir de mediados de agosto.

La manzanilla se debe recoger en días-luz-flor poco antes de San Juan. Si se recoge demasiado tarde existe el peligro de que las cabezas ya hayan pasado a transformarse en semillas, entonces se sembraría en los campos manzanilla junto con un preparado que no está bien hecho. También pierde su buen efecto si hay orugas en las cabezas huecas. Por eso cuidado con las fechas de recolección.

La ortiga se recoge cuando se ven los primeros capullos durante días-luz-flor. Se puede usar toda la planta menos la parte enterrada.

Las flores de valeriana se recogen mejor en días-luz-flor alrededor del día de San Juan. Las flores se secan sobre un papel en un sitio a la sombra.

Los trozos de corteza de roble se recogen en días-tierra. No hay que coger el liber.

DIAS DE SIEMBRA. ABRIL 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Lunes	♌	☉ – ♓	Calor	Fruto, *época de plantación, día conflictivo.
2. Martes	♍ 9		Calor/tierra	Fruto hasta las 8 h, raíz a partir de las 9 h, tendencia a erupciones.
3. Miércoles	♍		Tierra	Raíz hasta las 21 h.
4. Jueves	♍	☿ ♀ ☺ F ♂6	Tierra	---------- Tendencia a terremoto.
5. Viernes	♎ 21	Viernes Santo	Tierra/luz	---------- Día conflictivo.
6. Sábado	♎		Luz	---------- Tendencia a tempestad, a erupciones y a terremotos.
7. Domingo	♏ 4	Pascua	Luz/agua	Flor hasta las 3, raíz a partir de las 4 h, tendencia a erupciones.
8. Lunes	♏		Agua	Raíz hasta las 6 h, hoja a partir de las 7 h.
9. Martes	♐ 9	☽ 5	Agua/calor	Hoja hasta las 8 h, fruto a partir de las 9 h, # Final época de plantación a las 4 h.
10. Miércoles	♐		Calor	Fruto a las 16 h, tendencia a tormenta.
11. Jueves	♑ 12	Pg 4	Calor/tierra	---------- Raíz a partir de las 16 h, tendencia a tempestad.
12. Viernes	♑		Tierra	Raíz.
13. Sábado	♒ 11		Tierra/luz	Raíz hasta las 10 h, flor a partir de las 11 h.
14. Domingo	♒		Luz	Flor, día conflictivo.
15. Lunes	♓ 6		Luz/agua	Flor hasta las 5 h, hoja a partir de las 6 h, tendencia a tempestad.
16. Martes	♓		Agua	Hoja. Tendencia a tempestad y erupciones.
17. Miércoles	♓	☉ F ♂ F ♀ ☽4 ♒24	Agua	---------- Tendencia a erupciones.
18. Jueves	♈ 2	☉ – ♈	Agua/calor	Fruto a partir de las 2 h (Días 18 y 19 combatir las polillas), día conflictivo.
19. Viernes	♉ 22		Calor/tierra	Fruto hasta las 21 h, raíz a partir de las 22 h.
20. Sábado	♉		Tierra	Raíz.
21. Domingo	♉		Tierra	Raíz (según su estado, sacar los preparados).
22. Lunes	♊ 20	♐ 12	Tierra/luz	Raíz hasta las 19 h, flor a partir de las 20 h. *Comienzo época de plantación a las 13 h.
23. Martes	♊		Luz	Flor, tendencia a lluvias.
24. Miércoles	♊	Ag 24	Luz	Flor, tendencia a erupciones y tormenta.
25. Jueves	♋ 4		Luz/agua	Flor hasta las 3 h, hoja a partir de las 4 h.
26. Viernes	♌ 22		Agua/calor	Hoja hasta las 21 h, fruto a partir de las 22 h, tendencia a tormenta.
27. Sábado	♌		Calor	Fruto hasta las 12 h, hoja a partir de las 13 h, tendencia a erupciones.
28. Domingo	♌		Calor	Hoja hasta las 8 h, fruto a partir de las 9 h, tendencia a tempestad.
29. Lunes	♍ 19		Calor/tierra	Fruto hasta las 18 h, raíz a partir de las 19 h, tendencia a terremoto.
30. Martes	♍		Tierra	Raíz, tendencia a tempestad.

Calendario Agricultura Biodinámica 1996 – María Thun
http://www.editorialrudolfsteiner.com/

Anotaciones

Comentarios a Abril.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Viniendo de Piscis Mercurio se sitúa el día 7 frente a la constelación de calor en Aries alegrándonos con calor ya en la primavera temprana. El 23 sigue hacia Tauro pero vuelve a Aries en Mayo cuando se vuelve retrogrado. Venus está frente a Ta uro y permanecerá allí hasta Agosto transmitiéndonos el elemento tierra. Así tenemos que renunciar durante meses a un mayor efecto luminoso. Esto nos traerá noches frescas o incluso frías en esta época puesto que Venus convive en gran armonía con Urano

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

frente a Capricornio. Marte, Júpiter y Plutón siguen permaneciendo frente a un fondo acuoso. Aparte de una oposición débil hay un trígono acuoso y otro térreo. El único trígono de calor es perturbado por eclipses del Sol y de Marte. Por este motivo se debería aprovechar los días favorables de Marzo para realizar trabajos tempranos en las colmenas.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Las patatas se desarrollan mejor si se las planta en días-raíz. Si se quiere utilizar los propios tubérculos se recomiendan los días de Aries para la plantación y los cuidados. El 19 es un día de propagación de los diferentes tipos de polillas; se las puede cazar con matamoscas e incinerarlas en las zonas en las que aparecen habitualmente.

Del día 9 al 21 es buena época para injertar árboles frutales y viñas; preferiblemente los días-fruto y días-flor.

• *Epoca de plantación* del 1 al 8 y a partir del 11.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Para el apicultor:

Del 7 al 22 se puede contar con una primera recolección de néctar, tornando todas las medidas necesarias antes.

El corte del césped

28.
29.
30.

Si el césped debe crecer rápidamente se le corta en dias-hoja, teniendo el efecto secundario de que será muy tupido. Si no se le quiere cortar tan a menudo, hay que hacerlo en días-flor. El compost se aplica cuando la luna está frente a Cáncer o frente a Virgo. Al arrojar la hierba obtenida en el corte del césped al compost habría que añadir un poco de tierra, de compost viejo o de hojas muertas, ya que si no, puede salir fácilmente una especie de chucrut. Se puede conseguir una cierta mejora de la descomposición dejando que se seque la hierba un poco antes de arrojarla al compost o espolvoreando cada metro cúbico de ella con aproximadamente 2 kg de cal viva.

DIAS DE SIEMBRA. MAYO 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Miércoles	♍	☉–♈ ☊15	Tierra	Raíz hasta las 13 h y a partir de las 17 h, *época de plantación.
2. Jueves	♍		Tierra	Raíz hasta las 12 h y a partir de las 18 h, tendencia a terremoto.
3. Viernes	♎ 6	☺ 13	Tierra/luz	Raíz hasta las 5 h, flor a partir de las 6 h.
4. Sábado	♍ 12		Luz/agua	Flor hasta las 11 h, hoja a partir de las 12 h.
5. Domingo	♍		Agua	Hoja, # Final época de plantación a las 24 h.
6. Lunes	♐ 16	☽ 11 Pg 23	Agua/calor	----------
7. Martes	♐		Calor	Fruto a partir de las 5 h.
8. Miércoles	♑ 18		Calor/tierra	Fruto hasta las 17 h, raíz a partir de las 18 h, tendencia a tormenta.
9. Jueves	♑		Tierra	Raíz.
10. Viernes	♒ 12		Tierra/luz	Raíz hasta las 11 h, flor a partir de las 12 h.
11. Sábado	♒		Luz	Flor, tendencia a tempestad.
12. Domingo	♓ 12	☿ ♉	Luz/agua	----------
13. Lunes	♓	☉–♉	Agua	Hoja a partir de las 6 h.
14. Martes	♓	♉ 10	Agua	Hoja hasta las 8 h y a partir de las 12 h, tendencia a granizo
15. Miércoles	♈ 9		Agua/calor	Hoja hasta las 8 h, fruto a partir de las 9 h.
16. Jueves	♈	Ascensión	Calor	Fruto, tend. a tempestad. (Del día 17 al 19 invasión de escarabajos de la patata).
17. Viernes	♉ 6	☿delante ♈ ♒13	Calor/tierra	Fruto hasta las 5 h, raíz a partir de las 6 h.
18. Sábado	♉		Tierra	Raíz (del 17 al 19 Varroa, ver "Parásitos"), tendencia a tempestad.
19. Domingo	♉	♋ 21	Tierra	Raíz, * Comienzo época de plantación a las 21 h.
20. Lunes	♊ 4		Tierra/luz	Raíz hasta las 3 h, flor a partir de las 4 h.
21. Martes	♊		Luz	Flor (en caso de invasión de pulgones ver los comentarios al mes de noviembre).
22. Miércoles	♋ 12	Ag 17	Luz/agua	Flor hasta las 19 h, hoja a partir de las 20 h.
23. Jueves	♋		Agua	Hoja.
24. Viernes	♌ 6		Agua/calor	Hoja hasta las 5 h, fruto a partir de las 6 h.
25. Sábado	♌		Calor	Fruto.
26. Domingo	♌	Pentecostés	Calor	Fruto, tendencia a granizo.
27. Lunes	♍ 3		Calor/tierra	Fruto hasta las 2 h, raíz a partir de las 3 h.
28. Martes	♍	☊ 22	Tierra	Raíz hasta las 20 h.
29. Miércoles	♍		Tierra	Raíz, tendencia a terremoto.
30. Jueves	♎ 15		Tierra/luz	Raíz hasta las 14 h, flor a partir de las 15 h, tendencia a tempestad.
31. Viernes	♍ 22		Luz/agua	Flor hasta las 21 h, hoja a partir de las 22 h, tendencia a tempestad.

Anotaciones

Comentarios a Mayo.

Mercurio se sitúa en su retrogradación otra vez frente a la constelación calurosa de Aries, haciéndole compañía a Marte que permanecerá allí todo el mes de Mayo. Esto conlleva un buen crecimiento en las plantas y recolección del néctar en las abejas. Venus frente a Tauro nos proporcionará noches frescas por lo que se puede contar con miel de bosque. Del 17 al 19 hay constelaciones favorables para la regulación de la Varroa, del escarabajo de la patata y de otros insectos molestos con caparazón de quitina, ver los comentarios de "Junio" o nuestra publicación de malas hierbas.

• *Época de plantación* hasta el 5 y a partir del 20. Aprovechar otra vez los días 7, 8, 15, 16 y del 17 a finales de Mayo, favorables para injertar, y preferir los días-fruto.

Para el apicultor:

Marte estimula la tendencia a enjambrar. Para la cría de reinas y la reproducción de la colmena se recomienda aprovechar los dias-flor de Mayo.

Hongos en la planta

En el caso de los hongos nos referimos a parásitos vegetales, ya que en la naturaleza el hongo normalmente se dedica a destruir y transformar lo orgánico que está descomponiéndose.

Sin embargo, esto quiere decir que ya antes tiene que existir una enfermedad y que el hongo aparece como consecuencia. Por lo tanto no se puede hablar de enfermedades producidas por hongos.

Rudolf Steiner explica este fenómeno en su "Curso sobre agricultura biológico-dinámica" de la siguiente manera:

"Si las fuerzas de la Luna que influyen en lo acuoso se hacen demasiado fuertes en la tierra, quizás porque ha llovido demasiado, el nivel de hongos, que normalmente se encuentra a ras de suelo, asciende a la planta". Según Steiner, se les puede hacer volver a su ámbito original preparando decocciones de cola de caballo *(Equisetum arvense)* y aplicándolas al suelo donde se cultiva las plantas atacadas.

En parte puede haber también otros motivos para que haya hongos. Así se ha comprobado que los abonos orgánicos no maduros o sustancias de animales que no han pasado por un proceso de compostaje provocan su aparición en el cultivo del año siguiente. Más detalles acerca de la cuestión de los hongos se encuentran en la tercera edición de nuestro escrito "Regulación de malas hierbas y de parásitos". Si se queman los frutos infectados por hongos (Pg) se deberían separar antes las semillas.

DIAS DE SIEMBRA. JUNIO 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Sábado	♊	☉–♉ ☺ 22	Agua	Hoja (días 1 y 2 incinerar los grillos topos), tendencia a erupciones.
2. Domingo	♊	☾ 21	Agua	Hoja, # Final época de plantación a las 20 h, tendencia a terremoto.
3. Lunes	♐ 1	Pg 17	Agua/calor	----------, Tendencia a erupciones.
4. Martes	♐		Calor	----------
5. Miércoles	♑ 1		Calor/tierra	----------
6. Jueves	♒ 23	♃♉	Tierra/luz	Corpus Cristi ----------
7. Viernes	♒		Luz	----------
8. Sábado	♓ 18	♀♉	Luz/agua	---------- Tendencia a tempestad, día conflictivo.
9. Domingo	♓		Agua	Hoja a partir de las 12 h, tendencia a tormenta.
10. Lunes	♓	♉ 13	Agua	Hoja hasta las 11 h y a partir de las 15 h.
11. Martes	♈ 15		Agua/calor	Hoja hasta las 14 h, fruto a partir de las 15 h, tendencia a tempestad.
12. Miércoles	♈		Calor	Fruto, tendencia a tormenta.
13. Jueves	♉ 12		Calor/tierra	Fruto hasta las 11 h, raíz de 12 a 20 h. Día conflictivo.
14. Viernes	♉	☿ F	Tierra	Raíz a partir de las 5 h (♉ Varroa y escarabajo de la patata).
15. Sábado	♉		Tierra	Raíz.
16. Domingo	♊ 10	♒ 3 ♋ 5	Tierra/luz	Raíz hasta las 9 h, flor a partir de las 10 h. *Comienzo época de plantación.
17. Lunes	♊		Luz	Raíz, tendencia a terremoto y a granizo.
18. Martes	♋ 18		Luz/agua	Raíz hasta las 18 h, hoja a partir de las 19 h, tendencia a tempestad y a tormenta.
19. Miércoles	♋	Ag 7	Agua	----------
20. Jueves	♌ 13	☉–♊ ♂ ☊	Agua/calor	---------- Tendencia a tempestad.
21. Viernes	♌		Calor	----------
22. Sábado	♌		Calor	Fruto, tendencia a terremoto.
23. Domingo	♍ 11		Calor/tierra	Fruto hasta las 10 h, raíz a partir de las 11 h, tendencia a tempestad.
24. Lunes	♍		Tierra	Raíz, tendencia a tormenta.
25. Martes	♍	☊ 2	Tierra	Raíz a partir de las 4 h, tendencia a terremoto.
26. Miércoles	♍		Tierra	Raíz, tendencia a tormenta, día conflictivo.
27. Jueves	♎ 1		Luz	Flor a partir de la 1 h, tendencia a tempestad.
28. Viernes	♊ 8		Luz/agua	Flor hasta las 7 h, hoja a partir de las 8 h, tendencia a tempestad.
29. Sábado	♊		Agua	Hoja, tendencia a terremoto.
30. Domingo	♐ 11	☾ 8	Agua/calor	Hoja hasta las 10 h, fruto a partir de las 11 h, tend. a granizo y a terremoto. # Final época de plantación a las 7 h.

Calendario Agricultura Biodinámica 1996 – María Thun
http://www.editorialrudolfsteiner.com/

Anotaciones

Comentarios a Junio.

1.

Mercurio y Marte siguen todavía algunos días frente a Aries pero los días 3 y 6 respectivamente se sitúan frente a Tauro. Aumenta el peligro de noches frías. Esto trae miel de bosque pero también pulgones. Recoger el día 1 por la tarde los alacranes, incinerarlos y echar la ceniza el día 2 en sus galerías y nidos en estercoleros demasiado secos.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Los ritmos favorables de Venus para conseguir una buena calidad de heno y para la cría de reinas no llegan hasta Agosto, por lo que el apicultor debería aprovechar los dlas-flor y días-fruto para las abejas.
• *Época de plantación* días 1 y 2 y a partir del 16 de Junio. Las posiciones de los nodos se han comentado anteriormente.

9.

Acerca de los parásitos

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Primero necesitamos saber por qué determinados tipos de animales se vuelven parásitos. Para ello hace falta estudiar sus costumbres y condiciones de vida y así se pueden rectificar los fallos que se han cometido. Si a pesar de esto un animal se reproduce de tal manera que llega a ser una plaga, se le puede combatir de forma natural con su propio producto tras la incineración, con la ceniza. En este sentido se deben entender las recomendaciones en el calendario. La ventaja existe en que no hay que recurrir a sustancias biológicas, o incluso químicas sino que la regulación se efectúa a través del propio animal. En ratones, pájaros etc. no hace falta más que el pellejo o la piel de algunos ejemplares. Para insectos, babosas, etc. se hace de la manera siguiente:

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Se debe recolectar 50 ó 60 ejemplares del animal en cuestión. Se queman en un fuego de leña en las fechas en las que influyen las constelaciones apropiadas, las cenizas de la madera y de los animales quemados se dinamizan juntos durante una hora en un mortero. Añadimos entonces un gramo de esta mezcla de cenizas dinamizadas a una botella con nueve gramos de agua y la agitamos durante tres minutos. Así obtendremos la potencia decimal D.1. Añadiendo 90 gramos de agua a estos 10 de la D.1. y agitando otros tres minutos tendremos la D.2.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Siguiendo este método sucesivamente nos encontraríamos que para llegar a una D.8. tendríamos que manejar una cantidad de unos 10.000 litros y como esto no es posible partimos otra vez de un gramo. Utilizando una D.8. hemos observado un retroceso importante de la plaga siempre que las pulverizaciones se han hecho con gotas muy finas y en corto espacio de tiempo, como por ejemplo tres pulverizaciones cada tarde durante tres tardes seguidas. Nos han informado que los resultados obtenidos con diferentes animales han sido excelentes.

30.

DIAS DE SIEMBRA. JULIO 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Lunes		☉ – ♊ ☺ 5 Pg 23	Calor	♀ ♌ Tendencia a tempestad.
2. Martes	10		Calor/tierra	Raíz a partir de las 10 h, tendencia a terremoto.
3. Miércoles			Tierra	Raíz
4. Jueves	7		Tierra/luz	Raíz hasta las 6 h, fruto a partir de las 7 h.
5. Viernes			Luz	Flor, tendencia a tempestad.
6. Sábado	1		Luz/agua	Hoja a partir de la 1 h.
7. Domingo		♉ 14	Agua	Hoja hasta las 12 h y a partir de las 16 h, tendencia a erupción.
8. Lunes	20		Agua/calor	Fruto, tendencia a tormenta y a terremoto.
9. Martes			Calor	Fruto, día conflictivo.
10. Miércoles	18		Calor/tierra	Fruto hasta las 17 h, raíz a partir de las 18 h.
11. Jueves			Tierra	Raíz, tendencia a temporal y a terremoto.
12. Viernes		♀ F	Tierra	Raíz a partir de las 12 h.
13. Sábado	16	♋ 12	Tierra/luz	Raíz hasta las 15 h, flor a partir de las 16 h, *Comienzo época de plantación a las 16 h.
14. Domingo			Luz	Flor.
15. Lunes		♍ 17	Luz	Flor.
16. Martes	1	Ag 15	Luz/agua	Flor hasta las 16 h, hoja a partir de las 17 h. Tendencia a tempestad.
17. Miércoles	19		Agua/calor	Hoja hasta las 18 h, fruto a partir de las 19 h.
18. Jueves			Calor	Fruto.
19. Viernes		☉ – ♋	Calor	Fruto hasta las 15 h, hoja a partir de las 16 h.
20. Sábado	18		Calor/tierra	Hoja hasta las 7 h, fruto de 8 a 17 h, raíz a partir de las 18 h, tendencia a granizo.
21. Domingo			Tierra	Raíz, tendencia a tempestad.
22. Lunes		♌ 4	Tierra	Raíz hasta las 2 h y de 6 a 12 h, hoja a partir de las 13 h.
23. Martes			Tierra	Hoja hasta las 4 h, raíz a partir de las 5 h, día conflictivo, tend. a terremoto.
24. Miércoles	9		Tierra/luz	Raíz hasta las 8 h, flor a partir de las 9 h, tendencia a tempestad.
25. Jueves	18		Luz/agua	Flor hasta las 12 h, hoja a partir de las 13 h, tendencia a tempestad.
26. Viernes			Agua	Hoja.
27. Sábado	21	♎ 20	Agua/calor	Hoja hasta las 20 h, fruto a partir de las 21 h. # Final época de plantación a las 18 h.
28. Domingo			Calor	Fruto.
29. Lunes	21		Calor	Fruto hasta las 20 h, tendencia a tempestad.
30. Martes		Pg 9 ☺ 11	Tierra	Hoja a partir de las 15 h, tendencia a granizo.
31. Miércoles	17		Tierra/luz	Raíz hasta las 16 h, flor a partir de las 17 h.

Anotaciones

Comentarios a Julio.

Mercurio atraviesa Géminis hasta el día 15, pasa rápidamente frente a Cáncer para llegar el 25 frente la constelación de Leo que puede poner en práctica sus intenciones calurosas.

Esto sobre todo le viene bien a la calidad de las simientes de los cereales.

Venus está aún frente a Ta uro y fomentado por Marte nos traerá noches frescas. El 24 Marte la deja y se sitúa frente a Géminis. Los otros planetas más arriba del Sol permanecerán frente a las constelaciones como se ha descrito anteriormente.

• *Época de plantación* del 13 al 27 de Julio. Los dias-hoja *se* pueden aprovechar otra vez para la siembra de diferentes tipos de lechugas. En la cosecha de bayas se deberían evitar los días-hoja.

Para el apicultor:

La alimentación invernal de las abejas

Para la alimentación invernal de las abejas se recomienda adicionalmente las infusiones de plantas que respecto a la salud de las abejas se han probado durante muchos años: las de las flores de milenrama, manzanilla, diente de león y valeriana. Se prepara una infusión con agua hirviendo y se sacan las hierbas al cabo de 15 minutos.

Se pone ortiga, cola de caballo y corteza de roble en agua fría y se hace hervir, después de 10 minutos de estar en infusión se sacan las hierbas y se añade esta infusión al líquido alimenticio. Diez gramos de cada planta es suficiente para 100 litros del líquido alimenticio.

Complemento a "Parásitos".

En apariciones masivas de parásitos se obtiene muchas veces los mejores resultados incinerándolos en los sitios en que aparecen. Por ejemplo los pulgones y los gorgojos del manzano se cazan con el matamoscas y se incineran donde estén.

DIAS DE SIEMBRA. AGOSTO 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Jueves		☉–♋	Luz	Flor, tendencia a erupciones y a granizo, del dia 2 al 7 tend. a tempestad.
2. Viernes	♓ 9		Luz/agua	Flor hasta las 8 h, hoja a partir de las 9 h, tend. a tempestad y a tormenta.
3. Sábado	♓	♉ 17	Agua	Hoja hasta las 15 h y a partir de las 19 h.
4. Domingo	♓		Agua	Hoja, tendencia a erupciones.
5. Lunes	♈ 3		Agua/calor	Hoja hasta las 2 h, fruto a partir de las 3 h.
6. Martes	♈		Calor	Fruto hasta las 23 h, tendencia a tormenta.
7. Miércoles	♉		Tierra	Fruto.
8. Jueves	♉	♀ ♉	Tierra	----------, tendencia a terremoto y a tormenta.
9. Viernes	♊ 22	☾ 19	Tierra/luz	Raíz de 6 a 21 h, flor a partir de las 22 h, * Época de plantación a partir de las 19 h.
10. Sábado	♊	☉–☊	Luz	Flor.
11. Domingo	♊		Luz	Flor.
12. Lunes	♋ 7	Ag 18	Luz/agua	Flor hasta las 19 h, hoja a partir de las 20 h.
13. Martes	♋		Agua	Hoja, tendencia a tormenta.
14. Miércoles	☊ 1	♍ 9	Agua/calor	Fruto a partir de la 1 h, dia conflictivo, tend. a erupciones
15. Jueves	☊		Calor	Fruto.
16. Viernes	♍ 23	♀ F	Calor/tierra	Fruto hasta las 14 h y a partir de las 20 h.
17. Sábado	♍		Tierra	Raíz, tendencia a erupciones.
18. Domingo	♍	☊ 6	Tierra	Raíz hasta las 4 h y a partir de las 8 h, tendencia a granizo.
19. Lunes	♍		Tierra	Raíz, tendencia a terremoto.
20. Martes	♎ 16		Tierra/luz	Raíz hasta las 15 h, flor a partir de las 16 h.
21. Miércoles	♎		Luz	Flor.
22. Jueves	♏ 1		Luz/agua	Hoja a partir de la 1 h.
23. Viernes	♏		Agua	Hoja, tendencia a tempestad y a erupciones.
24. Sábado	♐ 6	☽ 5	Agua/calor	Hoja hasta las 5 h, fruto a partir de las 6 h, # Final época de pl., tend. tempest. y terrem.
25. Domingo	♐		Calor	Fruto.
26. Lunes	♑ 7		Calor/tierra	Fruto hasta las 6 h, raíz a partir de las 7 h.
27. Martes	♑	Pg 18	Tierra	--------- Dia conflictivo.
28. Miércoles	♒ 4	☺ 19	Tierra/luz	Raíz hasta las 12 h, flor a partir de las 13 h.
29. Jueves	♓ 20		Luz/agua	Flor hasta las 19 h, hoja a partir de las 20 h.
30. Viernes	♓	♉ 24	Agua	Fruto hasta las 22 h, tendencia a tormenta.
31. Sábado	♈ 22		Agua/calor	Fruto de 2 a 6 h, hoja de 7 a 21 h, fruto a partir de las 22 h.

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios a Agosto.

En la primera mitad del mes de las cosechas Agosto Mercurio frente a Leo influye en que sea de buena calidad la cosecha de cereales y fruta. El 18 se sitúa frente a Virgo anunciando el otoño con sus formaciones de niebla. Venus abandona la constelación de Tauro dirigiéndose a Géminis el día 6. Esto es una época de fiesta para ella ya que ahora puede desplegar plenamente sus cualidades luminosas durante el día. Esto mejorará la calidad alimenticia para los animales en el segundo corte de heno. En las abejas se podría añadir la alimentación en este tiempo porque habrá un buen desarrollo otoñal si se ha sembrado lo suficientemente temprano "plantas de abejas" de las que pueden recoger aún algo de polen. Globalmente visto, podría tener una influencia positiva en el desarrollo del otoño y del invierno.

Marte se ha adelantado a Venus el 24 y permanecerá todo el mes de Agosto frente a Géminis. Ambos planetas están en oposición con Júpiter frente a Sagitario. Esto tendrá como efecto concentraciones de luz y de calor que en parte son fomentadas todavía por trígonos de calor.

Recolección y conservación

Para la recolección y la elaboración de frutos para almacenar o conservar se recomienda evitar los días-hoja y los períodos que en el calendario se han señalado con ---. Lo mismo vale también para la preparación de zumo, jalea, mermelada, frutos secos, verdura cuajada o chucrut. Se puede cocer el zumo de ciruelas, cerezas, escaramujos, manzanas y peras con azúcar y se obtendrá una mermelada maravillosa. Sin embargo, si los frutos se han recogido en los días arriba mencionados saldrá moho al cabo de poco tiempo. En la recolección de flores y hojas para infusiones se deben evitar estos períodos también, ya que pierden mucho de su armonía. Para todas las actividades mencionadas, los días-flor y los días-fruto son los más idóneos.

DIAS DE SIEMBRA. SEPTIEMBRE 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Domingo	♈	☉ – ☊	Calor	Fruto (muy favorable), tendencia a terremoto.
2. Lunes	♈		Calor	Fruto (muy favorable), tendencia a terremoto.
3. Martes	♉ 7		Calor/tierra	Fruto hasta las 6 h, raíz a partir de las 7 h.
4. Miércoles	♉		Tierra	Raíz.
5. Jueves	♉		Tierra	Raíz.
6. Viernes	♊ 5	♌ 2	Tierra/luz	Raíz hasta las 4 h, flor a partir de las 5 h. *Comienzo época de plantación a las 2 h.
7. Sábado	♊		Luz	Hoja.
8. Domingo	♋ 13		Luz/agua	Flor hasta las 12 h, hoja a partir de las 13 h, tendencia a tormenta.
9. Lunes	♋	Ag 3	Agua	Flor hasta las 7 h, hoja a partir de las 8 h.
10. Martes	☊ 8		Agua/calor	Hoja, tendencia a erupciones, día conflictivo.
11. Miércoles	☊		Calor	Raíz hasta las 8 h, hoja a partir de las 9 h.
12. Jueves	☊	♍ 24	Calor	Hoja hasta las 3 h, fruto a partir de las 4 h.
13. Viernes	♍ 5		Calor/tierra	Fruto hasta las 4 h, raíz a partir de las 5 h.
14. Sábado	♍	☊ 10	Tierra	Raíz hasta las 8 h y a partir de las 12 h.
15. Domingo	♍	☉ – ♍	Tierra	Raíz.
16. Lunes	♎ 21		Tierra/luz	Raíz hasta las 20 h, hoja a partir de las 21 h.
17. Martes	♎		Luz	Hoja hasta las 12 h, flor a partir de las 13 h.
18. Miércoles	♏ 6		Luz/agua	Flor hasta las 5 h, hoja a partir de las 6 h.
19. Jueves	♏		Agua	Hoja.
20. Viernes	♐ 13	♋ 12	Agua/calor	Hoja hasta las 12 h, fruto a partir de las 13 h, # Final época de plant. a las 11 h, tempest.
21. Sábado	♐		Calor	Fruto, tendencia a tempestad.
22. Domingo	♑ 16		Calor/tierra	Fruto hasta las 15 h, raíz a partir de las 16 h.
23. Lunes	♑		Tierra	Raíz.
24. Martes	♒ 14	Pg 23	Tierra/luz	----------
25. Miércoles	♒		Luz	Flor a partir de las 10 h.
26. Jueves	♓ 6		Luz/agua	Flor hasta las 5 h, hoja a partir de las 6 h.
27. Viernes	♓	♀ ☊ ☺ ♉ 10	Agua/calor	------- Eclipse --------.
28. Sábado	♈ 22		Agua/calor	Hoja hasta las 21 h, fruto a partir de las 22 h, tendencia a terremoto.
29. Domingo	♈	♀ ☊	Calor	---------- Tendencia a granizo.
30. Lunes	♉ 17		Calor/tierra	Fruto hasta las 16 h, raíz a partir de las 17 h.

Anotaciones

Comentarios a Septiembre.

Mercurio es retrogrado frente a Virgo y vuelve a Leo el 19 con calor veraniego. Venus abandona su posición preferida frente a Géminis situándose el día 4 frente a Cáncer. Marte le sigue el día 5, permaneciendo 5 semanas frente a esta constelación acuosa donde se encuentra muy a gusto animando la vida de las babosas. En la última decena se encuentran Mercurio y Venus frente a Leo. Intentarán armonizar las fuerzas acuosas de Marte. Dos oposiciones a principios de mes podrían traer mucho calor. Cinco trígonos acuosos nos proporcionarán humedad. El día 23 es muy propicio para recoger patatas y raíces comestibles para conservarlas en invierno; hay peligro de heladas nocturnas. La última semana es muy favorable para la recolección de la fruta, hay que evitar los períodos desfavorables.

Compost de malas hierbas

Muchas veces oímos quejas de que el compost de malas hierbas aumenta el desarrollo de éstas.
Si se pone semillas de malas hierbas o malas hierbas floridas en el compost, hay que mantenerlo bien húmedo. Cuando empieza a calentarse brotan las semillas de las malas hierbas pero como faltan las condiciones vitales necesarias, se mueren los brotes. En la transformación de las sustancias se abre la albúmina y se descompone en diferentes sustancias. De este modo el compost de malas hierbas contiene aproximadamente la mitad de nitrógeno del abono animal, o sea una sustancia muy valiosa.

Complemento a la clasificación de las plantas:

En algunas plantas no queda aún muy clara su clasificación. Las cebollas y remolachas rojas sembradas en días-raíz y días-hoja tiene un rendimiento similar pero las de dias-raíz se conservan mejor en el almacén durante el invierno. Colinabos y coliflor pertenecen a los días-hoja así como el hinojo. El brócoli es más hermoso y más fuerte en días-flor.

DIAS DE SIEMBRA. OCTUBRE 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Martes		☉ – ♍	Tierra	Raiz, tendencia a tempestad.
2. Miércoles			Tierra	Raiz
3. Jueves	♊ 13	♒ 10	Tierra/luz	Raíz hasta las 12 h, flor a partir de las 13 h, * Comienzo época de plantación a las 10 h.
4. Viernes			Luz	Flor, tendencia a tempestad y erupciones.
5. Sábado	♋ 20		Luz/agua	Flor hasta las 19 h, hoja a partir de las 20 h.
6. Domingo		Ag 19	Agua	Hoja hasta las 12 h, flor a partir de las 13 h.
7. Lunes	♌ 15		Agua/calor	Hoja hasta las 14 h, fruto a partir de las 15 h.
8. Martes			Calor	Fruto.
9. Miércoles			Calor	Raíz hasta las 16 h, fruto a partir de las 17 h, tend. a erupciones y tormenta.
10. Jueves	♍ 13		Calor/tierra	----------
11. Viernes		♉ 18	Tierra	Raiz de 3 a 16 y a partir de las 20 h.
12. Sábado		☉ F ♒ 15	Tierra	Raiz hasta las 10 h, fruto a partir de las 22 h, tend. a terremoto.
13. Domingo			Tierra	Raiz.
14. Lunes	♎ 3		Tierra/luz	Raíz hasta las 2 h, flor a partir de las 3 h.
15. Martes	♏ 12		Luz/agua	Flor hasta las 11 h, hoja a partir de las 12 h.
16. Miércoles			Agua	Hoja.
17. Jueves	♐ 18	♋ 18	Agua/calor	Hoja hasta las 17 h, fruto a partir de las 18 h, # Final época de plant. a las 17 h, tormenta.
18. Viernes			Calor	Fruto, tendencia a tempestad, terremoto y erupciones.
19. Sábado	♑ 22		Calor/tierra	Fruto hasta las 21 h, raiz a partir de las 22 h, tendencia a erupciones.
20. Domingo			Tierra	Raiz, dia conflictivo.
21. Lunes	♒ 21		Tierra/luz	Raiz hasta las 20 h, tendencia a granizo.
22. Martes		Pg 10	Luz	---------- Dia conflictivo.
23. Miércoles	♓ 15		Luz/agua	Flor hasta las 14 h, hoja a partir de las 15 h, tend. a tempestad, tormenta y terremoto.
24. Jueves		♌ 19	Agua	Hoja hasta las 17 h y a partir de las 21 h, tend. a tempestad.
25. Viernes			Agua	Hoja, tendencia a terremoto.
26. Sábado	♈ 8	♏ 15	Agua/calor	Hoja hasta las 10 h, fruto a partir de las 11 h, dia conflictivo.
27. Domingo			Calor	Fruto, tendencia a tormenta.
28. Lunes	♉ 2		Calor/tierra	Fruto hasta la 1 h, raiz a partir de las 2 h.
29. Martes			Tierra	Raiz.
30. Miércoles	♊ 21	♒ 19	Tierra/luz	Raíz, * Comienzo época de plantación a las 19 h.
31. Jueves			Luz	Flor, tendencia a tempestad.

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios a Octubre.

Mercurio deja la constelación de Leo el día 3 y se sitúa frente a Virgo. Venus permanecerá hasta el 23 frente a Leo y se sitúa entonces frente a Virgo. Marte está al principio frente a Cáncer pero el día 9 se sitúa frente a Leo donde se calmarán sus efectos acuosos. Diferentes posiciones trígono impulsan los elementos de diferente manera. Puesto que durante todo el mes se encuentran aún planetas frente a Leo tendremos períodos favorables para realizar las siembras otoñales de cereales en el Hemisferio Norte así como para las siembras de primavera en el Hemisferio Sur. En el Hemisferio Sur no abundan buenas condiciones para el desarrollo de las abejas.
La posición de trígono de Saturno con Plutón frente a una constelación acuosa podría causar una prevalencia del elemento acuoso en la tercera decena. Por este motivo, el agricultor no debería dejar trabajos importantes para este tiempo.

Los días del 18 al 30 son favorables para la recogida de la fruta; son preferibles los días-fruto y los días-flor.
• *Época de plantación* del 3 al 17. Los días-raíz de este período son propicios para recoger frutos-raíz destinados al almacenaje. El día 30 es recomendable para plantar abedul, tuya, enebro y carpe.

La elaboración del pan

Aquí las condiciones son parecidas a las de las leche. El pan hecho en días-hoja no sube bien, no tiene buen sabor y no sienta tan bien. Los días-luz y los días-calor son los más propicios para la elaboración de la masa y el proceso de cocción, además es el pan que mejor sienta. Perigeo (Pg), nodos y eclipses son desfavorables.

DIAS DE SIEMBRA. NOVIEMBRE 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Viernes	♊	☉ – ♎	Luz	Flor, *época de plantación, tend. a tempestad.
2. Sábado	♋ 5		Luz/agua	Flor hasta las 4 h, hoja a partir de las 5, tend. a erupciones
3. Domingo	☊ 23	Ag 15	Agua/calor	Flor hasta las 16 h, hoja de 17 a 22 h, día conflictivo
4. Lunes	☊	☿ ♉	Calor	----------
5. Martes	☊		Calor	Fruto a partir de las 8 h, dia conflictivo.
6. Miércoles	♍ 21		Calor/tierra	Fruto hasta las 20 h, raiz a partir de las 21 h, tend. a tempestad.
7. Jueves	♍		Tierra	Raíz hasta las 23 h, día conflictivo.
8. Viernes	♍	☊ 1	Tierra	Raíz a partir de las 3 h.
9. Sábado	♍		Tierra	Raiz, tendencia a terremoto, día conflictivo.
10. Domingo	♎ 12		Tierra/luz	Raiz hasta las 11 h, flor a partir de las 12 h.
11. Lunes	♏ 20	♒ 5	Luz/agua	Flor hasta las 19 h, hoja a partir de las 20 h, día conflictivo.
12. Martes	♏		Agua	Hoja, tendencia a erupciones y tormenta.
13. Miércoles	♏	♑ 24	Agua	Hoja. # Final época de plantación a las 23 h.
14. Jueves	♐ 1		Agua/calor	Fruto de 1 a 20 h, hoja a partir de las 21 h.
15. Viernes	♐		Calor	Hoja hasta las 10 h, fruto de 11 a 18 h.
16. Sábado	♑ 3	Pg 6	Calor/tierra	Raiz a partir de las 18 h.
17. Domingo	♑		Tierra	Raiz.
18. Lunes	♒ 2		Tierra/luz	Raíz hasta la 1 h, flor a partir de las 2 h, tend. a terremoto.
19. Martes	♓ 21		Luz/agua	Flor hasta las 20 h, hoja a partir de las 21 h. Tendencia a terremoto.
20. Miércoles	♓		Agua	Hoja hasta las 23 h, tendencia a tempestad y erupciones.
21. Jueves	♓	♉ 1	Agua	Hoja a partir de las 3 h, tendencia a tempestad y terremoto.
22. Viernes	♈ 16		Agua/calor	Hoja.
23. Sábado	♈		Calor	Fruto.
24. Domingo	♉ 11		Calor/tierra	Fruto hasta las 10 h, raíz a partir de las 11 h, tendencia a tormenta.
25. Lunes	♉	♋ 5	Tierra	Raiz, tendencia a tormenta.
26. Martes	♉		Tierra	Raiz.
27. Miércoles	♊ 6	♌ 4	Tierra/luz	Raiz hasta las 5 h, flor a partir de las 6 h, *Com. época de plant., día confl., tempestad.
28. Jueves	♊		Luz	Flor.
29. Viernes	♋ 13		Luz/agua	Flor hasta las 12 h, hoja a partir de las 13 h.
30. Sábado	♋		Agua	Hoja, tendencia a erupciones.

Anotaciones

Comentarios a Noviembre.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mercurio está frente a libra, el 13 se sitúa frente a la constelación acuosa de Escorpio. Venus frente a Virgo significa abundante formación de nieblas. Marte está frente a Leo. La primera mitad de mes es especialmente favorable para plantar árboles frutales. En esto se debería considerar también los impulsos de los elementos y la época de plantación determinada por la Luna. Lo mismo vale para la recogida de la fruta de variedades tardías. Aquí se recomienda el tiempo en el que la Luna asciende y preferiblemente cuando está frente a Sagitario y Aries. Los días-flor de la primera mitad del mes son propicios para plantar bulbos de flores. En según qué sitios se puede incluir el primer período de Diciembre.

• *Época de plantación* del 1 al 13 y del 17 al 30 de Noviembre. Este periodo es favorable para podar árboles, viñas y arbustos de bayas (preferir los dias-fruto y los dias-flor), para abonar los prados y pastos para arar para el invierno. También se puede cortar madera de construcción. Si se quiere talar ya el árbol tan temprano se pueden recomendar los días 14/15, 18/19 y el 13.

Referente a los comentarios de Mayo y Junio:

Para el agricultor crece el peligro de una invasión de pulgones. Debido a las noches frías, las savias en las plantas son retenidas, lo que causa la formación de azúcar en la hoja, o sea, las mejores condiciones para la multiplicación de diferentes tipos de pulgones. Habría que cuidar que las savias en las plantas fluyan bien. En el huerto se podría regar por la tarde y añadir al agua una infusión de ortiga. En el campo y en plantaciones de frutales se puede rociar el Preparado Maria Thun por la tarde. También se puede recomendar las infusiones de las plantas de los preparados. En este caso se rocían por la tarde en el suelo de modo que su efecto llegue a las plantas con la subida matutina de las savias.

DIAS DE SIEMBRA. DICIEMBRE 1996

Fecha	Luna frente a la constelación	Otras posiciones	Elemento	Organo de la planta estimulado y predicción meteorológica
1. Domingo	♌ 10	☉ – ♏ Ag 12	Agua/calor	Flor hasta las 13 h, fruto a partir de las 14 h, *época de plant., tend. a tempestad y torm.
2. Lunes	♌		Calor	Fruto, tendencia a terremoto, día conflictivo.
3. Martes	♌		Calor	Fruto.
4. Miércoles	♍ 6		Calor/tierra	Fruto hasta las 5 h, raíz a partir de las 6 h, día conflictivo.
5. Jueves	♍	☊ 6	Tierra	Raíz.
6. Viernes	♍		Tierra	Raíz, tendencia a terremoto.
7. Sábado	♎ 21		Tierra/luz	Raíz hasta las 20 h, flor a partir de las 21 h.
8. Domingo	♎		Luz	Fruto, tendencia a tormenta.
9. Lunes	♏ 5		Luz/agua	Flor hasta las 4 h, hoja a partir de las 5 h, día conflictivo.
10. Martes	♏	♒ 18	Agua	Hoja.
11. Miércoles	♐ 9	☽ 10	Agua/calor	Hoja hasta las 8 h, fruto desde las 9 h, # Final época de plant., a las 9 h. erupc., terrem., tempest.
12. Jueves	♐		Calor	Fruto hasta las 17 h, día conflictivo.
13. Viernes	♑ 10	Pg 5	Calor/tierra	---------- Raíz a partir de las 18 h.
14. Sábado	♑		Tierra	Raíz.
15. Domingo	♒ 8		Tierra/luz	Raíz hasta las 7 h, flor a partir de las 8 h.
16. Lunes	♒		Luz	Flor.
17. Martes	♓ 3		Luz/agua	Hoja hasta las 23 h.
18. Miércoles	♓	☊ 1	Agua	Hoja a partir de las 3 h, tendencia a tempestad.
19. Jueves	♈ 22	☉ – ♐	Agua/calor	Hoja hasta las 21 h, fruto a partir de las 22 h.
20. Viernes	♈		Calor	Fruto.
21. Sábado	♉ 18		Calor/tierra	Fruto hasta las 17 h, raíz a partir de las 18 h, día conflictivo.
22. Domingo	♉		Tierra	Raíz tendencias a erupciones.
23. Lunes	♉		Tierra	Raíz, día conflictivo.
24. Martes	♊ 14	♋ 13 ♓ 22	Tierra/luz	---------- (☿ ☊) Tendencia a erupciones, día conflictivo.
25. Miércoles	♊	Navidad	Luz	Flor, *Comienzo época de plantación a las 2 h.
26. Jueves	♋ 20		Luz/agua	Flor hasta las 19 h, hoja a partir de las 20 h, tendencia a terremoto.
27. Viernes	♋		Agua	Hoja, tendencia a tempestad.
28. Sábado	♌ 15		Agua/calor	Hoja hasta las 14 h, flor a partir de las 15 h.
29. Domingo	♌	Ag 7	Calor	Flor hasta las 8 h, fruto a partir de las 9 h.
30. Lunes	♌		Calor	Fruto.
31. Martes	♍ 14		Calor/tierra	Fruto hasta las 13 h, raíz a partir de las 14 h. Tendencia a tempestad y tormenta.

Anotaciones

Comentarios a Diciembre.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Mercurio se sitúa el día 3 frente a Sagitario donde se siente a gusto en su elemento caluroso. El 24 empieza su retrogradación. Venus permanece aún frente a Libra lo que ilumina mucho las tristes semanas pre invernales. El 15 se sitúa frente a Escorpio y con su constelación nos proporciona el 22 la posibilidad de regular animales que causan mucho daño (ratones y sus parientes, pero también pájaros qua se pueden convertir en una plaga (ver "Parásitos"). Marte permanecerá hasta mitad de mes frente a Leo y después se sitúa frente a Virgo. Quien se traiga el árbol de Navidad del propio bosque o del jardín debe escoger los días 11/11, 15/16, 19/10 o el 14 entre las 11 h y las 14 h a fin de poder disfrutar del maravilloso aroma del bosque en Navidades.

• *Época de plantación* del 1 al 10 y a partir del 15 de Diciembre. Época favorable para podar árboles, setos y viñas y para talar árboles de construcción.

Épocas de tala para maderas especiales:

01-11-96 ------- Fresno, olmo, alerce y robinia.
16-11-96 ------- Olmo, alerce, acacia y robinia.
24-11-96 ------- Fresno, cedro y abeto.
20-12-96 ------- Abedul.
24-12-96 ------- Naturalmente como antes he comentado el árbol de Navidad entre las 11 h y las 14 h.

Deseamos a nuestros lectores felices Navidades y un sano y próspero Año Nuevo 1997

WALA

DE LA NATURALEZA
PARA EL SER HUMANO

Cosméticos Dr. Hauschka

Salud y belleza para nuestra piel

PREPARADOS ESPECIALES PARA:
Cuidados cutáneos, pieles con problemas,
cuidados corporales; tratamiento capilar,
cuidados de pies y piernas

Representación para España:
Distribuciones Fahle
Cal Miret 92
08731 Sant Martí Sarroca
(Barcelona)
Tel y fax 93 899 16 06

DR. HAUSCHKA

LABORATORIO

WELEDA

acorde con el ser humano y la naturaleza

* **PREPARADOS FARMACEUTICOS ANTROPOSOFICOS Y HOMEOPATICOS**

* **DIETETICA** — **Jugos y Jarabes**

* **COSMETICA**
Cuidados del bebé
Higiene corporal
Cuidados del rostro
Cuidados especiales
Gama buco-dental
Cuidados para el afeitado
Cuidados del cabello

La constante dedicación e investigación de Weleda, se ha orientado hacia fórmulas originales y naturales, según métodos tradicionales, ampliados por el método desarrollado por la medicina antroposófica y asociados a una tecnología moderna adaptada a la fabricación de productos naturales. La materia prima procede de cultivos biodinámicos y biológicos y está exenta de editivos de síntesis tales como conservantes, colorantes o perfumes artificiales, siguiéndose un control riguroso en todo el proceso

De venta en farmacias y tiendas de productos naturales

MANUEL TOVAR, 3 • E-28034 MADRID • TEL. 91/358 03 58 • FAX 91/358 12 47