EL ORIGINAL
DESDE HACE 42 AÑOS

Maria Thun

CALENDARIO DE AGRICULTURA BIODINÁMICA 2004

A PARTIR DE ENSAYOS CON LAS CONSTELACIONES

ELABORADO CONJUNTAMENTE POR
MARIA THUN Y MATTHIAS K. THUN

Friedrich y Titia mostrando el calendario

Contenido

Instrucciones para el uso del calendario	4
Generalidades del año 2004	5
Walter Thun, Montaña de dedalera, oleo	7
Fuerzas universales y fuerzas centrales en la formación del clima	8
Los elementos clásicos. Tierra, Agua, Aire/Luz y Calor	9
Siembra de Rabanitos del 28-03-03	12
El zodiaco y los trígonos	13
La Luna sideral	14
Clasificación de las plantas para la siembra. Cuidados y cosecha	15
Los periodos desfavorables	15
La Luna ascendente y descendente y la época de plantación	16
Sobre el hemisferio Sur	17
Enero y comentarios. La elaboración de la leche	18
Febrero y comentarios. Las plagas de hongos en las plantas	20
Marzo y comentarios. Elaboración de pan de centeno	22
Abril y comentarios. Recolección de plantas de los preparados biodinámicos	24
Parásitos animales.	26
Mayo y comentarios	27
Junio y comentarios. La alimentación de las abejas	29
Julio y comentarios. La recolección y el almacenamiento	31
Agosto y comentarios. Las fresas	33
Septiembre y comentarios. Cosecha de fruta	35
Octubre y comentarios.	37
Noviembre y comentarios.	39
Tiempo de siembra para árboles y arbustos 2004	40
Diciembre y comentarios.	41
El cuidado de las abejas	43
Comentarios mensuales para el apicultor	44
Ensayos de cosecha de diente de león entre Viernes Santo y Lunes de Pascua	45
Paso de Mercurio ante el disco solar el 7-05-2003	47
Eclipse solar el 31-05-2003	49
¿Cómo utilizar en la práctica los ritmos ascendentes y descendentes? Tiempo de plantación	50
Ensayo por horas con trigo de verano 2003	55
Ensayo con patatas 2003	56
Ensayo por horas con espinacas el 8 de mayo	57
Ensayo por horas con cebada desnuda el 8 de mayo	58
Las hormigas	60
Cuidado de parcelas de frutales, vides y matorrales de frutos de baya	61
Notas bibliográficas. Bibliografía	63
Asociación de Agricultura Biodinámica de España	63
Pedidos de preparados biodinámicos	63

Instrucciones para el uso de este Calendario

A menudo recibimos consultas de lectores que tienen dificultades para interpretar las indicaciones de los meses. Por lo general preguntan por las cifras, que se refieren a las horas del día. Rogamos lean atentamente esta página, donde encontrará respuesta a esas preguntas. Gracias.

- Junto a la fecha y el **día** de la semana está indicada la **constelación** zodiacal ante la que se encuentra la **Luna** durante ese día, con la hora de entrada en dicha constelación. La Luna permanece ante esta constelación hasta que se indica una nueva.
- En la siguiente columna están indicadas otras **posiciones importantes**, por ejemplo para el desarrollo de la planta.
- En la columna tercera se indica especialmente al **apicultor** cuál es el **elemento** más estimulado por la Luna en ese día. Las influencias de calor en tiempos de tormenta se citan como «Tendencia a tormenta» (Ta) en la columna quinta.
- En la columna curta se indica el órgano de desarrollo de la planta que está favorecido por la siembra y los trabajos de cultivo en ese día, con las horas exactas. Si después del órgano no aparece ninguna hora, entonces actúa durante todo el día.
- Por último, en la columna quinta aparecen abreviados otros fenómenos naturales o predicciones meteorológicas que afectan a la disposición general del clima.

Cuando en un mismo día se mencionan elementos diferentes de los que corresponderían a la posición lunar en ese momento, **no se trata de errores** sino de alteraciones debidas a otras **posiciones cósmicas, que modifican y se superponen al impulso lunar-zodiacal** y asimismo favorecen a otro órgano de la planta.
Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa y pueden ser convertidas a la «hora local» en otros continentes.

El cambio de horario de verano no está considerado: Del 27 de marzo al 30 de octubre sumar 1 hora a las dadas en este Calendario.

Símbolos astronómicos y Abreviaturas

Constelación	*Planetas*		*Posición*	*Tendencia a*	
♓ Piscis	☉ Sol	☺	Luna llena	Td	Tempestad
♈ Aries	♁ Tierra	●	Luna Nueva	Ta	Tormenta
♉ Tauro	♀ Venus	☊	Nodo ascendente	To	Terremoto
♊ Géminis	☿ Mercurio	☋	Nodo descendente	DC	Día conflictivo
♋ Cáncer	♂ Marte	◠	Luna descendente	E	Erupción
♌ Leo	♃ Júpiter	◡	Luna ascendente	M	Mal Tiempo
♍ Virgo	♄ Saturno	Pg	Perigeo (luna cerca)	Q	Quintil
♎ Libra	♅ Urano	Ag	Apogeo (luna lejos)	❑	Cuadratura
♏ Escorpio	♆ Neptuno	●	Eclipse		
♐ Sagitario	♇ Plutón	●	Eclipse		Trasplante
♑ Capricornio	☍ Oposición	△	Trigono		
♒ Acuario	☌ Conjunción				

Generalidades del año 2004

En las previsiones del año 2003 pudimos respirar tranquilos, ya que se esperaba una mayor intensidad de Luz y Calor que en los años anteriores, durante los cuales, el clima quedaba marcado por los ritmos planetarios y constelaciones en las que dominaban los elementos de Agua y Tierra. En los meses de abril, mayo y junio, el mercurio de los termómetros subió en ocasiones hasta 30° C y más. El calor fue seguido de tormentas con chubascos, de granizo y de inundaciones que ocasionaron muchos daños.

El año anterior, hablamos de los movimientos retrógrados de Mercurio, que en el año 2003 pasaría por constelaciones de Calor, produciendo un aumento de temperaturas. Si bien tuvimos las temidas heladas nocturnas, las temperaturas entre el día y la noche variaron entre 25ºC y 30ºC.

Los trígonos planetarios de Cáncer y Escorpio ocasionaron precipitaciones en las que se recogieron hasta 25 y 30 litros de agua por metro cúbico en media hora.

En el año 2004, la situación vuelve a cambiar. Mercurio pasa a finales del año 2003 ante la constelación de Calor de Sagitario, pero ya a principios del 2004 retrocede ante Escorpio. Tenemos el primer desplazamiento ante una constelación de Agua. Su siguiente movimiento retrógrado empieza ante la región de Calor de Aries. Desde allí retrocede ante Piscis. El tercer movimiento retrógrado, permanece ante la gran región de Calor de Leo, calentando fuertemente en verano. Pero en el cuarto movimiento retrógrado, no llega hasta Sagitario, si no que se queda ante Escorpio. Durante este tiempo, pasaran ante el Sol, Venus, Marte y Plutón. Es decir, que las temporadas de calor de Mercurio se acortan fuertemente, produciéndose probablemente más precipitaciones.

Venus se para poco tiempo ante las regiones de Luz, ante las que normalmente desarrolla todas sus fuerzas de luz. Durante el 2004, sus movimientos retrógrados serán ante la fría región de Tauro (esto sucede cada ocho años). Allí permanecerá entre el 27 de marzo y el 7 de agosto, por lo que su estancia ante la región de Luz de Géminis será sólo de un mes, un momento que tanto esperan los agricultores para recoger el heno y los apicultores para la multiplicación de colmenas. Júpiter que se encuentra ante la región de Leo desde julio de 2003 y su efecto es bastante ligero, pasa ante la región de Tierra de Virgo el 23 de agosto del 2004, una constelación que no satisface sus necesidades de luz.

La estancia de Saturno ante la región de Luz de Géminis termina en octubre de 2004, cambiando después ante la región de Agua de Cáncer. Tendremos temporadas de luz y calor, pero aumentarán las épocas húmedas y de noches frías a medida que avanza el año, sobre todo en noviembre y diciembre.

La dedalera, digitalis purpurea

La dedalera roja es una planta tóxica. Los niños están enamorados de ella, y por eso siempre se les explica que es una planta venenosa. Pero al mismo tiempo es también una planta curativa, que se utiliza en la medicina para enfermedades cardiacas y circulatorias. También actúa de manera curativa en la naturaleza. A menudo presenciamos como toda una montaña con bosques de fronda queda talada en invierno. Después de poco tiempo, la montaña brilla del color púrpura de la dedalera, que cubre todo hasta el horizonte. Un verdadero milagro de las fuerzas de la naturaleza. ¿Aparece quizá como un complemento al anterior "verde", que ha existido durante siglos en los bosques?
El pintor Walter Thun estaba muy unido a las fuerzas de la naturaleza. Entusiasmado por las capacidades de estas fuerzas, el artista supo plasmarlas junto a la dedalera en su pintura. Así también lo hizo en la jardinería.

La ilustración de la página 6 de 40x50cm está en nuestro catálogo y puede recibirse por encargo.



Walther Thun. "Montaña de dedalera". Óleo

Fuerzas universales y fuerzas centrales en la formación del clima

En la formación del clima observamos desde hace décadas (5), que los planetas clásicos actúan como fuerzas universales desde el ámbito cósmico, y como última instancia hacen uso de los elementos clásicos, es decir, Calor, Aire/Luz, Agua y Tierra. Según ante que constelación se encuentren, sus impulsos serán más fuertes o más débiles dependiendo del elemento al que pertenecen. De los planetas como Urano, con una órbita de 84 años, Neptuno de 165 y Plutón de 248 años, es muy difícil poder decir algo, desde la simple experiencia. Tendríamos que trabajar otros datos climatológicos, que como mucho existen sólo para Urano.
Después de 50 años de registrar datos del clima y del tiempo, podemos afirmar que estos tres planetas actúan a través del éter sin vida y utilizan las fuerzas centrales de la Tierra, para dejar constancia de su actividad. Su efecto no se produce por ritmos, sino por ángulos de 90º, 45° y 135° con respecto a otros planetas. A menudo emanan radiaciones que llegan a la Tierra, produciendo caos en las fuerzas centrales, como son la electricidad, el magnetismo y el vulcanismo.
La posición de ángulo de estos tres planetas a 144°, 72º y 36° ante otros planetas provocan tormentas con chubascos en la atmósfera, que a menudo son devastadoras (5).

La ilustración muestra un tonel con agua de lluvia de la víspera, sobre la que se encuentra una rama. En la helada de la noche, la superficie se ha congelado. Observamos formas geométricas de hielo de todos los ángulos del Sol, de la Luna y de los planetas que durante el día y la noche siguiente han pasado. Júpiter está a 90° de Plutón. La Luna tiene una posición de trígono ante tres planetas. Además hay una posición de 45° y dos de 135° entre los planetas. Estos ángulos tienen su efecto en la naturaleza y en la formación de clima, y pueden manifestarse en el agua congelada. El elemento Tierra creó estas formas de hielo con ayuda del primer mundo elemental.

Los elementos clásicos Tierra, Agua, Aire/Luz y Calor

A menudo se nos pregunta: "¿Cómo podemos experimentar los elementos clásicos en la actualidad?', y a menudo también," ¿Cómo podemos imaginarnos la actuación de los ritmos cósmicos?"

En la página 13, hemos intentado exponer de manera sencilla estas relaciones.
Si durante el verano observamos en el día a día, podemos constatar y percibir continuamente los efectos de los elementos.

De madrugada hace fresco, es decir está actuando el elemento Tierra de la noche anterior. Antes de que amanezca, comienza a hacerse presente el elemento Agua. Vemos entonces como una fina nube en el horizonte, como un velo de vapor en el paisaje. El Sol se anuncia con color una hora antes de salir. Comienza el canto de los pájaros. Todavía no corre el viento. El Sol pasa por diferentes etapas según va saliendo. Pero esto no lo puede hacer solo. Según la constelación de la Luna y los planetas, cambian también los colores del Sol. Si la constelación de Marte está actuando, tendremos un rojo intenso por la mañana. Si por el contrario es Neptuno, aparece en el cielo y el paisaje un gris claro, que resulta pálido.



En la luz del norte, que se produce debido a las constelaciones planetarias, la atmósfera brilla con un colorido rápidamente cambiante y de muchas tonalidades, creando ambientes misteriosos. Cuando se encuentran el Sol y Júpiter, en la bóveda celeste

aparecen destellos dorados. En determinadas constelaciones de Mercurio y Plutón, las nubes y el horizonte se tiñen de un violeta oscuro, que resulta amenazante. Las constelaciones de Saturno y Mercurio pintan la atmósfera de cobre. Venus y Urano hacen brillar colores platinos y blancos. En estos juegos de colores de las puestas del sol, vemos el efecto de los planetas.

Unas dos horas antes de la salida del sol, generalmente no corre el viento. Ahora podemos pulverizar entonces el preparado de sílice, ya que el viento no lo echa a perder. Dos o tres horas después de la salida del Sol, comienza a levantarse el viento (6).

Debido a su cercanía, la Luna influye más directamente sobre la Tierra, lo vemos por ejemplo en las gotas de rocío en la hierba. Dependiendo de la constelación cerca de su órbita, estas gotas de rocío se formaran de muy diferentes maneras. A veces son pequeñas bolas de cristal, otras brillan como diamantes, y algunos días tienen los colores del arco iris.

El lector puede hacer estas observaciones con los datos del Calendario. Se indica cada vez el elemento que actúa ese día a través de la Luna. La humedad de las gotas de rocío cambia también. Si en un día de Hoja, pasamos en la mañana por la hierba, las gotas que vamos rozando, caen de inmediato. El agua traspasa los zapatos de cuero y pronto tenemos los pies húmedos. Si es el elemento Tierra quien actúa, las gotas de color arco iris forman una cadena de perlas cerrada, sin perder su forma. Los zapatos no se mojan.

En verano, cuando la hierba está seca en la mañana, se anuncia lluvia. Si la niebla fina corre por la mañana temprano en los parajes de fuentes, cuando el sol asciende, llegará un periodo de buen tiempo. Los seres pertenecientes al elemento Agua se retiran a las zonas húmedas. Cuando la niebla se eleva alegremente por encima de los bosques, los seres de Agua suben también y vuelven ese mismo día en forma de lluvia.

En todos estos fenómenos en los que actúa el espíritu de la naturaleza, las plantas participan también.

Cuando removemos la tierra, al preparar el terreno de sembradío o cuando hacemos trabajos de cava, provocamos una serie de actividades en la tierra, gracias a las cuales los impulsos del cosmos tendrán mayor efecto. Estos impulsos se transmiten a través de los elementos de Tierra, Agua, Aire/Luz y Calor.

Aquí se crea una reserva de efectos cósmicos que la planta aprovecha y utiliza. Estas fuerzas contribuyen a la formación del organismo de la planta y pueden expresarse en el fruto de la raíz, de las hojas, en el buen florecimiento y en la formación del fruto y la semilla. Si por ejemplo un rábano ha aprovechado bien las fuerzas del elemento Tierra, crecerá con una raíz densa, redonda y compacta, el fruto será macizo y sabroso.

Cuando actúan las fuerzas del Agua en un barril con agua de lluvia, aparecen formas y estructuras como las que podemos ver en la imagen de arriba.

En la noche del 7 de abril de 2003, la temperatura fue de -4ºC. La superficie del agua del barril se congeló. En esa noche se produjo un ángulo entre la Luna y Neptuno, que sólo se reflejó en el agua helada. Si tenemos agua que ya se ha congelado una vez, no se crean nuevas formas. (Observamos el mismo fenómeno en las preparaciones: cuando hemos removido el agua durante una hora, pero hemos olvidado echar el preparado, si añadimos el preparado después y volvemos a remover, la acción del preparado será igual).

Estos ángulos interplanetarios estimulan una serie de actividades en el mundo elemental, que producen cambios en el crecimiento de las plantas y en el clima, y ocasionan diferentes reacciones en las personas y los animales.

Siembra de rabanitos del 28.3.03

En el Calendario de 2003, habíamos omitido completamente este día. Quisimos observarlo con detalle. En la constelación de Urano, partíamos del efecto de una ocultación por Venus. No podíamos realizar ningún ensayo al aire libre, por lo que sembramos en macetas en el invernadero. Sembramos 25 semillas de rabanitos por maceta.

De las siembras de las 10 horas, germinaron 9 semillas.
De las siembras de las 12 horas, germinaron 5 semillas.
De las siembras de las 14 horas, germinaron 7 semillas.
De las siembras de las 20 horas, germinaron 23 semillas.

Viendo estos resultados, comprendemos que nuestra experiencia desde hace décadas es una buena base para nuestro trabajo.

El Zodiaco

Esta ilustración muestra en el círculo exterior las dimensiones de las constelaciones visibles en el cielo, con el correspondiente momento de la entrada del Sol ante la siguiente constelación. Los tránsitos de una constelación a otra difieren en un día, en parte debido a los días bisiestos. El círculo interior tiene la antigua partición astrológica de 30° en doce casas iguales.

El zodiaco es la franja de constelaciones ante la que pasan la Luna y los planetas. A su paso se activan fuerzas que actúan sobre la Tierra.

Los Trígonos



Los trígonos son posiciones de 120º. La Luna pasa cada nueve días por el mismo trígono de fuerzas, por lo que mediante las cavas o pulverizaciones de sílice rítmicas, llevadas a cabo estando en el mismo tipo de trígono que el del día de la siembra, estimulamos ese impulso.

La Luna sideral

En su órbita de 27 días de giro en torno a la Tierra, la Luna pasa ante las doce regiones del zodíaco transmitiendo fuerzas a la Tierra, que se expresan a través de los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y calor. Estas fuerzas activan la "fructificación" en los cuatro órganos de la planta: raíz, hoja, flor, fruto. Podemos favorecer el desarrollo y la salud de la planta eligiendo el periodo de siembra, de labores de cultivo y de recolección.
Estas fuerzas actúan de forma similar en la colmena. Las abejas en su colmena se aíslan del exterior, impermeabilizando todo con el propóleo, una especie de resina. Cuando abrimos la colmena para realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» entre las abejas. En este tumulto puede actuar un nuevo impulso cósmico, que orienta a las abejas hasta la próxima vez que se realice un trabajo en la colmena.
En esta tabla resumimos los resultados que hemos encontrado en experimentos con plantas, la apicultura y en las observaciones meteorológicas:

Constelación Zodiacal		*Elemento*	*Tendencia del clima*	*Órgano vegetal*	*Actividad apícola*
Piscis	♓	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Aries	♈	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Tauro	♉	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Géminis	♊	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Cáncer	♋	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Leo	♌	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Virgo	♍	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Libra	♎	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Escorpio	♏	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Sagitario	♐	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Capricornio	♑	Tierra	Fresco/frío	Raíz.	Construcción panales
Acuario	♒	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen

La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. Este esquema básico puede alterarse de vez en cuando. Las oposiciones entre planetas, por ejemplo en días particulares, pueden modificar los impulsos y superponerlos, o hacer que a través de posiciones de "trígono" se active otro elemento diferente al que la Luna iba a transmitir ese día. También hay días en que la Luna ascendente o descendente llega a cortar la eclíptica (☊ ☋), dando generalmente efectos negativos, que aún pueden verse aumentados cuando dos planetas se encuentran en los puntos de corte de sus órbitas, en los llamados "nodos". En casos así hay eclipses y el planeta que está más cerca de la Tierra interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Son períodos muy poco indicados para sembrar y cosechar.

Clasificación de las plantas para siembra, los cuidados y la cosecha

Las plantas de cultivo se desarrollan engrosando ciertos órganos para dar un «fruto». Según nuestros ensayos, podemos clasificar las plantas en los cuatro grupos siguientes:

Las plantas de raíz en los días de raíz.

La formación del fruto en el ámbito de la raíz lo encontramos en el rabanito, rábano, colinabo, remolacha de mesa y la azucarera, apio, zanahoria, escorzonera etc. También incluimos en este grupo a la patata y a la cebolla. Si trabajamos estos cultivos en los días de raíz, obtendremos buenas cosechas con gran capacidad de conservación.

Las plantas de hoja en los días de hoja.

La formación del fruto en el ámbito de la hoja lo tenemos en casi todo tipo de coles, lechuga, espinaca, hierba de los canónigos, escarola, perejil, hierbas aromáticas de las que se utilizan las hojas, y plantas forrajeras. El espárrago crece mejor plantado y cultivado estos días. Son días favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, pero no para su recolección con el fin de guardarlas, ni para hierbas destinadas a infusiones. Tanto para estos trabajos como para la recolección de la col para elaborar col fermentada, recomendamos los días de flor y los días de fruto.

Las plantas de flor en los días de flor.

Estos días son propicios para la siembra y los cuidados de todas las plantas ornamentales de flor, para cavar y aplicar sílice en las plantas de semillas oleaginosas como lino, colza, girasol, etc. Si se corta las flores para ponerlas en floreros, su aroma es más intenso, se mantienen más tiempo y la planta de la que proceden echará muchos renuevos. Las flores secas cortadas mantienen la plena viveza de sus colores, mientras las cortadas en otros días pierden pronto su color. Va muy bien recoger las semillas oleaginosas en tales días. El bróculi también se incluye en este grupo de plantas.

Las plantas de fruto y los días de fruto.

Son plantas que se engrosan en el ámbito de la semilla, como judía, guisante, lenteja, soja, maíz, tomate, pepino, calabaza, calabacín, etc. Los cereales de verano e invierno y las semillas oleaginosas dan también los mejores resultados. Se obtiene la mejor extracción de aceite realizando los trabajos de cultivo durante los días de fruto. Va muy bien plantar los cultivos para semilla en los días de Leo. Las plantas de fruto se recolectan preferentemente en los días de fruto, ya que ayudan a que los frutos mantengan su calidad si se les guarda y fomentan la fuerza de regeneración. Para la fruta destinada a ser guardada, es recomendable además el período de luna ascendente (◡).

Los Periodos desfavorables

En el calendario hemos omitido los períodos en los que se producen eclipses, nodos lunares o planetarios u otras posiciones con efectos negativos. (en el calendario figuran--------) Si por falta de tiempo nos vemos obligados a sembrar en estos días desfavorables, podemos elegir días más propicios para realizar los trabajos de cava y conseguir de esta manera una mejora considerable.



Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita, ante la constelación de Sagitario, empieza a ascender. Sus órbitas se vuelven cada día más amplias. Sus puntos de salida se desplazan en dirección noreste y sus puntos de puesta en dirección noroeste. No hemos de confundirlo con la luna creciente.

Durante la luna ascendente, las savias se dirigen con más fuerza a la parte superior de la planta, que está llena de savia y fuerza. Es apropiado cortar y realizar los injertos. Aprovechando los días de fruto que se hallen en este periodo, se puede hacer que aumente este efecto sobre las plantas de fruto, y los días de flor para las plantas de flor. La fruta recogida durante este periodo, se mantiene almacenada más tiempo, fresca y jugosa. Estos días son también propicios para cortar los árboles de Navidad, pues las hojas de pino tardan más en caer y su aroma es más intenso cuando se les corta en los días de flor.

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita mensual ante la constelación de Géminis, empieza a descender (♊). Sus órbitas en el cielo del sur serán cada día más bajas, sus puntos de salida se desplazan hacia el sureste y sus puntos de puesta en dirección suroeste. En el Hemisferio Sur se invierte esta situación (♊♋). Véase pág. xx.

Como "siembra" denominamos siempre el momento en el que enterramos la semilla en la tierra. Cuando llevamos las plantas de un sitio a otro hablamos de "trasplante", por ejemplo cuando cambiamos las plantas jóvenes de un lecho de siembra protegido al lugar definitivo a cielo abierto donde se desarrollarán, o al repicar plantas jóvenes, a veces incluso varias veces, para fortalecer el desarrollo de la raíz, como se hace en las plantaciones de frutales, arbustos y plantas de maceta. Aquí elegimos el periodo de la luna descendente, que no debe confundirse con la luna menguante, perteneciente al ritmo luminoso de las fases lunares.

Durante el periodo de plantación, las plantas enraízan mejor y se vinculan rápidamente con el nuevo lugar. Se puede aumentar este impulso en cada especie vegetal eligiendo como periodo de plantación para las plantas de hoja los días de hoja (Cáncer o Escorpio), para las plantas de raíz como el apio los de raíz (Virgo), para pepino y tomate los de fruto (Leo), de modo que además del impulso de enraizamiento, se favorece el órgano que se engrosará. En este periodo, el ascenso de la savia por las plantas es mínimo y así favorable para podar setos, cortar árboles y madera para construir, y abonar prados y frutales.

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita ante la constelación de Sagitario, empieza a descender. Esto significa que comienza el tiempo de plantación. Sus órbitas se vuelven cada día más bajas. A las dos semanas llega a la constelación de Géminis, el punto más bajo de su órbita. Esto significa que termina el tiempo de plantación. Todas las savias y fuerzas se dirigen ahora con más fuerza hacia la parte superior de la planta. Cambian todos los ritmos ascendentes ◡ y descendentes ◠ de la Luna y de los planetas. La orientación frente al zodíaco permanece igual, por ello también se puede seguir contando con la división de la planta en cuatro órganos: raíz, flor, hoja y fruto-semilla. Si por ejemplo en el Hemisferio Norte miramos al cielo en la Nochebuena de 1996, la luna llena sale ante la constelación de Géminis e ilumina la noche durante más de 16 horas; y el signo ◠ dice que ha llegado al punto más alto de su órbita y ahora está bajando, o sea que comienza el tiempo de plantación.

Por el contrario, en el Hemisferio Sur llegó el 7 de enero de 1997 a su punto más alto ante la constelación de Géminis y entonces comenzó a descender. Entonces comenzó el tiempo de plantación para el Hemisferio Sur. Ahora arraiga bien la planta que se ha trasplantado. Unas dos semanas después, el 20 de enero, la Luna llegó frente a la constelación de Géminis. Entonces empezó a ascender ◡ y el tiempo de plantación acabó, volviendo a actuar las savias y las fuerzas en la parte superior.

Si estando en el Hemisferio Sur queremos contemplar las constelaciones conocidas en el Hemisferio Norte, las primeras veces hay que buscarlas con cierto esfuerzo, pues todas están al revés. Tomamos la Tierra como esfera, pero el entorno cósmico como cúpula.

El lector puede invertir con un lápiz rojo los signos para el tiempo de plantación. Esto también se aplica al abonado y la siembra de raíces. Es mejor sembrar las plantas de fruto bajo las constelaciones ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏.

A todas las horas citadas se debe **restar 4**. Donde dice **inicio** de tiempo de plantación (trasplante) debe decir **fin** de tiempo de plantación y viceversa. En los comentarios sobre labores con árboles frutales, cultivos o apicultura, debe considerarse que muchas veces son labores correspondientes a una estación del año determinada, y cuando este sea el caso, debe corregirse para el Hemisferio Sur, buscando el mes contrario o sea **6 meses antes o 6 meses después.** Por ejemplo, si se recomienda podar frutales en una constelación de Fuego y Luna descendente de diciembre, para esa labor en el Hemisferio Sur deberá buscarse una situación similar en junio.

Enero 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Época de plantación	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Semana					
1. Ju ♈ 4	☼ - ♐	Agua/Calor		Hoja hasta 3h,Fruto desde las 4h	
2. Vi ♈	☊21	Calor		Fruto hasta 19h y desde las 23h	Td
3. Sa ♉ 5	Ag21	Calor/Tierra		Fruto hasta 4h, Raiz desde 5h hasta 14h, Flor desde 15h	
2. Semana					
4. Do ♉		Tierra		Raiz	To
5. Lu ♉		Tierra		Raiz	
6. Ma ♊ 6	♠ 23	Tierra/Luz		Raiz hasta 5h, Flor desde 6h	Ta
7. Mi ♊	☺ 17	Luz		Flor Inicio Plantación 00h.	
8. Ju ♋ 13		Luz/Agua		Flor hasta 12h, Hoja desde 13h	
9. Vi ♋	△	Agua		Hoja hasta 12h, Fruto desde 13h	To
10. Sa ♌ 5		Agua/Calor		Fruto	
3. Semana					
11. Do ♌		Calor		Fruto	Ta
12. Lu ♍ 22		Calor/Tierra		Fruto hasta 21h, Raiz desde 22h	
13. Ma ♍		Tierra		Raiz	
14. Mi ♍		Tierra		Raiz	Td
15. Ju ♍		Tierra		Raiz	Ta
16. Vi ♎ 7	♉ 22	Tierra/Luz		Raiz hasta 6h, Flor de 7 a 20h	E
17. Sa ♏ 14		Luz/Agua		Flor hasta 13h, Hoja desde 14h	DC Td
4. Semana					
18. Do ♏	☼ - ♑	Agua		Hoja Fin Plantación 24h	
19. Lu. ♐ 16	Pg20	Agua		----------	
20. Ma ♐	☽ 7 △	Calor		Hoja hasta 14h, Fruto desde 15h	Td
21. Mi ♑ 17	●22 △	Calor/Tierra		Flor hasta 16h, Raiz desde 17h	Td
22. Ju ♑	☿ ♂ ♄	Tierra		----------	
23. Vi ♒ 16		Tierra/Luz		Raiz de 4h a 15h, Flor desde 16h	
24. Sa ♒		Luz		Flor	
5. Semana					
25. Do ♓ 12		Luz/Agua		Flor hasta 11h, Hoja desde 12h	DC Td
26. Lu ♓	☿ ♉ 23	Agua		----------	E
27. Ma ♓		Agua		Hoja desde 6h	DC
28. Mi ♈ 12		Agua/Calor		Hoja hasta 11, Fruto desde 12 hasta 22h	Ta
29. Ju ♈	☊23 ♀ ♂ ♃ △	Calor		Fruto de 15h a 21h	
30. Vi ♉ 13		Calor/Tierra		Fruto de 1h a 12h Raiz desde 13h	Td
31. Sa ♉	Ag15	Tierra		Raiz hasta 9h, Flor de 10 a 18h,Raiz desde 19h	

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♐	♑	♓	♋	♊	♒	♑	♏
2. ♏	11. ♒						
12. ♐							

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de enero

Mercurio, al principio ante Escorpio, fomentará las precipitaciones de invierno. A partir del 12, se encuentra ante Sagitario en su propio elemento y nos ofrecerá calor. Venus mantiene las noches frías hasta el día 10, a partir del 11 está en un elemento de Luz e intenta, sobre todo por el día, apoyar al Sol. En las regiones más cálidas, fomenta a "las primeras flores" a la producción de polen. Marte ante Piscis podría favorecer precipitaciones. Júpiter ante el Leo se siente muy bien, y en oposición con otros planetas, proporciona buenos días de siembra para árboles, como por ejemplo el arce y el manzano. Saturno ante Géminis puede tener una influencia más positiva que la de los últimos tres años ante Tauro. Urano ante Acuario, se encuentra en su elemento y desde determinados ángulos puede desatar fuertes tormentas. Neptuno ante Capricornio, nos trae todavía noches frías cuando se encuentra en posición de trígono ante otros planetas. Plutón, todavía estará bastante tiempo ante Escorpio, en posición de trígono con otros planetas, ocasionará fuertes precipitaciones.

Tiempo de plantación, del 7 a las 00h hasta el 18 a las 24 h, también favorable para la poda de árboles, vides, arbustos y setos. Para las plantas de Fruto escoger preferentemente los días de Fruto.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: a partir del día 20 a las 12h

Observaciones para el apicultor: véase pag.

La elaboración de la leche

Para la producción de mantequilla y buen queso es recomendable evitar los periodos que no se indican en el calendario con ---------

La mayor cantidad de mantequilla se obtiene de la leche que se ha ordeñado en días de Calor o Fruto y en días con tendencia a tormenta. Los días de perigeo son casi siempre desfavorables para la elaboración de la leche y el yogur. Los derivados lácteos de estos días se estropean fácilmente, por lo cual conviene preparar un día antes una cantidad doble. A la leche le van bien los días de Luz y Calor y no los de Hoja-Agua.

Febrero 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
6. Semana				
1. Do ♉	☼ - ♑	Tierra	Raíz hasta 20h	Td E
2. Lu ♊ 13		Tierra/Luz	----------Flor desde 15h	
3. Ma ♊	☊ 5	Luz	Flor Inicio Plantación 6h	Td
4. Mi ♋ 21		Luz/Agua	Flor hasta 20h, Hoja desde 21h	Ta
5. Ju ♋		Agua	Hoja	Td
6. Vi ♌ 12	☺ 10	Agua/Calor	Hoja hasta las 11, Fruto desde 12h	To Td
7. Sa ♌		Calor	Fruto	
7. Semana				
8. Do ♌		Calor	Fruto	
9. Lu ♍ 4		Calor/Tierra	Fruto hasta 3, Raíz desde 4h	
10. Ma ♍		Tierra	Raíz	E
11. Mi ♍		Tierra	Raíz	
12. Ju ♎ 13	☋23	Tierra/Luz	Raíz hasta 12, Flor de 13 a 21h	To
13. Vi ♏ 20		Luz/Agua	Flor de 1 a 19h, Hoja desde 20h	Td E
14. Sa ♏		Agua	Hoja	DC
8. Semana				
15. Do ♏	☼ - ♒	Agua	Hoja hasta las 19h, Fin de Plantación a 19h	Td
16. Lu ♐	☽ 15 Pg9	Calor	----------	
17. Ma ♐	♀☊2	Calor	----------Fruto desde 17h,	
18. Mi ♑ 2		Tierra	Raíz desde 2h	
19. Ju ♑		Tierra	Raíz	
20. Vi ♒ 2	●10	Tierra/Luz	Raíz hasta 1h, Flor desde 2h	
21. Sa ♓ 22		Luz/Agua	Flor hasta 21h, Hoja desde 22h	
9. Semana				
22. Do ♓		Agua	Hoja	
23. Lu ♓		Agua	Hoja	DC Ta
24. Ma ♈ 21		Agua/Calor	Hoja hasta 20h, Fruto desde 21h	To
25. Mi ♈	△	Calor	Fruto hasta 23	
26. Ju ♉ 21	☊1 ♂ ☌ △	Calor/Tierra	Fruto de 9 a 20h, Raíz desde 21h	To
27. Vi ♉	△	Tierra	----------	DC
28. Sa ♉	Ag12	Tierra	Raíz hasta 6h, Flor desde 7h	E
10. Semana				
29. Do ♊ 22	△	Tierra/Luz	Flor hasta 8h, Raíz de 9 a 21h, Flor desde 22h	DC

Época de plantación

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
☌	♓	♈	♌	♊	♒	♑	♏
6. ♑							
23. ♒							

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29

Comentarios al mes de febrero

Mercurio se encuentra a partir del 6 ante Capricornio, lo que nos hace esperar de nuevo un clima invernal. Venus ante Piscis podría añadir además nieve en las regiones de mayor altura. Marte, Júpiter, Saturno y Urano se encuentran en regiones de Luz y Calor, esto despierta añoranzas veraniegas. Neptuno y Plutón se quedan todo el año ante las constelaciones ya citadas.

Tiempo de plantación, desde el día 3 a las 6h hasta el 15 las 19h En las parcelas tardías pueden podarse todavía árboles, vides y setos. Cortar los vástagos para estacas el día 2 a partir de las 13h (es correcto), los días 3 y 4 hasta las 19h, y conservar en un lugar fresco y húmedo hasta su uso. Las estacas para los injertos de vides y frutales se cortan el 20 a partir de las 2h y el 21 hasta las 21 h. Especialmente favorable: el 25 hasta las 23h y el 28 a partir de las 7h. Conservaremos todas las estacas en un sitio fresco y húmedo hasta su uso.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: hasta el 1 a las 24h y el 17 desde las 20h hasta el 26 a las 24h. ¡Evitar los tiempos omitidos!

En caso de plaga de ratas: el día 1 o el 2 antes de las 7h, incinerar pieles de rata.

Plaga de hongos en las plantas
Los hongos en la naturaleza tienen como función desintegrar la vida en descomposición. Aparece en los cultivos cuando utilizamos compost de estiércol no bien elaborado o que contiene sustancias de cuerpo de animal que no han pasado el proceso del compost, como viruta de cuernos o huesos. También puede ocurrir cuando las semillas fueron recolectadas bajo constelaciones desfavorables. Según Rudolf Steiner: "Cuando las fuerzas de la luna actúan intensamente sobre la Tierra…". Podemos hervir infusión de cola de caballo y pulverizar inmediatamente las zonas afectadas con dicha infusión. El nivel de los hongos bajará de la planta al suelo, donde es su lugar. Podemos hacer algo para la curación de la planta, pulverizando infusión de ortiga sobre las hojas de la planta. De esta manera fomentamos la asimilación y la circulación de la savia, desapareciendo también así los hongos.

Marzo 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones		Elemento☾	Época de plantación	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Lu ♊	☌ - ♒ ♈ 13		Luz		Flor — Inicio plantación 13h	
2. Ma ♊			Luz		Flor	DC
3. Mi ♋ 5			Luz/Agua		Flor hasta 4h, Hoja de 5h a 20h	G
4. Ju ♌ 21	☌♂24 ☿♂24		Agua/Calor		Hoja de 15 a 20h, Fruto desde 21h	Td M
5. Vi ♌			Calor		Fruto	Ta
6. Sa ♌	☺ 24		Calor		Fruto	
11. Semana						
7. Do ♍ 12			Calor/Tierra		Fruto hasta 11h, Raiz desde 12h	Td
8. Lu ♍			Tierra		Raiz	E
9. Ma ♍			Tierra		Raiz	
10. Mi ♎ 19	☿ 24		Tierra/Luz		Raiz hasta 17h----------	Td
11. Ju ♎	☌ - ♓		Luz		Flor de 2 a 15h----------	To
12. Vi ♏ 1	Pg5		Agua		---------- Hoja desde 17h	E
13. Sa ♏			Agua		Hoja	Td
12. Semana						
14. Do ♐ 6	☾20		Agua/Calor		Hoja hasta 5, Fruto desde 6h — Fin plantación 5h	
15. Lu ♐			Calor		Fruto	
16. Ma ♑ 9	☿☊15		Calor/Tierra		----------	
17. Mi ♑		△	Tierra		Fruto hasta 8h, Raiz desde 9h	Td
18. Ju ♒ 10			Tierra/Luz		Raiz hasta 9h, Flor desde 10h	DC To
19. Vi ♒			Luz		Flor	E
20. Sa ♓ 6	●24		Luz/Agua		Flor hasta 5h, Hoja desde 6h	DC E
13. Semana						
21. Do ♓			Agua		Hoja	
22. Lu ♓			Agua		Hoja	Td
23. Ma ♈ 6			Agua/Calor		Hoja hasta 5, Fruto desde 6h	Ta
24. Mi ♈	☊6	△	Calor		Fruto hasta 4 y de 8 a 15h, Hoja desde 16h	
25. Ju ♉ 5			Calor/Tierra		Fruto hasta 4h, Raiz de 5 a 18h	
26. Vi ♉		♂●	Tierra		Raiz de 4 a 20h, Flor desde 21h	DC
27. Sa ♉	Ag8		Tierra		Flor hasta 11h, Raiz desde 12h	
14.Semana	*El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas*					
28. Do ♊ 6	♈ 21		Tierra/Luz		Raiz hasta 5h, Flor desde 6h	DC Ta
29. Lu ♊			Luz		Flor — *Inicio plantación 00h	
30. Ma ♋ 14			Luz/Agua		Flor hasta 13h, Hoja desde 14h	
31. Mi ♋			Agua		Hoja	Td

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♒	♓	♈	♌	♊	♒	♑	♏
8. ♓	5. ♈	5. ♉					
30. ♈	27. ♉						

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de marzo

Mercurio se apresura ante Acuario y Piscis para llegar el 30 ante Aries. Venus también alcanza al Sol y a finales de mes ya se encuentra ante Tauro. Marte llega el 10 ante la región de Tauro y desde allí enfría las noches. Parece que en esta primavera la naturaleza tiene prisa.

Tiempo de plantación, desde el 1 a las 13h hasta el 14 a las 5h y desde el 29 a las 00h hasta el 31

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: desde el 15 a la 1h hasta el 26 a las 24h

Los días 5, 6 y 7 hasta las 11 h podemos insertar en la tierra las estacas de los jóvenes frutales.

Vuelo de mariposas nocturnas los días 21 y 22. Se las puede capturar con atrapamoscas e incinerarlas bajo los árboles afectados.

Elaboración de pan de centeno
Ya sea con levadura u otro producto auxiliar de panificación, podemos trabajar bien la harina gruesa o fina de trigo, cebada, avena, maíz, arroz y mijo. Para el centeno hemos de utilizar otros métodos. Unos investigadores finlandeses han descubierto además que las personas con tendencia a cáncer se curan consumiendo pan de centeno. Encontrará una receta detallada de pan de centeno en nuestra publicación "Sobre las investigaciones de constelaciones", o en el último Calendario. El centeno necesita una temperatura de 28° C. Estaba asombrada como con el calor del año 2003, en cuatro horas todas las cinco etapas de elaboración de pan de centeno estaban terminadas. Es decir que el ingrediente agrio sube con la temperatura adecuada.

Abril 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾		Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Ju ♌ 6	☼ - ♓	Agua/Calor	Época de plantación	Hoja hasta 5h, Fruto desde 6h	Plantación
2. Vi ♌		Calor		Fruto	
3. Sa ♍ 21		Calor/Tierra		Fruto hasta 20h, Raíz desde 21h	
15. Semana					
4. Do ♍		Tierra		Raíz	
5. Lu ♍	☺ 12	Tierra		Raíz	Td
6. Ma ♍		Tierra		Raíz	
7. Mi ♎ 3	♉6	Tierra/Luz		Raíz hasta 2,Flor de 8 a 13h Fin plantación 13	To
8. Ju ♏ 8	Pg3	Luz/Agua		----------Hoja desde 15h	
9. Vi ♏	*Viernes Santo*	Agua		----------	Ta
10. Sa ♐ 12		Agua/Calor		----------	
16. Semana					
11. Do ♐	*Pascua* ☋2 △	Calor		Fruto hasta 12h, Hoja desde 13h	Td
12. Lu ♑ 15		Calor/Tierra		Fruto hasta 14h, Raíz desde 15h	
13. Ma ♑	△	Tierra		Raíz	
14. Mi ♒ 16		Tierra/Luz		Raíz hasta 15h, Flor desde 16h	
15. Ju ♒		Luz		Flor	DC
16. Vi ♓13		Luz/Agua		Flor hasta 12h,Hoja desde 13h	DC
17. Sa ♓		Agua		Hoja	
17. Semana					
18. Do ♓	☼ - ♈	Agua		Hoja	DC
19. Lu ♈ 13	●15 ☼☌	Agua/Calor		Hoja hasta 12,Fruto desde 20h	
20. Ma ♈	☊13	Calor		Fruto hasta 10h y desde 15h	
21. Mi ♉ 13	△	Calor/Tierra		Fruto hasta 9h, Raíz desde 10h	
22. Ju ♉		Tierra		Raíz	
23. Vi ♉	☿♉22	Tierra		Raíz hasta 8h ----------	
24. Sa ♊ 13	Ag1 ♂☌♇	Tierra/Luz		Raíz de 8 a 12h,Flor desde 13h	
18.Semana					
25. Do ♊	◠5 △	Luz	Época plantación	Flor hasta 13, Hoja desde 14h	Inicio Plantac.5h
26. Lu ♋ 22		Luz/Agua		Hoja hasta 3,Flor desde 4 a 21h,Hoja desde 22	E
27. Ma ♋		Agua		Hoja	
28. Mi ♌ 15	△	Agua/Calor		Hoja hasta 12h,Fruto desde 13h	
29. Ju ♌		Calor		Fruto	
30. Vi ♌		Calor		Fruto	Ta

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♈	♉	♉	♌	♊	♒	♑	♏
14. ♓							

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Comentarios al mes de abril

Mercurio se encuentra ante Aries hasta el 13, en general cabe esperar entonces noches cálidas y un calentamiento de la tierra. Pero este año tenemos el peligro de que Venus y Marte ante Tauro impidan la actividad de Mercurio, provocando noches frías. Los agricultores biodinámicas pueden sacar los preparados el día 10 del mes, este año maduran antes.

Tiempo de plantación: del 1 al 7 a las 13h y del 25 a las 5h hasta el 30.

Las patatas destinadas al consumo se plantan en días de Raíz. Las patatas de siembra para el próximo año se plantarán el 19 a partir de las 20h, el 20 hasta las 10 h y a partir de las 15h y el 21 hasta las 12h. Se las planta más juntas que las patatas de consumo, para que no crezcan tanto.

Tiempo de plantación para la mitad sur del planeta: del 12 a las 00 h hasta el 22 a las 24h.

Incineración de polillas, del 19 a las 13h hasta el 21 a las 12h.

Vuelos de mariposas nocturnas en parcelas de frutales, del 16 a las 12h hasta el 18 a las 18h (véase marzo).

Recolección de plantas de los preparados biodinámicos

El diente de león se recoge por la mañana, en días de Luz-Flor, inmediatamente después de empezar a abrirse la flor, cuando su centro está todavía cerrado. La milenrama en día de Fruto-Calor, con el Sol ante la región de Leo, es decir a partir de mediados de agosto. La manzanilla en días de Flor-Luz, poco antes de San Juan, pues más tarde la cabezuela ya está formando semilla y estaremos sembrándola con un preparado de manzanilla mal elaborado. También pierde su efecto si las cabezuelas tienen gusanos -otra razón para esta época de recolección. De la ortiga se recoge toda la planta menos la raíz, cuando empieza a florecer, en días de Flor-Luz; la valeriana preferentemente en días de Flor-Luz, alrededor de San Juan y se seca las flores sobre un papel, a la sombra; y la corteza de roble en días de Tierra, sin líber.

Parásitos animales

Primero hemos de preguntamos: ¿por qué aparece este o aquel animal como plaga? Es importante estudiar las costumbres de los animales y observar los errores que han de evitarse. Si aun así aparece un animal en forma masiva, lo podemos reducir a sus límites naturales con su propio producto incinerado, es decir la ceniza. Al respecto, hemos de tener en cuenta las recomendaciones de las hojas de cada mes.

No hace falta que hagamos uso de productos biológicos o químicos, si no que los animales se regulan por sí mismos. En el caso de los ratones, aves y otros, basta con la piel o el pellejo de algunos ejemplares; en el caso de los insectos, caracoles y otros, se sigue la siguiente regla; tomamos entre 50 y 60 ejemplares, que se incineraran en un horno de madera ante la constelación correspondiente. La ceniza que resulta de la plaga y de la madera se tritura una hora en el mortero. Esto significa "dinamizar".

Después tomamos 1 cc de esta mezcla de ceniza dinamizada introduciéndola en una pequeña botella que contenga 9cc de agua, y la agitamos. Esta es la potencia D1. Se añaden 90cc de agua y lo agitamos todo tres minutos. Esta es la potencia D2. Si continuamos así para llegar a la 08, necesitaríamos 100.000 litros. Lo que resulta de difícil manejo. Por eso, a partir de la 04, se empieza de nuevo con una pequeña cantidad.

Este preparado provoca una reducción de la multiplicación de las plagas, al utilizarlo en la potencia D8, aplicándolo en tres pulverizaciones de gota fina en tres tardes consecutivas. Se nos ha constatado su éxito con diferentes animales. En muchos casos de plagas de animales, obtenemos los mejores resultados si incineramos en el mismo lugar donde aparecen. Los pulgones y los gorgojos de manzano por ejemplo los capturamos con un atrapamoscas y los incineramos seguidamente en el mismo lugar (4).

Anotaciones

Mayo 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾		Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Sa ♍ 7	☼ ♈	Calor/Tierra	Época plantación	Fruto hasta 6h,Raíz desde 7h	Plantación Ta
19. Semana					
2. Do ♍	♀ ♂ ♇	Tierra		Raíz	DC
3. Lu ♍		Tierra		Raíz hasta 4h y desde 9h	
4. Ma ♎ 13	☺22 ♉16 △	Tierra/Luz		Raíz hasta 12h,Flor de 13 a 14h ☾☌21	To M E
5. Mi ♏ 18		Luz/Agua		Flor hasta 17h----------	E
6. Ju ♏	Pg6	Agua		----------Hoja desde 18h	To Td
7. Vi ♐ 19		Agua/Calor		Hoja hasta 18,Fruto desde 19 Fin plantac.19	To
8. Sa ♐	☾9	Calor		Fruto	DC Td
20. Semana					
9. Do ♑ 21		Calor/Tierra		Fruto hasta 20h,Raíz desde 21h	
10. Lu ♑		Tierra		Raíz	
11. Ma ♒ 21		Tierra/Luz		Raíz hasta 20h, Flor desde 21h	
12. Mi ♒		Luz		Flor	
13. Ju ♓ 19	☼ - ♉	Luz/Agua		Flor hasta 18h, Hoja desde 19h	DC
14. Vi ♓		Agua		Hoja	DC
15. Sa ♓		Agua		Hoja	
21. Semana					
16. Do ♈ 19		Agua/Calor		Hoja hasta 18h,Fruto desde 19h	
17. Lu ♈	☊19	△ Calor		Fruto hasta 17h y desde 22	To
18. Ma ♉ 19		Calor/Tierra		Fruto hasta 18h, Raíz desde 19h	
19. Mi ♉	●6	Tierra		Raíz	
20. Ju ♉	Ascensión	Tierra		Raíz	
21. Vi ♊ 20	Ag13 ♀ ☌	Tierra/Luz		Raíz hasta 5h, Flor desde 6h	E
22. Sa ♊	☾ 11	Luz		Flor Inicio plantación 12h	Td
22. Semana					
23. Do ♊		Luz	Época de plantación	Flor hasta 15h, Fruto desde 16h	
24. Lu ♋ 5		△ Luz/Agua		Fruto hasta 4h, Hoja desde 5h	
25. Ma ♌ 22		Agua/Calor		Hoja hasta 21h,Fruto desde 22h	
26. Mi ♌		Calor		Fruto	Td
27. Ju ♌		Calor		Fruto	Ta Td
28. Vi ♍ 16		Calor/Tierra		Fruto hasta 15h, Raíz desde 16h	To E
29. Sa ♍		Tierra		Raíz	Td
23. Semana					
30. Do ♍	Pentecostés	Tierra		Raíz	DC
31. Lu ♎ 23		Tierra/Luz		Raíz hasta 22h	G

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♓	♉	♉	♌	♊	♒	♑	♏
15. ♈		6. ♊					

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de mayo

Durante la primera mitad de mes, Mercurio permanece ante Piscis. Venus y Marte se encuentran ante la constelación fría de Tauro, que nos trae noches frescas. Esto provoca un retroceso en el mundo vegetal. Los brotes que habían crecido tan rápido, se retraen, lo que produce un proceso de azucaramiento, seguido consecuentemente de una invasión de pulgones. En caso necesario conviene echar agua, para hacer subir la savia, o bien regar con infusión de ortiga por las tardes, para que suba la savia y de esta manera espantar a los pulgones. El día 15, Mercurio pasa de nuevo por Aries, la savia fluye mejor por las plantas. Esto significa también un mayor flujo de néctar en las flores.

La hierba para conservar en silo, debe ser pulverizada dos veces a primera hora de la mañana con el preparado de sílice, escogiendo que sea en días de Flor. De esta manera disminuimos la diarrea en las vacas. Lamentablemente, Venus no está ante la región de Géminis hasta el 8 de agosto, esta constelación de heno normalmente tan favorable puede ser aprovechada para la segunda siega y para la cosecha de cereales. Otros días favorables pueden ser los días de Flor y Fruto a partir del 6.

Tiempo para injertos en las parcelas tardías: 8, 9, 12, 17 hasta las 17h, el 18 hasta las 18h, y los días 22, 23, 26 y 27.

Plagas de insectos, también varroa: tiempo de incineración: el 18 desde las 19h hasta el 21 a las 19h.

Tiempo de plantación: del 1 hasta el 7 a las 19h y del 22 a las 12h hasta el 31 a las 22h.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 8 a las 12h hasta el 20 a las 24h.

Junio 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Ma ♎	☼ - ♉ ♉2	Luz	Flor desde 4h	To
2. Mi ♏ 5		Luz/Agua	Flor hasta 4, Hoja desde 5h Fin plantación 24h	
3. Ju ♏	☺ 5 Pg14	Agua	----------	☿♂♇
4. Vi ♐ 5	☾19	Agua/Calor	Hoja hasta 4h, Fruto desde 5h	
5. Sa ♐	△	Calor	Fruto hasta 12h,Raíz de 13 a 19h,Fruto desde 20	
24. Semana				
6. Do ♑ 5		Calor/Tierra	Fruto hasta 4h,.Raíz desde 5h	
7. Lu ♑	☿♉16	Tierra	----------	
8. Ma ♒ 4	☿☌	Tierra/Luz	---------- Flor desde 16h	
9. Mi ♒		Luz	Flor	Ta
10. Ju ♓ 1	Corpus	Agua	Hoja desde 1h	Ta
11. Vi ♓	☼☍♇	Agua	Hoja	
12. Sa ♓	☿☊14 △	Agua	----------	
25. Semana				
13. Do ♈ 1	☊24 △	Agua/Calor	Raíz hasta 6h, Fruto de 7 a 22h	
14. Lu ♈		Calor	Fruto desde 2h	Td
15. Ma ♉ 1	☿☍♇	Calor/Tierra	Raíz desde 1h	
16. Mi ♉		Tierra	Raíz	
17. Ju ♉	●22 Ag17	Tierra	Raíz hasta 12h,Flor desde 13h	
18. Vi ♊ 2	☾17	Tierra/Luz	Flor Inicio Plantación 17h	Td
19. Sa ♊		Luz	Flor	To DC
26.Semana				
20. Do ♋ 11	☼ - ♊	Luz/Agua	Flor hasta 10h, Hoja desde 11h	
21. Lu ♋		Agua	Hoja	To DC
22. Ma ♌ 4	△	Agua/Calor	Hoja hasta 3h,Fruto desde 4h	
23. Mi ♌		Calor	Fruto	To
24. Ju ♍ 23		Calor/Tierra	Fruto hasta 22, Raíz desde 23h	Ta
25. Vi ♍		Tierra	Raíz	
26. Sa ♍		Tierra	Raíz	
27. Semana				
27. Do ♍		Tierra	Raíz hasta 20h,Flor desde 21h	Td
28. Lu ♎ 9	♉10 △	Tierra/Luz	Flor hasta 8 y desde 12h	
29. Ma ♏ 15		Luz/Agua	Flor hasta 14h, Hoja desde 15h	
30. Mi ♏		Agua	Hoja Fin Plantación 24h	Ta Td

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
☿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
19. ♊		19. ♋					

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Comentarios al mes de junio

En junio esperamos que los planetas más grandes que se encuentran ante regiones de Luz y Calor, equilibren las fuerzas difíciles que Mercurio y Venus transmiten desde la región de Tauro. Marte pasa el 19 ante la región de Cáncer, estimulando a los caracoles. En caso de que fuera necesario llevar a cabo una incineración, los días más apropiados son: del 19 al 21 de junio, y los días 17, 18 y 19 de julio, y el 14 y 15 de agosto hasta las 15h.

Como una solución al problema de los caracoles, un lector del Calendario, recomendó recoger todos los **caracoles** y llevarlos a la pradera más próxima. Desgraciadamente sabemos lo rápido que encuentran estos animales las lechugas.

Los grillotopos pueden ser recogidos el día 2 a las 5h, incinerarlos por la tarde y el día 3 esparcir la ceniza en los caminos de los campos.

Los tiempos de incineración de los **grillos** y los **saltamontes** son los días de Flor en junio y los días de Flor entre el 6 de agosto y el 3 de septiembre.

Las incineraciones de insectos de quitina y varroa son posibles también del 15 al 17.

Plaga de moscas de establo: capturar las moscas con un atrapamoscas del 20 de junio al 18 de julio e incinerarlas en estos días, en un día de Flor en el mismo establo.

Tiempo de plantación: del 1 al 2 hasta las 24h y del 18 a las 17h hasta el 30 a las 24h.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta del 5 a las 00h hasta el 16 a las 24h.

Para el apicultor: la alimentación de las abejas
Para la dieta invernal de las abejas son recomendables infusiones complementarias, positivas para la salud de las colonias. Se echa agua hervida en milenrama, manzanilla, diente de león y valeriana, se deja reposar un cuarto de hora y se cuela. Se pone a hervir agua con ortiga, cola de caballo y corteza de roble durante diez minutos, se cuela y se añade al alimento líquido. Bastan tres gramos de cada planta por 100 litros de alimento líquido. Esto es especialmente importante en años que al final trajeron mucho desarrollo foliar (3).

Julio 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Ju ♐ 16	☼ - ♊ Pg24	Agua/Calor	Hoja hasta 10h----------	
2. Vi ♐	☺ 12 ☋5	Calor	Fruto desde 8h	Td E
3. Sa ♑ 16		Calor/Tierra	Fruto hasta 15h,Raíz desde 16h	
28. Semana				
4. Do ♑		Tierra	Raíz	Ta
5. Lu ♒ 13		Tierra/Luz	Raíz hasta 12h, Flor desde 13h	
6. Ma ♒		Luz	Flor	Td
7. Mi ♓ 8		Luz/Agua	Flor hasta 7h,Hoja desde 8h	E
8. Ju ♓		Agua	Hoja	
9. Vi ♓		Agua	Hoja	Td
10. Sa ♈ 7		Agua/Calor	Hoja hasta 6h,Fruto desde 7h	
29. Semana				
11. Do ♈	☊2	Calor	Fruto desde 4h	
12. Lu ♉ 7		Calor/Tierra	Fruto hasta 6h, Raíz desde 7h	
13. Ma ♉	☿ ♂ ♆	Tierra	Raíz	Ta
14. Mi ♉	Ag22	Tierra	Raíz hasta 15h, Flor desde 16h	
15. Ju ♊ 8	◠ 22	Tierra/Luz	Flor	
16. Vi ♊	♂ ♂ ♆	Luz	Flor hasta 15h, Raíz desde 16h Inicio Plantación 0h	
17. Sa ♋ 16	●12 △	Luz/Agua	Raíz hasta 4h,Flor de 5 a 15h,Hoja desde 16h	
30. Semana				
18. Do ♋		Agua	Hoja	Td
19. Lu ♌ 10	☼ - ♋	Agua/Calor	Hoja hasta 9h, Fruto desde 10h	
20. Ma ♌	☿ ♉21	Calor	----------	Td
21. Mi ♌		Calor	Fruto desde 8h	
22. Ju ♍ 5		Calor/Tierra	Fruto hasta 4h,Raíz desde 5h	Ta
23. Vi ♍		Tierra	Raíz	
24. Sa ♍		Tierra	Raíz	
31.Semana				
25. Do ♎ 16	♉13 ♀ ♂ ♇	Tierra/Luz	Raíz hasta 10h, Flor desde 16h	
26. Lu ♏ 23		Luz/Agua	Flor hasta 22h, Hoja desde 23h	
27. Ma ♏		Agua	Hoja	E
28. Mi ♏		Agua	Hoja Fin plantación 24h	
29. Ju ♐ 2	☋14	Agua/Calor	Hoja hasta 1, Fruto de 2 a 19h	
30. Vi ♐	Pg7	Calor	---------- Fruto desde 16h	
31. Sa ♑ 2	☺ 19	Calor/Tierra	Fruto hasta 1h, Raíz desde 2h	

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♊	♉	♋	♌	♊	♒	♑	♏
3. ♋		22. ♌					
15. ♌							

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de julio

Mercurio y Marte están ante la región de Cáncer y el Sol se añade el 19. El elemento Agua queda bien representado también con Plutón ante Escorpio. Esto aumenta la fuerza de regeneración de los caracoles. Pero gracias a la posición de los otros planetas, se consigue un equilibrio de influencia de elementos. Mercurio pasa el 15 ante Leo y hace compañía a Júpiter. Marte le sigue el 22. Esto provoca un buen desarrollo para las frutas de baya. Sin embargo hemos de escoger para la cosecha y los trabajos los días de Flor y de Fruto. En los muchos ensayos que hemos realizado a lo largo de los años, hemos constatado siempre que la gelatización de frutos de cosechas de días de Hoja y Raíz necesitan un 30% más de azúcar que los de las cosechas de días de Fruto.

Tiempo de plantación: del 16 a las 00h hasta el 28 a las 24h.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 2 a las 8h hasta el 13 a las 24h y el 31 hasta las 00h.

La recolección, almacenamiento y conservación

Para recoger y elaborar todo tipo de fruta y hortaliza para guardar o conservar, hay que evitar los días de Hoja y los periodos indicados con guiones (-------), al igual que para preparar zumo, jalea, mermelada, fruta cocida y fermentados lácticos de verdura como la col. Cociendo los zumos de ciruela, cereza, escaramujo, manzana y pera, se obtiene un concentrado sabroso para untar sobre el pan, pero si se han recogido los frutos en los días antes mencionados, le aparecerá moho en poco tiempo. En la recolección de flores y hojas para infusiones también se evitará estos periodos, ya que perderían bastante aroma. Para todas las actividades mencionadas, los días de Flor y Fruto son los más aconsejables.
Si hacemos uso de los días desfavorables (indicados con guiones) para la cosecha de cereales, al año siguiente tenemos que contar con cornezuelo en los campos de centeno y herrumbre en los campos de trigo.

Agosto 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
32. Semana				
1. Do ♒ 23	☉ -♋ ☿ ♂ ♃	Tierra/Luz	Raíz hasta 22h Flor desde 23	
2. Lu ♒		Luz	Flor	
3. Ma ♓ 18		Luz/Agua	Flor hasta 17h, Hoja desde 18h	
4. Mi ♓		Agua	Hoja	Td
5. Ju ♓		Agua	Hoja hasta 18h----------	
6. Vi ♈ 15		Agua/Calor	Hoja de 8 a 14h,Fruto desde 15h	To M E
7. Sa ♈	☊4	Calor	Fruto hasta 1 y desde 6h	To Ta Td
33. Semana				
8. Do ♉ 14		Calor/Tierra	Fruto hasta 13h, Raíz desde 14h	
9. Lu ♉		Tierra	Raíz	
10. Ma ♉	☉ -♌	Tierra	Raíz	
11. Mi ♊ 15	Ag11	Tierra/Luz	Raíz hasta 6h, Flor desde 7h	
12. Ju ♊	◠4	Luz	Flor Inicio Plantación 4h	
13. Vi ♋ 23	△	Luz/Agua	Flor hasta 22h, Hoja desde 23h	
14. Sa ♋		Agua	Hoja	
34. Semana				
15. Do ♌ 16		Agua/Calor	Hoja hasta las 15h, Fruto desde 16h	Td
16. Lu ♌	●3	Calor	Fruto	
17. Ma ♌		Calor	Fruto	
18. Mi ♍ 11		Calor/Tierra	Fruto hasta 10h ----------	M DC
19. Ju ♍		Tierra	---------- Raíz desde 18h	M
20. Vi ♍		Tierra	Raíz	
21. Sa ♎ 22	♉13	Tierra/Luz	Raíz hasta 11h y de 15 a 21h,Flor desde 22h	
35. Semana				
22. Do ♎		Luz	Flor	To
23. Lu ♏ 5		Luz/Agua	Flor hasta 4h, Hoja desde 5h	
24. Ma ♏		Agua	Hoja	
25. Mi ♐ 10	◡22	Agua/Calor	Hoja hasta 9h,Fruto desde 10h Fin Plantación 8h	
26. Ju ♐		Calor	Fruto hasta 15h----------	M
27. Vi ♑ 11	☉ ♂ ♃ Pg7	Calor/Tierra	---------- Raíz desde 17h	
28. Sa ♑		Tierra	Raíz	Ta
36. Semana				
29. Do ♒ 9		Tierra/Luz	Raíz hasta 8h,Flor desde 9h	
30. Lu ♒	☺ 3	Luz	Flor	
31. Ma ♓ 4		Luz/Agua	Flor hasta 3h, Hoja desde 4h	

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♌	♉	♌	♌	♊	♒	♑	♏
	6. ♊		23. ♍				

Anotaciones

Comentarios al mes de agosto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La situación de los planetas en agosto es tan favorable que tenemos un récord de mes de verano. Las semillas se ven favorecidas. En la cosecha de semillas tenemos que tener de todas formas muy claro que es lo que queremos de las semillas al año siguiente.

Cosecha de semillas de plantas de Fruto: del 15 de julio al 14 de septiembre, siempre en días de Fruto.
En el mismo tiempo: cosecha de semillas de lechuga, espinacas, todo tipo de coles y hierbas medicinales, siempre en días de Hoja
Cosecha de semillas de frutos de Raíz en días de Raíz.

8. Cosecha de semillas de plantas de Hoja en días de Hoja.
9.
10. Cosecha de semillas de oleaginosas en días de Fruto y flor.
11. Día favorable para la **segunda siega** de heno, el día 6.
12.
13. Tiempo de plantación: del 12 a las 4h hasta el 25 las 8h.
14.

Tiempo de plantación en la mitad sur de planeta: del 10 a las 24h hasta el 26 a las 00h

15. **Nuevas parcelas de fresas:**
16. del 15 a las 16h hasta el 18 a las 10h.
17.
18. **Las fresas**
19. Si incluimos las fresas en el proceso de este año, obtendremos buenas cosechas de fresas sanas y con aroma. Esto significa también, que nada más después de la cosecha, hemos de comenzar los trabajos para el año siguiente. Cogemos los zarcillos que quieren salir de las líneas y los ponemos a lo largo de ellas. En los espacios entre las líneas esparcimos compost bien descompuesto, es decir ya hecho tierra. Basta con dos cubos de compost para 10 m2 de superficie. No hemos de echar el compost encima de las plantas. Trabajamos con un cultivador, preferentemente en días de Fruto durante el tiempo de plantación. Hacemos trabajos de cava de dos a tres veces en los espacios entre los caminos. Si practicamos la agricultura biodinámica, en los días de cava añadimos una vez el preparado combinado de boñiga (M. Thun) y dos veces el preparado de sílice por la mañana y una vez a primera hora de la tarde. En primavera quitamos las malas hierbas, pero no hacemos ningún trabajo más.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Septiembre 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Mi ♓	☼ - ♌	Agua	Hoja	
2. Ju ♓		Agua	Hoja hasta 23h	
3. Vi ♈	☊7	Calor	Fruto hasta 5 y desde 10h	
4. Sa ♉ 22		Calor/Tierra	Fruto hasta 21h, Raíz desde 22h	
37. Semana				
5. Do ♉		Tierra	Raíz	Ta
6. Lu ♉		Tierra	Raíz	
7. Ma ♊ 22		Tierra/Luz	Raíz hasta 21h	
8. Mi ♊	☾11 Ag4	Luz	----------	☿☊13
9. Ju ♊		Luz	Flor Inicio Plantación 1h	Td E
10. Vi ♋ 7		Luz/Agua	Flor hasta 6h, Hoja desde 7h	Td
11. Sa ♋		Agua	Hoja hasta 23	To E
38. Semana				
12. Do ♌		Calor	Fruto	
13. Lu ♌		Calor	Fruto hasta 12h----------	
14. Ma ♍ 18	●15	Calor/Tierra	Fruto de 11 a 17h,Raíz desde 18	
15. Mi ♍	☼ - ♍	Tierra	Raíz	To Td
16. Ju ♍		Tierra	Raíz	
17. Vi ♍	♉ 16	Tierra	Raíz hasta 14h y desde 18h	
18. Sa ♎ 4	☿♂♆	Tierra/Luz	Raíz hasta 3h, Flor desde 4h	
39. Semana				
19. Do ♏ 11		Luz/Agua	Flor hasta 10h Hoja desde 11h	
20. Lu. ♏		Agua	Hoja	To
21. Ma ♐ 16		Agua/Calor	Hoja hasta 15h, Fruto desde 16h Fin Plantac.14h	
22. Mi ♐	☽4 Pg22	Calor	Fruto hasta 8h----------	To E
23. Ju ♑ 18		Calor/Tierra	Fruto de 5 a 17h, Raíz desde 18h	
24. Vi ♑		Tierra	Raíz	
25. Sa ♒ 18		Tierra/Luz	Raíz hasta 17h, Flor desde 18h hasta 21h	
40. Semana				
26. Do ♒		Luz	----------	
27. Lu ♓ 13		Luz/Agua	Flor de 5h a 12h, Hoja desde las 13h	To E
28. Ma ♓	☺14 ☿☊19	Agua	----------	M
29. Mi ♓		Agua	----------	
30. Ju ♈ 9	☊15	Agua/Calor	----------	DC

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♌	♊	♌	♍	♊	♒	♑	♏
25. ♍	4. ♋	15. ♍					
	23. ♌						

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Comentarios al mes de septiembre

A lo largo del mes de septiembre, las relaciones de los elementos cambian profundamente, debido a los movimientos de los planetas ante el zodiaco. Júpiter pasa ante la región de Virgo, Marte y Mercurio le siguen durante el mes. Solamente Venus hace compañía al Sol durante un tiempo. La constelación de Virgo nos trae definitivamente el otoño con fuertes nieblas y poco sol. Venus se queda tres semanas ante la constelación de Cáncer en posición de trígono con Plutón, dejando que el rocío permanezca hasta bien entrada la mañana.
Este año, septiembre nos hace esperar una buena calidad de semillas y antes de mediados de mes, una buena época para las cosecha de frutos de Raíz. Solamente los cinco últimos días de septiembre hemos de omitirlos tanto para la cosecha como para la siembra.

Tiempo de plantación:
del 9 a la 1h hasta el 21 a las 14h.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta:
del 7 a las 24h hasta el 23 a las 00h.

Para la cosecha de fruta recomendamos los días en los que la Luna se encuentra ante Aries o Sagitario. Los últimos ensayos de parcelas lo han demostrado nuevamente. Según los ensayos de parcelas, sin duda alguna, las mejores cosechas de frutos de Raíz como cebollas, zanahorias, remolachas y patatas, son las cosechas en días de Raíz.

Octubre 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Vi ♈	☌ - ♍	Calor	Fruto desde 9h,	Td To
2. Sa ♉ 7		Calor/Tierra	Fruto hasta 6h, Raiz desde 7h	Ta DC
41. Semana				
3. Do ♉		Tierra	Raiz	Ta
4. Lu ♉		Tierra	Raiz	Td
5. Ma ♊ 6	☍19 △Ag23	Tierra/Luz	Raiz hasta 18h----------	Td
6. Mi ♊		Luz	---------- Flor desde 20h	
7. Ju ♋ 15		Luz/Agua	Flor hasta 14h, Hoja desde 15h Inicio Plantac.1h	
8. Vi ♋		Agua	Hoja	Ta DC
9. Sa ♌ 8		Agua/Calor	Hoja hasta 7h,Fruto desde 8h	DC
42. Semana				
10. Do ♌		Calor	Fruto	Ta
11. Lu ♌		Calor	Fruto	Ta
12. Ma ♍ 2		Calor/Tierra	Fruto hasta 1h,Raiz de 2 a 18h	
13. Mi ♍	☌♂	Tierra	----------	
14. Ju ♍	●4 ☌23	Tierra	---------- ☌☿☌	
15. Vi ♎ 11	△	Tierra/Luz	Raiz desde 10, Flor de 11 a 17h Raiz desde 18h	
16. Sa ♏ 17	☿☌20	Luz/Agua	----------	
43. Semana				
17. Do ♏		Agua	Hoja de 4 a 13h,---------- Fin plantación 12h	
18. Lu ♐ 21	Pg1	Agua/Calor	----------Hoja de 13 a 20h, Fruto desde 21h	
19. Ma ♐	☾9	Calor	Fruto	To E
20. Mi ♐		Calor	Fruto hasta 23h	E
21. Ju ♑		Tierra	Raiz	Ta
22. Vi ♑		Tierra	Raiz hasta 23h	
23. Sa ♒		Luz	Flor	To Td
44. Semana				
24. Do ♓ 20		Luz/Agua	Flor hasta 19h, Hoja desde 20h	Ta
25. Lu ♓		Agua	Hoja	
26. Ma ♓		Agua	Hoja hasta 20h	
27. Mi ♈ 17	☊23	Agua/Calor	Hoja de 3 a 16h, Fruto de 17 a 21h	To
28. Ju ♈	☺4 ☾☌	Calor	Fruto desde 7h	To E
29. Vi ♉ 15		Calor/Tierra	Fruto hasta 5 y de 12 a 14h, Raiz desde 15h	
30. Sa ♉		Tierra	Raiz	
45. Semana				
31. Do ♉		Tierra	Raiz	Fin de cambio de horario

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♍	♌	♍	♍	♊	♒	♑	♏
21. ♎	23. ♍			20. ♋			

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de octubre

Mercurio sigue todavía tres semanas cerca del Sol, Marte y Júpiter se encuentran ante Virgo. Se junta a ellos, Venus el 23. Saturno deja la región de Luz de Géminis y retrocede el 20 ante la región de Cáncer. Desconocemos lo que esto significa para la multiplicación de los caracoles, ya que hace 30 años cuando tuvimos esta constelación, todavía no existían las plagas de caracoles.

Tiempo de plantación:
del 7 a la1h hasta el 17 a las 12 h

Ya que la época para enterrar los bulbos es noviembre, podemos utilizar ya los días 23 y 24 de octubre.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 4 a las 24h al 19 a las 12h.

Del 13 al 14, la Luna ocultará Marte, el Sol y Mercurio, uno detrás de otro, por lo que estos días son desfavorables para la siembra y la cosecha.

Para talar madera destinada a usos especiales, tenemos pocos tiempos favorables. Recomendamos que el día 6 haga un corte en la corteza de los árboles destinados para usos especiales y que los tale en noviembre durante el tiempo de plantación.

Noviembre 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Lu ♊ 14	☼ - ♎	Tierra/Luz	Raíz hasta 13h, Flor desde 14h	
2. Ma ♊	☽ 3 △ Ag19	Luz	Flor	
3. Mi ♋ 23		Luz/Agua	Flor hasta 22h, Hoja desde 23h	Inicio plantac.00h
4. Ju ♋		Agua	Hoja hasta 17h,----------	To DC
5. Vi ♌ 17		Agua/Calor	----------	Ta DC E
6. Sa ♌		Calor	----------Fruto desde 12h	Ta Td
46. Semana				
7. Do ♌		Calor	Fruto	
8. Lu ♍ 12	△	Calor/Tierra	Fruto hasta 8h, Raíz desde 9h	DC
9. Ma ♍	♃ ☌	Tierra	Raíz hasta 13h----------	
10. Mi ♍	♀ ☌	Tierra	----------	
11. Ju ♎ 21	♉9 ♂ ☌	Tierra/Luz	Raíz de 12 a 20h, Flor desde 21h	Ta DC E
12. Vi ♎	●15	Luz	Flor	To Ta
13. Sa ♏ 3		Luz/Agua	Flor hasta 2h, Hoja de 3h a 19h	Fin Plantac.19h
47. Semana				
14. Do ♏	Pg15 ☿ ☌	Agua	----------	
15. Lu ♐ 5	☾ 16	Agua/Calor	Hoja hasta 4h, Fruto desde 5h	
16. Ma ♐		Calor	Fruto	
17. Mi ♑ 6		Calor/Tierra	Fruto hasta 5h, Raíz desde 6h	
18. Ju ♑		Tierra	Raíz	
19. Vi ♒ 5	☼ - ♏ △	Tierra/Luz	Hoja hasta 10h, Flor desde 11h	
20. Sa ♒		Luz	Flor	Td E DC
48. Semana				
21. Do ♓ 1		Agua	Hoja desde 1h	
22. Lu ♓		Agua	Hoja hasta 12h----------	DC
23. Ma ♓		Agua	Hoja hasta 23	DC
24. Mi ♈	☊5	Calor	----------	Ta
25. Ju ♉ 22		Calor/Tierra	Fruto hasta 21h, Raíz desde 22h	
26. Vi ♉	☺21	Tierra	Raíz	
27. Sa ♉		Tierra	Raíz	Ta E
49.Semana				
28. Do ♊ 22		Tierra/Luz	Raíz hasta 21h, Flor desde 22h	
29. Lu ♊	☽ 10 △	Luz	Raíz hasta 11h, Flor desde 12h	Inicio plant.10h
30. Ma ♊	Ag12	Luz	Flor	E

Época de plantación

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
☌	♍	♍	♍	♋	♒	♑	♏
2. ♏	30. ☌	25. ☌		27. ♊			

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Comentarios al mes de noviembre

Definitivamente ha llegado el otoño. En un movimiento retrógrado, Saturno vuelve ante la región de Géminis hasta finales de año. Si vamos a notar algo por ello, ya lo veremos.

Tiempo de plantación: del 3 a las 00h hasta el 13 a las 19h y a partir del 29 a las 10h hasta el 30 Este tiempo es favorable para la poda de árboles y vides. Escogeremos los días de Flor y Fruto

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: hasta el 1 a las 24h y a partir del 16 a las 00h hasta el 28 a las 24 h.

Para enterrar los bulbos: el día 1 por la tarde, y los días 2, 3, 12, 19, 20, 29 y 30.

La poda de madera de construcción es posible en el tiempo de plantación. Escogeremos los días de Flor y evitaremos los días indicados con guiones.

Tala de árbol de Navidad: para enviar: del 16 al 28, en días de Flor y Fruto, evitar los días con guiones.

Tiempo de siembra para árboles y arbustos

22-1	☿☍♄	Ciruelo, enebro, tuya, endrino, alerce, acacia Arándanos, pino común, cerezo de racimo o aliso
29-1	♀☍♃	Abedul, peral, tilo, ciruelo amarillo, manzano, arce
4-3	☿☍♃	Olmo, vid, manzano silvestre, melocotonero, castaño, haya
4-3	☉☍♃	Manzana silvestre, arce, fresno, espino albar, Abeto, Nogal
24-4	♂☍♇	Serbal, cerezo silvestre, roble, membrillo
2-5	♀☍♇	Abedul, peral, tilo, ciruelo amarillo, ciruelo silvestre
3-6	♀☍♇	Abedul, peral, tilo , ciruelo amarillo, ciruelo silvestre
11-6	☉☍♇	Fresno, abeto, avellano, oxiacanta, cedro
15-6	☿☍♇	Frambueso, alerce

Diciembre 2004

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Época de plantación	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Mi ♋ 6	☼ - ♏	Luz/Agua		Flor hasta 5h, Hoja desde 6h	Plantación
2. Ju ♋		Agua		Hoja	
3. Vi ♌ 1		Calor		Fruto desde 1h	To DC
4. Sa ♌		Calor		Fruto	Td
50. Semana					
5. Do ♍ 21	☿☊13	Calor/Tierra		----------	E
6. Lu ♍		Tierra		Raíz	Td
7. Ma ♍	♃	Tierra		Raíz hasta 10h y desde 15h	
8. Mi ♍	♉ 18	Tierra		Raíz hasta 16h y desde 20h	DC
9. Ju ♎ 8		Tierra/Luz		Raíz hasta 7h, Flor desde 8h	Td
10. Vi ♏ 14		Luz/Agua		Flor hasta 13h, Hoja desde 14h	
11. Sa ♏		Agua		Hoja — Fin Plantación 24h	Td
51. Semana					
12. Do ♐ 15	●3 Pg22	Agua/Calor		----------	DC
13. Lu ♐	☋1 △	Calor		Fruto desde 3h	
14. Ma ♑14		Calor/Tierra		Fruto hasta 13h, Raíz desde 14h	
15. Mi ♑		Tierra		Raíz	
16. Ju ♒ 12		Tierra/Luz		Raíz hasta 11h, Flor desde 12h	
17. Vi ♒		Luz		Flor	DC
18. Sa ♓ 7		Luz/Agua		Flor hasta 6h, Hoja desde 7h	
52. Semana					
19. Do ♓	☼ - ♐ △	Agua		Hoja hasta 10, Flor de 11 a 18h, Hoja 19h	ToTaDC
20. Lu. ♓		Agua		Hoja desde 7h	
21. Ma ♈ 5	☊8	Agua/Calor		Hoja hasta 4h, Fruto desde 10h	
22. Mi ♈		Calor		Fruto	
23. Ju ♉ 4		Calor/Tierra		Fruto hasta 3h, Raíz desde 4h	
24. Vi ♉		Tierra		Raíz	
25. Sa ♉	Navidad	Tierra		Raíz	
53. Semana					
26. Do ♊ 4	☺ 16 ◠ 16	Tierra/Luz		Raíz hasta 3h, Flor desde 4h	
27. Lu ♊	Ag20	Luz		Flor	
28. Ma ♋ 13		Luz/Agua		Flor hasta 12. Hoja desde 13h Inic Plant. 1h	DC Td
29. Mi ♋		Agua		Hoja	
30. Ju ♌ 7		Agua/Calor		Hoja hasta 6h, Fruto desde 7h	
31. Vi ♌		Calor		Fruto	Ta

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♏	♎	♎	♑	♊	♒	♑	♏
	14. ♏	21. ♏					

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de diciembre

En diciembre no hay todavía constelaciones de invierno profundo, quedan para el año nuevo.
Recibimos siempre consultas sobre incineración de pieles contra plagas de animales.
Para todos los animales de sangre roja las fechas son del 23 al 24 hasta las 11 h, después todo tiene que haber acabado.

Tiempo de plantación: del 1 a 11 hasta las 24h y del 28 a la 1 hasta el 31.
Para los bulbos es favorable de nuevo del 9 a las 8h hasta el 10 a las 13h.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta:
del 13 a las 5h hasta el 25 a las 24h.

Poda de árboles y vides: en el tiempo de plantación hasta el 11, en días de Fruto y Flor.
Tala de árboles de Navidad:
tala para uso propio, el 21 y 22.

Tiempo de siembra para árboles y arbustos

16-7	♂☍♆	Grosellero, membrillo, roble, tejo, serbal
25-7	♀☍♇	Peral, abedul, frambueso
1-8	☿☍♄	Albaricoque, melocotonero, serbal, zarzamora
18-8	♂☍♄	Roble, tejo, membrillo, guindo, arándano encarnado
19-8	☿☍♄	Albaricoque, melocotonero, sauco, castaño
27-8	☉☍♄	Avellano, abeto, cedro, olivo, nogal
13-9	☿☍♄	Olmo, vid
18-9	♀☍♆	Cerezo
6-10	♀☍♄	Peral, abedul, tilo, ciruelo amarillo, ciruelo silvestre

Deseamos a nuestros lectores una Feliz Navidad llena de paz.

El cuidado de las abejas

La colmena vive en una colmena de paja o en un cajón, aislada del mundo exterior. Además como protección, las abejas recubren su hogar con propóleo para defender a la colmena de lo nocivo. La unión directa con el mundo exterior se hace a través de las piqueras.

Cuando el apicultor quiere beneficiar a la colmena de las fuerzas cósmicas, tiene que crear en la colmena una situación parecida a la que crea el agricultor cuando cuida sus plantas. Este último trabaja el campo. Con el aire entran las fuerzas cósmicas en la tierra, que son absorbidas por la planta y puede aprovecharlas hasta los próximos trabajos.

El apicultor tiene que abrir la vivienda de la colmena e interrumpir la capa de propóleo. De esta manera se crea un desorden, por el que las fuerzas cósmicas entran en la colmena y pueden actuar hasta el siguiente control. Así el apicultor puede trasmitir fuerzas cósmicas a la colmena de manera acertada.

No es indiferente que tipo de fuerzas se trasmiten en los trabajos en determinados momentos. El apicultor puede intervenir conscientemente y utilizar los días para determinados trabajos que en ese momento son importantes para el desarrollo de la colmena y la producción de alimento de la misma. La colmena recompensa al apicultor y le da parte de la miel de las sustancias almacenadas y bien elaboradas. Recomendamos los días de Tierra/Raíz cuando la colmena tiene que construir intensamente. Los trabajos en días de Luz/Flor estimulan la incubación y ayudan al aumento de la colmena. Los trabajos en días de Calor/Fruto fomentan la búsqueda de néctar. Los días húmedos de Hoja son desfavorables tanto para los trabajos como para la extracción de miel y la centrifugación de la misma.

Desde finales de los años setenta, la varroa está extendida en la mayoría de las colmenas europeas. Después de varios ensayos de incineración, recomendamos incinerar la varroa como de costumbre, triturarla y dinamizarla durante una hora para después pulverizarla entre los pasillos de los panales. La elaboración de la ceniza y su aplicación en la colmena se realizará en ambos casos con el Sol y la Luna ante Tauro (3).

La primavera del 2003 fue "la primavera de horror" de muchos apicultores.
Muchas colmenas estaban vacías. La varroa se había extendido. Fue interesante que las colmenas que en el año anterior fueron tratadas a tiempo con ácido fórmico, pudieron sobrevivir bien el invierno.

Nuestras colmenas nos dieron lo mejor. Pasaron bien el invierno, desarrollaron buenos enjambres y produjeron más miel de lo normal. Los nuevos enjambres con reinas se desarrollaron bien, ofreciendo pequeñas producciones de miel. Podemos decir que este año fue un muy buen año.

Resumiendo, si conseguimos ocuparnos de las necesidades de las abejas, las colmenas crecen sanas y la ceniza de varroa actúa de la manera que esperamos.

Comentarios mensuales para el apicultor

Enero: el 6, 9 y 11 son días de vuelos de purificación. Aconsejamos controlar las piqueras y sacar los restos de la varroa.

Febrero: A pesar de las constelaciones de Calor y Luz de Marte, Júpiter y Saturno tenemos que contar con frío y precipitaciones a partir del 6.

Marzo: en las parcelas tempranas a partir del 5, posibilidad de época de recolección.

Abril: debido a los movimientos retrógrados de Mercurio ante la constelación de Piscis, así como Venus y Marte ante Tauro, volverán las noches frías. Con el fin de evitar pérdidas en la incubación, recomendamos observar el mantenimiento de una temperatura caliente.

Mayo: a partir del 6, Marte nos aporta un suplente para equilibrar la falta de fuerzas de Luz de Venus. A partir del 15, Mercurio pasa ante Aries, lo que hace esperar una recolección. Aprovechar los días de Flor para el crecimiento de la colmena.

Junio: hasta el 18, Marte intentará suplir la falta de fuerzas de Luz de Venus, a partir del 19 lo revela Mercurio. Marte pasa ante la región de Cáncer a partir del 19, provocando precipitaciones. En este tiempo podemos segar plantas nutritivas para la época de recolección de otoño.

Julio: Júpiter está ante Leo. En la segunda mitad de mes pasan Mercurio y algo más tarde Marte ante esta región. Con tal oferta de Leo sólo cabe esperar una buena recolección tardía.

Agosto: Este tiempo es también favorable para enjambres tardíos y para los alimentos de invierno. Volver a segar plantas para las abejas en superficies ya cosechadas, así facelia para la recolección tardía. Esto fortalecerá a la colmena.

Septiembre: Mercurio y Marte siguen ante Leo para apoyar la recolección y el desarrollo de la colmena. Ya tienen que estar terminados los tratamientos con ácido fórmico contra la varroa, ya que las constelaciones de octubre ya traen un clima de otoño.

Octubre: Las constelaciones de Virgo nos traen un clima de otoño. Las colmenas tienen que estar preparadas para invernar.

Guía de tratamiento con Ácido oxálico.
Guía de tratamiento con Ácido fórmico.

Ensayo de cosecha de diente de león entre Viernes Santo y Lunes de Pascua

En nuestro Calendario, omitimos los días de viernes santo y sábado santo, no son recomendables para la siembra. Siempre hay algunas personas que al parecer, obtienen un buen crecimiento de sus plantas sembradas en estos días. En nuestra comunidad de Marburg existían algunos agricultores, unos 80 pequeños agricultores y uno con grandes extensiones. Este último seleccionaba para los pequeños agricultores las plantas que necesitaban un invernadero, así como en el caso del apio. Este agricultor había sembrado apio, las semillas habían germinado bien y el sábado santo trasladó las pequeñas en paletas. En un segundo encuentro nos contaba con horror que todas las plantas de apio se habían muerto.

Solicité a todos los miembros que en el próximo año sembrasen semillas de una misma especie, a ser posible de jueves santo hasta el segundo día después del lunes de Pascua. Unos cincuenta practicantes por hobby y por supuesto nuestros agricultores siguieron mi petición y sembraron la planta que mejor les venía.

Todas las siembras del viernes santo y el sábado santo fueron malas. Solo una mujer nos mostró una planta en buen estado. Era una mujer que empezaba cada frase con un "sí pero". Todos los demás no se extrañaron que con ella todo fuera diferente. Podemos decir que siempre hay excepciones.

Durante años, hemos incluido estos días en nuestras series de siembra. Los resultados eran negativos. A veces germinaban las plantas una vez al aire libre, por fuerza de germinación del año anterior, pero en el caso de los cereales se morían poco después, antes de que creciera la segunda hoja.

Nuestra pregunta: ¿Estos días son también negativos para la cosecha?

En el año 2003, el diente de león ya florecía en jueves santo. El viernes santo era día de Flor, es decir un día para cosecha de plantas de Flor. Cada día cosechábamos flores siempre a la misma hora, cogíamos aquellas que estaban todavía cerradas en el interior. Después las poníamos en un lugar adecuado a secar.

Teníamos entonces flores con la Luna ante Libra (cosecha de viernes santo), la Luna ante Escorpio (cosecha de sábado santo), la Luna ante Escorpio (cosecha de domingo de Pascua), la Luna ante Sagitario (cosecha de lunes de Pascua). Al mismo tiempo yo había cosechado también ortigas.

Flores de diente de león secadas. Cosechadas en diferentes días

El lunes de Pascua preparé una infusión. Se cogieron las flores de diente de león, se les añadió agua hirviendo. Se pusieron las ortigas por separado en agua fría y cuando el agua empezó a hervir se las retiró del fuego. Llené macetas con tierra y sembré en cada maceta 25 semillas de trigo de verano. Regamos las macetas con infusión enfriada durante una semana, todos los días se medía y se regaba. La mitad de las macetas se regó con infusión de diente de león, la otra mitad con infusión de ortiga. Los cultivos testigos se regaron con agua.

Después de una semana, los resultados eran los siguientes:

Cosecha de viernes santo, infusión de diente de león	☽ ♌	4 semillas germinadas
Cosecha de sábado santo, infusión de diente de león	☽ ♏	5 semillas germinadas
Cosecha domingo de Pascua, infusión de diente de león	☽ ♏	9 semillas germinadas
Cosecha lunes de Pascua, infusión de diente de león	☽ ♐	22 semillas germinadas
Agua Cultivo control 1		18 semillas germinadas
Cosecha de viernes santo, infusión de ortiga	☽ ♌	7 semillas germinadas
Cosecha de sábado santo, infusión de ortiga	☽ ♏	10 semillas germinadas
Cosecha de domingo de Pascua, infusión de ortiga	☽ ♏	7 semillas germinadas
Cosecha de lunes de Pascua, infusión de ortiga	☽ ♐	23 semillas germinadas
Agua Cultivo control 2		18 semillas germinadas

Aplicación de infusiones en sembrados de trigo

Esto demuestra que la posición de la Luna es importante. Como ya hemos demostrado durante años, estos dos días no sólo son desfavorables para las siembras, sino también para la cosecha. Sí diéramos estas infusiones a beber, no cabe esperar ningún valor curativo. Podemos reflexionar durante años, y llegar a la conclusión, que lo que sucedió en Gólgota marcó cósmicamente de tal manera a la Tierra que las plantas lo reviven cada año. Parece que la naturaleza deja de respirar, lo que también sienten las personas sensibles.

Paso de Mercurio ante el disco solar el 7.5.2003

Después de que Mercurio pasó detrás del Sol el 22 de marzo, cruzó el 30 de marzo su nudo ascendente y atravesó la eclíptica. En su camino, el 26 hizo un movimiento retrógrado, dirigiéndose hacia el Sol y cruzó el Sol el día 7 de mayo, pasando cerca de la Tierra. Estos movimientos pertenecen a su ritmo, y suceden cada 11 años.

Hace 33 años, exactamente el 9 de mayo de 1979, cuando Mercurio hacia el mismo recorrido, pudimos observarlo bien con un disco tiznado. Vimos dos puntos oscuros en el Sol, no se movían, eran por tanto manchas solares. Ahí se le pudo ver.

Para mí, este día era de gran importancia para los trabajos de la tierra y las siembras, esta vez de espinacas, realizadas a lo largo del día cada hora.

En aquel entonces (1970), realizamos trabajos con la tierra cada hora en los ensayos de hierbas adventicias. Después esperamos que hierbas iban a germinar con esta constelación. Sólo creció manzanilla, que ni siquiera la habíamos sembrado.

Esperamos el desarrollo de las plantas. De nuevo sólo apareció manzanilla, pero la tormenta del 10 de junio arrastró todas las plantas. Sólo aquellas que estaban en la misma fila, como las espinacas, pudieron soportarlo. Esperamos los resultados de este año.

Sembrado de espinacas durante el paso de Mercurio

Vemos el día más en detalle. El Sol se encuentra ante la constelación de Tauro. La Luna pasa ante Géminis, es decir es un día de Flor. Pero en nuestro Calendario, este día se omite, ya que Mercurio forma un nodo con la eclíptica. Esto tiene un efecto negativo sobre las siembras. Algunos de nuestros amigos opinan que en el caso de un paso de Mercurio, el Sol aumenta el efecto de Mercurio.

Nos decidimos a hacer un ensayo de siembra con una planta de Hoja: con espinacas. En comparación con otras siembras de espinacas, las hojas son pequeñas. Crece muy rápido y como otras siembras en días de Flor, aparecen muchas plantas masculinas. Como los análisis de años anteriores, las plantas arrojaron altos niveles de nitrato en comparación con las plantas femeninas. La producción de semillas en estos casos era menor que lo normal en las plantas femeninas y la capacidad de germinación del año siguiente quedaba también marcada.

Esperemos que el clima será complaciente, y podamos cosechar las semillas. Los análisis y el cultivo neutral al año siguiente nos permitirán llegar a conclusiones.

Eclipse solar el 31.5.2003

Estamos equipados, todos los aparatos preparados. Días antes nos hemos informado, dónde en esta época del año, podíamos observar el horizonte con la salida de Sol en nuestros campos de colinas. La tierra está preparada, pudiendo sembrar cada hora rabanitos y trigo. Desgraciadamente un banco de nubes nos quita la visión y sólo podemos fotografiar la parte final.

Fase final del eclipse

Nuestro telescopio

El número de semillas germinadas de las siembras muestran grandes diferencias. Pero tenemos que esperar al desarrollo de las semillas, ya que sólo en los cultivos sucesivos del año siguiente podemos apreciar los daños en la capacidad de reproducción. En las siembras con eclipses, germinan sólo unas pocas semillas, y a menudo ninguna. Ya hemos realizado muchas veces siembras en serie durante los eclipses, incluso cada media hora. Pasando las horas, siempre hay una siembra que crece de manera satisfactoria. A veces es a la mitad, a veces al principio, a veces al final. Pero hasta ahora no hemos dado con la ley que actúa. Si llevamos a cabo una siembra que casualmente es en la hora correcta, entonces nuestras afirmaciones no son correctas. De momento por tanto seguimos recomendando omitir durante todo el tiempo las siembras.

Siembra durante el eclipse de sol

¿Cómo utilizar en la práctica los ritmos ascendentes y descendentes?
Tiempo de plantación

En la página 17 hemos descrito detalladamente las razones cósmicas del tiempo de plantación. Lea varias veces esta página para que capte bien el concepto de luna "descendente" y no confundirlo con la luna menguante, es decir con las fases lunares.

En el tiempo de luna descendente se puede sembrar normalmente, dependiendo de los impulsos de los días según las constelaciones lunares y los ritmos planetarios. Durante estas casi dos semanas, se produce una aceleración en la formación de nuevas raíces, cuando trasplantamos las plantas.

Siempre nos asombramos con qué rapidez echan raíces las estacas y las ramas que enterramos en este tiempo.

También hay que considerar la posición de la Luna ante las constelaciones, por ejemplo la región de Géminis al principio del tiempo de plantación. Los primeros dos días son días de Flor, es decir que además se dan buenas condiciones para un buen enraizamiento.

Enterramos estacas de rosal y restos de rosas cortadas de diferentes tipos. Como podemos ver en la imagen, han enraizado bien y florecen maravillosamente.

Después de dos días, la Luna está ante Cáncer. Todavía es tiempo de plantación en día de Hoja. Podemos trasplantar al aire libre lechugas o repollo, según lo que queramos. Pronto se harán a la tierra y crecerán perfectamente.

Para los rosales, los días de Hoja no son favorables, ya que no son plantas de Hoja. Se enraízan, porque es tiempo de plantación, pero no florecen, sólo dan hojas.
Después pasa la luna ante Leo. Podemos sembrar plantas de Fruto, pero también trasplantarlas. Estos días son adecuados para los tomates, los pepinos, los pimientos, los calabacines, las berenjenas y otros, pero no para los rosales.

Plantas de fruto

Después de unos días pasa la Luna ante la constelación de Virgo. Son días de Raíz y todavía tiempo de plantación. Es un tiempo adecuado para pasar el apio al aire libre. Pero los rosales también gustan de estos días.
La Luna se encuentra en perigeo (cerca de la Tierra). Estos días son desfavorables y quedan omitidos en el Calendario. Vuelvo a enterrar estacas de rosales. ¿Cómo se desarrollarán? Se enraízan bien y sus hojas crecen raquíticas. Todo el desarrollo es lento y el crecimiento se para, no echan flores. Están en la habitación en la misma dirección que las "rosas de Géminis". De repente están llenas de pulgones.

Rosales con pulgones

Limpio la planta de pulgones y las planto en tiempo de plantación en días de Flor al aire libre. Después de una semana noto que las plantas respiran y echan nuevos retoños con capullos de rosas.

Hemos hecho ensayos con vides, buscando el mejor tiempo para podarlas y para plantarlas en la tierra. Hemos comprobado que las primeras horas, cuando la Luna está ante Géminis, pero todavía ascendente, es un buen momento para cortar las estacas, ya que están llenas de savia y fuerza. Las conservamos en un lugar fresco unos días, y cuando la Luna se encuentras ante Leo, las plantamos en la tierra. De esta manera enraízan, toman además el impulso de Fruto y se desarrollan para tener buenos frutos.

Estacas de vides de tiempos favorables y desfavorables

El tiempo de plantación es también importante para la tierra. Si plantamos cultivos regeneradores para enriquecer con sustancias orgánicas la tierra, y lo hacemos en el tiempo de plantación, estas plantas trabajan la superficie durante el tiempo de plantación, y los organismos de la tierra comienzan rápidamente con el trabajo de transformación. Si plantamos los cultivos con la Luna ascendente, empiezan a crecer en poco tiempo y el efecto deseado es mínimo. Lo mismo sucede con el acolchonamiento (mulching). Cuando ponemos una capa de acolchonamiento durante el tiempo de plantación, los organismos de la tierra la trabajan en seguida, mientras que el mismo material de acolchonamiento, colocado durante la luna ascendente, pronto se convierte en heno y sólo sirve para tapar la tierra, ya que las mejores fuerzas se han escapado al aire.

Paja cortada de cultivos intermedios para estiércol (mulching)

La imagen perfecta de las fuerzas ascendentes y descendentes la tenemos a lo largo del curso del año. De principios de enero al solsticio de verano, el Sol es ascendente. Sus curvas suben a diario un poco, hasta su punto álgido en día de San Juan. Después de diez días de la misma altura, las curvas empiezan a descender, hasta que en la mitad norte del planeta, en la época de Navidad, el Sol pasa en curvas casi lineales en el cielo. (En la mitad sur del planeta es al contrarío).

La Luna imita cada mes estos ritmos ascendentes y descendentes. Pero no sólo la Luna imita al Sol, sino que todos los planetas hacen lo mismo. Por ejemplo, un año de Saturno son 30 años terrestres, un año de Júpiter son 12 años terrestres, un año de Urano son 84 años terrestres y un año de Plutón son 248 años terrestres.

Pero también la Tierra sigue este ritmo anual del Sol. Hasta el medio día tenemos fuerzas ascendentes y en la segunda mitad del día fuerzas descendentes. Si cosechamos lechuga por la mañana, todas las fuerzas están concentradas en las hojas, y se mantendrán frescas largo tiempo. Si cosechamos al medio día o por la tarde, las hojas se marchitarán ya al cogerlas, de cabezas de lechugas iguales, tendremos menos masa en el plato. Si comprobamos el peso de lechugas de igual tamaño, las cosechadas por la tarde han perdido de un 8 a un 10% de su peso en las raíces. Por eso el agricultor, cosecha por la mañana, porque la savia ascendente garantiza más tiempo frescura.

Otro es el caso de los rabanitos. Los rabanitos cosechados por la mañana, se mantienen frescos en la hoja, pero el tubérculo pronto se marchita, si los cosechamos por la tarde, la raíz se mantiene crujiente y macizo, pero las hojas marchitan pronto.

Si cortamos flores por la mañana, se mantienen frescas en el jarrón más tiempo que las cortadas por la tarde. Hagámonos conscientes de cómo actúan estas fuerzas y guiemos nuestro trabajo según ellas. Esto tiene un gran significado tanto para la actividad de la Naturaleza como para la alimentación de las personas.

Unos amigos de Canadá que tienen grandes bosques de arce para elaborar sirope, me comentaban que dependen en gran parte de ciertos ritmos cósmicos, y en el caso del arce, los ritmos de Júpiter son de gran importancia.

Los animales viven estas fuerzas también en parte. Así se cuenta que los elefantes indios pueden levantar grandes troncos u otras cargas pesadas hasta las 11.30 h, pero que se niegan a hacer este trabajo más tarde. Es decir, que cuando actúan las fuerzas ascendentes durante el día tienen mejores fuerzas que cuando actúan las fuerzas descendentes.

Ensayos por horas con trigo de verano 2003

En el campo de ensayo de “Feideracker”, en la parcela 5, sembramos el 22 de abril a lo largo del día 8 cultivos de trigo de verano. Matias hace las siembras con una gran máquina de sembrar. Debido a una difícil constelación de Plutón empezamos a sembrar a las 9h y a parte de los bordes necesarios sólo pudimos trabajar 8 espacios. Las semillas las tenemos de un socio nuestro, Grönwold. Así no dependemos de las semillas que se venden en los comercios. Este año queremos testar los preparados y las diferentes infusiones. Al mismo tiempo se realiza un ensayo con oleaginosas en el campo de 'Hassenrothacker".

Ensayo con patatas 2003

En el año 2002 hicimos ensayos de abonos con cinco diferentes tipos de patatas. De todas las variantes hicimos ensayos de cultivos sucesivos. Queremos ver como resultan las fuerzas regeneradoras de las patatas con los diferentes métodos de abono y tratamientos. Al mismo tiempo hemos realizado un ensayo por horas en tiempo de plantación en los campos de ensayo de Hassenroth. Las patatas de ambos ensayos se plantaron el 23 de abril.

Ensayo por horas con espinacas el 8 de mayo

Las parcelas 9 y 10 en el campo de ensayo están preparadas y comenzamos con las siembras a las 6.30 h. En el paso de Mercurio de ayer utilizamos nuestras propias semillas. El tipo de semilla "super green" la traje en 1967 de Dinamarca y desde entonces es la que utilizo en las siembras. También las usamos en los ensayos por horas en los años 2001 y 2002. En el año 2002 realizamos los ensayos con iguales semillas. Ahora sembramos con diferentes variantes a las mismas horas que en el año anterior. Queremos saber, si las influencias positivas o negativas del día se acumulan o disminuyen. La última siembra la realizamos a las 18.30h, las variantes de semillas de los sembrados sucesivos del año anterior se siembran en una hora como cultivo sucesivo neutral. A la tarde pulverizamos la mitad de los ensayos con el preparado combinado de estiércol. En el momento oportuno, dentro del mismo día se cosechan de todas las variantes cinco metros para ser analizados en el laboratorio. Aquí se comprueba cuantas plantas femeninas y masculinas de cada variante existen. El resto queda para obtener semillas.

Ensayo por horas con cebada desnuda el 8 de mayo

En el año 2002 hicimos siembras durante 24 horas con cebada desnuda de nuestras propias semillas. En el año 2003 repetimos el mismo ensayo, sembrando las semillas a las mismas horas que el año anterior. Igual que con los ensayos de espinacas, sembramos a lo largo del día y las semillas del cultivo del año anterior las sembramos durante una hora como cultivo sucesivo neutro.

Preparamos bien la tierra antes. Utilizamos para este ensayo la parcela 11 en el campo de ensayo. El año anterior también hicimos estos ensayos en Feideracker.

Ensayo de trigo

Ya que entre las siembras de las diferentes variantes queda algo de tiempo, sembramos las espinacas y la cebada desnuda el mismo día. Con las máquinas de siembra esto es posible, ya que se usa la misma posición para todo el ensayo. Durante los ensayos por horas no habíamos usado hasta ahora las pulverizaciones biodinámicas, pero ahora hemos ampliado las superficies y pueden ser aplicadas.

Las hormigas

Muchos lectores se quejan de la plaga de hormigas en los huertos y en la casa. Tenemos que saber que las hormigas hacen sus caminos sobre arterias de agua o corrientes telúricas. En el caso de hormigas en las viviendas recomendamos eliminar las perturbaciones en las habitaciones con hormigas. Encontramos información sobre las costumbres de las hormigas en dos libros del profesor K. Grösswald, que aparecieron hace unos cincuenta años en la editorial Kosmos de Stuttgart. Por mi propia experiencia, puedo contar que hace 40 años, constatamos en nuestras excursiones en los bosques de Wollenberg, que bajo los pinos de Noruega no crecía ningún tipo de planta, la tierra alrededor estaba cubierta con una capa gruesa de pinochas. Había grandes montones de hormigas. Después de pocos años, la tierra estaba llena de todo tipo de plantas, pero ya no se veían hormigas. Cuando han cumplido con su tarea, se van a otro lugar a continuar su trabajo. Estos animales tan aplicados, habían llenado de ácido fórmico sus caminos y habían cambiado la tierra y aparentemente también habían llevado semillas de planta al lugar (2).

Cuando aparecen hormigas en los cultivos, es una señal de pobreza de humus. Recomendamos utilizar mayores cantidades de compost en otoño. Si aun así no se van, entonces podemos elaborar abono líquido de ortiga y regar las zonas afectadas. A las hormigas no les gusta y desaparecen. Las hormigas son parte de la policía de la naturaleza. Si en alguna parte hay un animal en descomposición, ellas se llevan el tejido y los huesos evitando desagradables procesos de putrefacción en la naturaleza. A veces no tienen suficiente paciencia, hasta que los animales han muerto, y atacan a los animales pequeños debilitados y aceleran su muerte.

Abejorro atacado por las hormigas

Cuidado de parcelas de frutales, vides y matorrales de frutos de baya

Los agricultores de frutales y vides nos han solicitado información sobre el cuidado de los cultivos de frutales, vides y matorrales de frutos de baya (sin los arándanos):
En la mitad norte del planeta los cultivos de frutales comienzan a principios de noviembre. Primero, por cada hectárea hay que echar 10tn (10.000 kg) de compost hecho. Cuando haya terminado la caída de la hoja, podemos llevar a cabo tres trabajos en la tierra en días de Fruto, al mismo tiempo que pulverizamos el preparado combinado de bostas boñiga (preparado de María Thun) (con la masa para embadurnar el leño) sobre el tronco y las ramas. Esto sustituye al anteriormente recomendado embadurnado del leño en primavera.

Elaboración de la masa para el leño: metemos en una cuba de madera echamos 10 kg de boñigas de vaca, 10 kg de arcilla, 2,5 kg de harina basáltica (¡harina!), 2,5 kg de ceniza de madera, 1 litro de suero. Todo se remueve con una pala durante una hora, es decir se dinamiza. Se deja la masa en un lugar oscuro y fresco y puede utilizarse durante semanas.

Para elaborar el preparado combinado de boñiga María Thun, vertemos un kilo de masa en 100 litros de agua y lo removemos durante 20 minutos. Se deja reposar y se cuela con dos medias de perlón, para que las toberas del pulverizador no se atasquen. Esto se repite tres veces en días de Fruto, al mismo tiempo que los trabajos de laboreo.



Vides



Grosellas

En marzo se pulveriza con el preparado de boñiga tres veces en días de Fruto, al mismo tiempo que los trabajos de laboreo. Pulverizamos también los troncos y las ramas. En primavera, cuando aparezcan las primeras hojas, pulverizamos con una decocción de ortiga una vez por la tarde, en un día de Hoja.

Si después de las primeras flores aparecen las primeras hojas, podemos aplicar la primera pulverización del preparado de sílice sobre las hojas. En un día de Fruto, empezamos a remover una hora antes de que salga el sol, después pulverizamos inmediatamente.

En un día de Flor a primera hora de la mañana, pulverizamos una vez con una infusión de ortiga y una vez con decocción de manzanilla.



Frambuesas

En un día de Fruto puede rociarse infusión de milenrama, independientemente del preparado de sílice.
Para la aplicación de un preparado de sílice como apoyo a la formación de capullos, tenemos en el 2004 varias fechas: 2., + 3., 10., +11., 15. Hasta 17., 21., 26., 29 y 30 de julio. Cuando es necesaria una poda de verano, escogemos un día de flor o de fruto, entre el 18 y 30 de julio.

Para la cosecha de frutos para ser conservados, escogemos días de Flor o de Fruto, que sean con la Luna ascendente, es decir no en el tiempo de plantación. Después de la cosecha, pero antes de que caiga la hoja, aplicamos una pulverización de sílice en un día de Fruto a primeras horas de la tarde, a partir de las 15 horas. Esta pulverización permite madurar a la madera y es una medida preventiva para posibles parásitos y hongos para el año próximo.

Las infusiones siempre han de pulverizarse sobre las hojas.

Notas bibliográficas

1. Curso de agricultura biológico-dinámica, Rudolf Steiner GA 327 Ed. R.S.
2. Sobre las abejas, Rudolf Steiner GA 351
3. Die Biene, Haltung und Pflege (La abeja, conducta y cuidados), Matthias K. Thun.
4. El control de las plagas. María Thun. 88 páginas Ed. Rudolf Steiner, Madrid.
5. Constelaciones y agricultura biodinámica, María Thun.
6. Kosmologische und Evolutionsaspekte (Cosmología y aspectos evolutivos). Para los cálculos astronómicos sirvieron las efemérides Raphael´s astromical Ephemeris of the Planet for 2004, Londres, así como la experiencia adquirida en los ensayos.
7. La elaboración de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. Scheibe, H. Heilmann.
8. El empleo de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. Scheibe, H. Heilmann. U.J. König.
9. Las acciones de los planetas y los procesos vitales en el ser humano y en la tierra. B.C.J. Lievegoed.
10. Sembrar plantar y recolectar en armonía con el cosmos. María Thun. Ed. R.S.
11. ¿Qué es la agricultura biodinámica? Herbert Koepf. Ed. R.S.
12. La granja y el huerto biodinámicos (Tierra y pan). Kjell Arman. Ed. R.S.
13. La fertilidad de la tierra, su conservación y renovación. Ehrenfried Pfeiffer. Ed. Antroposófica. 388 pág. Disponible en Ed. R.S.
14. Cultivar en armonía con la Luna y el Cielo. Xavier Florín. Ed. Susaeta.

Asociación de Agricultura Biodinámica de España

Se fundó el 28 de abril de 1981 en Canarias. Allí el 19 de febrero de 1987 volvió a fundarse con ámbito nacional. Sus fines son promover, guiar y proteger el método agrícola biodinámico, sus prácticas y principios. Para ello, la Asociación apoya las publicaciones y la comunicación, el asesoramiento, conferencias, cursillos, reuniones con los grupos regionales, el suministro de los preparados, etc.

Ser miembro de la Asociación está abierto a cualquier persona con interés en promocionar actividades como las mencionadas. La cuota anual es de xxx euros. Los miembros reciben descuentos en cursos.

Solicitud de preparados biodinámicos en España.











Para todos: Agricultores y Apicultores.
Contiene recomendaciones de las fechas favorables
para sembrar, cultivar, cosechar y elaborar preparados.

ISBN 84-89197-77-6
9 788489 197770

EDITORIAL RUDOLF STEINER

c/ Guipúzcoa 11, 1°, 28020 Madrid. Tel. 91 553 14 81. Fax 91 534 81 63 rudolfsteiner@teleline.es