EL ORIGINAL
DESDE HACE 43 AÑOS

Maria Thun

CALENDARIO DE AGRICULTURA BIODINÁMICA 2005



A PARTIR DE ENSAYOS CON LAS CONSTELACIONES

ELABORADO CONJUNTAMENTE POR
MARIA THUN Y MATTHIAS K. THUN

Contenido

Instrucciones para el uso del calendario	3
Cisnes en el río Lahn	4
Retrospección del año 2004	6
Previsiones para el año 2005	7
Saturno en enero, en nodo ascendente	9
Fundamentos sobre el cultivo de las plantas	9
El zodiaco y los trígonos	12
La Luna sideral	13
Clasificación de las plantas para la siembra. Cuidados y cosecha	14
La Luna ascendente y descendente y la época de plantación	15
Sobre el hemisferio Sur	16
Enero y comentarios.	17
Febrero y comentarios. La elaboración de la leche	19
Marzo y comentarios.	21
Abril y comentarios. Recolección de plantas de los preparados biodinámicos	23
Parásitos animales.	25
Mayo y comentarios	26
Junio y comentarios. Plaga de hongos en las plantas	28
Julio y comentarios. Para el apicultor: la alimentación de las abejas	30
Agosto y comentarios. La recolección y el almacenamiento	32
Septiembre y comentarios. Cosecha de fruta	34
Octubre y comentarios. Elaboración de pan de centeno	36
Noviembre y comentarios.	38
Diciembre y comentarios.	40
El cuidado de las abejas	42
Comentarios mensuales para el apicultor	43
Ejemplo de cultivo sucesivo de verdura en un huerto	44
Consejos prácticos para los cultivos sucesivos	45
Compost de sustancias especiales. El cuidado de la frambuesa	46
Compost para setos con flores	47
Método de sucesión de cultivos en la agricultura	48
Siembra de apoyo	50
Las fresas	51
Nuevos campos de fresas	52
Abonos de excrementos de aves	53
Efecto específico de los diferentes abonos animales	53
Tiempo de siembra para árboles y matorrales	55
Cuidado de parcelas de frutales, vides y matorrales de frutos de baya	56
Aparición masiva de insectos nocivos	58
Bibliografía	60
Asociación de Agricultura Biodinámica de España	60
Pedidos de preparados biodinámicos	60

Instrucciones para el uso de este Calendario

A menudo recibimos consultas de lectores que tienen dificultades para interpretar las indicaciones de los meses. Por lo general preguntan por las cifras, que se refieren a las horas del día. Rogamos lean atentamente esta página, donde encontrará respuesta a esas preguntas. Gracias.

- Junto a la fecha y el **día** de la semana está indicada la **constelación** zodiacal ante la que se encuentra la **Luna** durante ese día, con la hora de entrada en dicha constelación. La Luna permanece ante esta constelación hasta que se indica una nueva.
- En la siguiente columna están indicadas otras **posiciones importantes**, por ejemplo para el desarrollo de la planta.
- En la columna tercera se indica especialmente al **apicultor** cuál es el **elemento** más estimulado por la Luna en ese día. Las influencias de calor en tiempos de tormenta se citan como «Tendencia a tormenta» (Ta) en la columna quinta.
- En la columna curta se indica el órgano de desarrollo de la planta que está favorecido por la siembra y los trabajos de cultivo en ese día, con las horas exactas. Si después del órgano no aparece ninguna hora, entonces actúa durante todo el día.
- Por último, en la columna quinta aparecen abreviados otros fenómenos naturales o predicciones meteorológicas que afectan a la disposición general del clima.

Cuando en un mismo día se mencionan elementos diferentes de los que corresponderían a la posición lunar en ese momento, **no se trata de errores** sino de alteraciones debidas a otras **posiciones cósmicas, que modifican y se superponen al impulso lunar-zodiacal** y asimismo favorecen a otro órgano de la planta.
Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa y pueden ser convertidas a la «hora local» en otros continentes.

El cambio de horario de verano no está considerado: Del 27 de marzo al 30 de octubre sumar 1 hora a las dadas en este Calendario.

Símbolos astronómicos y Abreviaturas

Constelación		*Planetas*			*Posición*	*Tendencia a*	
♓	Piscis	☉	Sol	☺	Luna llena	Td	Tempestad
♈	Aries	♁	Tierra	●	Luna Nueva	Ta	Tormenta
♉	Tauro	♀	Venus	☊	Nodo ascendente	To	Terremoto
♊	Géminis	☿	Mercurio	☋	Nodo descendente	DC	Día conflictivo
♋	Cáncer	♂	Marte	◠	Luna descendente	E	Erupción
♌	Leo	♃	Júpiter	◡	Luna ascendente	M	Mal Tiempo
♍	Virgo	♄	Saturno	Pg	Perigeo (luna cerca)	Q	Quintil
♎	Libra	♅	Urano	Ag	Apogeo (luna lejos)	❑	Cuadratura
♏	Escorpio	♆	Neptuno	☌	Eclipse		
♐	Sagitario	♇	Plutón	☍	Eclipse		Trasplante
♑	Capricornio	☍	Oposición	△	Trigono		
♒	Acuario	☌	Conjunción				

Salida del Sol, como la deseamos cuando dinamizamos
El preparado de sílice de cuerno

Cisnes en el río Lahn

Cerca de Marburg junto al río Lahn, en la provincia de Gisselberg, el señor Andreas Ortwein nos ofreció terreno para continuar los ensayos que habíamos empezado en Marburg. A menudo, cuando íbamos allí a mezclar y rociar el preparado de sílice a la salida del sol, nos impresionaba la cantidad de éter palpable. Sentíamos los espíritus de la naturaleza muy cerca de nosotros. No nos extraña que nuestros preparados mostraran aquí un efecto tan positivo. Walter Thun venía regularmente buscando nuevos motivos para sus cuadros. Su cuadro "Cisnes en el río Lahn", muestra el ambiente lleno de luz de este paraje.
La imagen de la página 5 puede solicitarse en el tamaño de 40x50 cm.

Walter Thun, "Cisnes en el río Lahn", óleo.

Retrospección del año 2004

Los tres primeros meses trajeron un clima siempre cambiante, periodos de frío frente a temperaturas casi de verano. Durante los trígonos de calor de los planetas, el termómetro estaba por lo menos a 20°. A principios de febrero, en pleno invierno europeo, uno se paseaba por campos de primavera empezando a florecer, y después, en las primeras semanas de abril se producían muchos accidentes de tráfico, debido a las grandes cantidades de nieve que había en las carreteras. En las noches de Pascua en Dexbach teníamos todavía 4º, por el día algo de sol pero con un frío viento del noreste. En el calendario de 2004 ya habíamos avisado de este clima.
Con gran emoción esperábamos el paso de Venus ante el sol, ya que pocas veces sucede, el 7 de junio de 2004. La posición de nodo de Venus sería un día antes. Ese día produjo una enorme cantidad de luz y calor. Lo contrario de lo que suele producir un nodo descendente de Venus. Los nodos ascendentes de Mercurio producen por ejemplo siempre frío.
Eran las primeras noches calientes del año. Ya en la salida del sol, podíamos apreciar que no había nubes en el cielo. En la salida de sol, pudimos divisar dos superficies oscuras por el telescopio. Suponemos que son manchas solares, ya que no se mueven. Ya las hemos observado en repetidas ocasiones. En el momento esperado, Venus pasa ante el sol, y se ve como un punto negro. La temperatura sube y el día se vuelve calurosamente insoportable.

Venus aparece en el disco solar

Venus sale del disco solar

Toma de Venus con supertele y telescopio

Por supuesto que habíamos preparado siembras. Empezamos a sembrar por la tarde del día 6 de junio, y continuamos en el ritmo de cada dos horas hasta las 9 de la mañana siguiente. Matthias trabajó así mismo la tierra en el campo de ensayo de "Heckacker", plantando después mostaza y rabanitos. Al mismo tiempo, planté espinacas en el invernadero y puse a germinar semillas de mostaza en una cápsula de Petri.

Salida del sol 6-6-4

Siembra de mostaza y rabanitos

Mostaza y rabanitos en pleno crecimiento

Pruebas de semillas de mostaza
En cápsulas de Petri

Pruebas de semillas de espinacas

La ola de calor se mantuvo hasta el 9 de junio, después volvió el frío con vientos del este.

Previsiones para el año 2005

Generalmente partimos de la base de que los cambios climatológicos son provocados por los cambios medioambientales. Sin embargo tenemos que tener en cuenta también los siguientes puntos: siempre he constatado, desde hace 40 años, que gran parte de la formación del clima en el planeta viene marcada por los ritmos planetarios. Comparemos las posiciones de trígonos de tres años:

Año 2003	10 Trígonos de agua	7 de tierra	14 de luz y 2 de calor
Año 2004	7 Trígonos de agua	8 de tierra	4 de luz y 6 de calor
Año 2005	7 Trígonos de agua	11 de tierra	9 de luz y 2 de calor

En cuanto a las posiciones planetarias:

Año 2003	28 oposiciones de luz y calor	y 15 de tierra y agua
Año 2004	6 oposiciones de luz y calor	y 9 de tierra y agua
Año 2005	9 oposiciones de luz y calor	y 15 de tierra y agua

Si consideramos las posiciones de los planetas ante las constelaciones, así como los movimientos retrógrados de los mismos, durante los cuales muestran sus efectos sobre la Tierra con más fuerza, entonces está claro que la formación del clima en nuestro planeta viene marcada también por los planetas y sus ritmos. Así por ejemplo la mayoría de las inundaciones suceden durante los trígonos de agua.

Volvamos al año 2005.
Mercurio tiene este año su mayor fuerza sobre la Tierra, durante sus movimientos retrógrados ante las constelaciones de agua.
Venus también se mueve ante una constelación de agua a principios de año, la de Escorpio. Después acompaña al sol a lo largo del año, le adelanta y en Navidad, retrocede ante la constelación de Capricornio. Su mayor fuerza aparece en Navidad de 2006.
Marte se mueve en enero ante Escorpio, va detrás del sol, y en octubre se encuentra ante Aries, desde donde retrocede.
Júpiter ha retrocedido a finales de año ante la región de Virgo, y desde allí, no va a tener gran repercusión.
Saturno está a principios de año ante la región de Géminis y cambia más tarde a Cáncer. Desde aquí puede transmitir difícilmente sus fuerzas. Urano sigue ante la región de Acuario donde se siente muy bien.
Neptuno sigue ante la constelación de frío de Capricornio, y Plutón está ante la constelación de agua de Escorpio.
Los eclipses tienen un efecto negativo durante el año. Tenemos dos eclipses de sol y dos de luna. Esto sucede casi todos los años. Pero en este año, Júpiter se verá impedido y además la luna lo tapará 9 veces. Tendremos también cuatro eclipses de Venus, dos de Marte y dos de Mercurio. En estos momentos, la Tierra producirá perturbaciones en su oposición ante la luna, de tal manera que tenemos que omitir del calendario varios días.

Saturno en enero, en nodo ascendente

Todos los planetas, al recorrer su órbita cortan la eclíptica dos veces, una en movimiento ascendente (☊) y otra en movimiento descendente (☋). Si durante ese tiempo realizamos siembras, la luna está perturbada, y en ese margen de tiempo quedan omitidas 3 o 4 horas en el calendario. Mercurio tiene 7 días de nodo al año. Saturno con el recorrido de su órbita de 30 años, tiene durante este tiempo dos épocas de nodo. Hemos observado que necesita 4 meses y medio hasta que se libera del efecto del nodo. Muchos insectos por ejemplo, tienen una fuerte relación con Saturno, y se sienten favorecidos cuando Saturno pasa por su nodo ascendente. El tiempo del nodo será el 8 de enero. Esto significa que a partir de octubre de 2004 ya tenemos que contar con los efectos del nodo, es decir con tiempos desfavorables para la siembre en las conjunciones de Luna-Saturno.
Hace 30 años, en agosto de 1975, Saturno estaba en su nodo ascendente. Ese año apareció en masa la mariposa nocturna. En aquel entonces se había especializado en zanahorias, y en poco tiempo arrasó hectáreas de superficie de campos de zanahorias. En aquel entonces trabajábamos en conjunto con el profesor von Boguslawski y teníamos ensayos de zanahorias en los campos "Rayas" en Rauischholzhausen. Las plantas tampoco se libraron de la plaga. Cuando iba cada mañana a los campos, había 4 o 5 metros de las filas plantadas comidas. Los animales comían la raíz, la hierba la dejaban al lado. Esto se repetía cada noche. Pero había algo misterioso. Siempre había tres filas comidas, y tres que no las habían tocado. Pero a veces, había 6 filas comidas. Después de estar varios días investigando la causa, comprobé que las filas comidas, tenían zanahorias con cabezas verdes, y las filas de zanahorias intactas, no.
Observé como practicaban la cava las mujeres. Comprobé que en parte retiraban tierra de las plantas y se la pasaban a otras plantas, de tal manera que la cabeza de la zanahoria estaba enterrada. Esto significaba, que cuando la cabeza de la zanahoria no está en la tierra, su cuerpo absorbe clorofila, este es el alimento ideal para la mariposa nocturna. Así el insecto sabía dónde había raíces podridas por la clorofila para poder poner sus huevos.
El insecto no sólo apareció en los cultivos biodinámicas, sino también en los que se trabajaban con abonos minerales. Nos informamos sobre la sustancia como insecticida que ellos recomendarían para combatir la mariposa nocturna. Nos comunicaron que desde hacía 15 años no había aparecido como plaga. Precisamente 15 años antes, Saturno había pasado por su nodo. Lo que para un agricultor es un parásito, para los insectos es un estímulo. De esta experiencia hemos aprendido que hay que tapar las zanahorias. Mejora incluso la calidad. Saturno está esta vez desde finales de octubre de 2004 hasta mediados de marzo de 2005 en nodo. No sabemos qué insecto va a beneficiarse este año. Estaríamos agradecidos si se nos informa de plagas parecidas en otras regiones del planeta.

Fundamentos sobre el cultivo de plantas

Las plantas silvestres esparcen sus semillas libremente en la naturaleza. El viento les ayuda. Lleva las semillas muy lejos, incluso hacia otros continentes. Se posan en cualquier parte de la Tierra. Si la tierra donde caen contiene sustancias que resultan agradables a la planta, entonces crece, se desarrolla completamente y se instaura allí. Las

plantas que no encuentran el lugar correcto, ni las sustancias convenientes, se empobrecen y son ahogadas por las más grandes.
Pocas de estas plantas silvestres son utilizadas por el hombre como alimento.
Hace unos 7000 años, los grandes dirigentes de la humanidad conocieron las plantas y sus fuerzas vitales, que las plantas absorben del entorno cósmico. Empezaron a trabajar el suelo, cultivaron según las leyes del cosmos, según las leyes del sol, la luna los planetas e incluso las estrellas.
Así surgieron las culturas agrícolas. Desde entonces han pasado de 6000 a 7000 años de cultivo de cereales, verduras, frutos de baya y frutos. En los palacios orientales, no solo se cultivaron plantas como alimento, sino que se dejaron guiar también por el sabor y olor. Nacía una fértil cultura de hierbas y especies. No solo utilizaban hojas, flores y frutos, sino que también encontraban aromas especiales en las semillas, en la corteza y en las raíces, que después usaban para aromatizar para el gusto humano los alimentos, o para volverlos más digestivos. A lo largo de milenios, empezó a crecer un tipo de planta de otra categoría, las plantas silvestres, que se extendieron en los campos trabajados por el hombre y hacían la competencia a los cultivos. Se trata de las plantas adventicias.
En gran parte se trataba de hierbas curativas, por lo que aquello que segregaban sus raíces mejoraba la calidad de los cultivos. En este sentido, se empezó a buscar sustancias que mejorasen el crecimiento de las plantas. Este esfuerzo se convirtió en maestría con Justus von Liebig.
Tenemos que aprender a ver la tierra como un organismo vivo y desarrollar un cuidado del humus, que no tenga ni excesivo abono, ni sufra carencias. Las plantas de cultivo que están expuestas a estos extremos, se ven perjudicadas profundamente en su salud.
Si en el curso de los años, por ejemplo debido a monocultivos, aparecen etapas de alimento incompleto en los cultivos de plantas, entonces las plantas enferman más fácilmente. En consecuencia aparecen parásitos vegetales y animales. Tomemos como ejemplo la col. Si faltan elementos en la tierra, que provocan una perturbación en el proceso de calcio, entonces aparece la mosca de la col. Debido a unos hongos, las raíces se deforman. Las esporas de estos hongos permanecen 4 años en la tierra siendo capaces de regenerarse hasta entonces. Si plantamos durante ese tiempo coles, rabanitos o colza, el hongo puede regenerarse y convertirse en plaga. Este peculiar hongo necesita un margen de cinco años hasta que pueda cultivarse el terreno donde estaba extendido.
Si tiramos sustancias orgánicas no descompuestas a la tierra donde han de crecer zanahorias, cebollas o puerro, pronto pondrán allí sus huevos las moscas de la col, ya que los gusanos que salgan tendrán la mesa puesta con estas plantas. Todos los años tenemos que hacernos un dibujo exacto de toda la superficie cultivada, ya que con la cantidad de plantas que hay, después de tres años, seguro que ya no sabemos lo que hemos plantado en cada parcela.
Lo que espera un cultivo del abono, es algo ya conocido. Se puede leer en las bolsas de las semillas. Pero sabemos muy poco de lo que dejan las plantas en la tierra, es decir lo que encuentran las plantas que sembramos o plantamos que han dejado sus antecesores en la tierra.
Es importante que en otoño tratemos la superficie a cultivar con compost. Para un buen cultivo de frutos, necesitamos también un abono de compost bien hecho, es decir un abono de compost hecho tierra.
Debemos elaborar regularmente compost vegetal para armonizar las superficies de cultivo, y también compost que o bien contenga abono animal o esté enriquecido con partes de cuerpo de animal.

Compost hecho tierra

Especialmente las plantas que chupan mucho de la tierra como las coliflores o las patatas, necesitan este impulso animal para el desarrollo de sus frutos. Si utilizamos sustancias animales como harina de cuernos o huesos del cuerpo animal, a falta de abono animal, entonces es importante que lo mezclemos con restos de plantas hasta que se convierta en compost hecho tierra. Con las sustancias animales que hemos nombrado y con otras, siempre hay un contenido de fuerzas animales, que en el proceso del compost tienen que convertirse en impulso vegetal. Si las ponemos directamente en la tierra o las enterramos, de tal manera que la descomposición sucede en la tierra misma, se necesita la actividad de hongos, pero esta puede pasar a la planta. Por eso la descomposición tiene que suceder antes, en el montón de compost. Los agricultores biodinámicos utilizan los preparados de compost (5), que fomenta la transformación de las sustancias orgánicas. Hay muchas empresas que ofrecen "aceleradores de compost" para que la descomposición se produzca rápidamente. Podemos utilizar también el "preparado combinado de boñiga" (5), que en el curso de los años se aplica de vez en cuando en los restos orgánicos. En nuestra publicación "Las investigaciones de constelaciones" queda bien explicado cómo se elaboran estos preparados. Se necesitan grandes cantidades de estiércol de vaca bien formado, por lo que solo compensa al agricultor con grandes extensiones o a aquellas personas que tienen tierras como segunda fuente de ingresos. Los que tengan un pequeño huerto pueden encontrar en la página 61 direcciones en las que puede encargar los preparados. También realizamos cursos en nuestros centros de ensayos en los que explicamos cómo se elaboran el compost y el preparado combinado de boñiga. El compost puramente vegetal puede echarse sobre todo el terreno a cultivar, mientras que el compost o abono con sustancias animales sólo se esparce en parcelas donde cultivamos plantas que desean este tipo de abono.

Instalación de compost

El Zodiaco

Esta ilustración muestra en el círculo exterior las dimensiones de las constelaciones visibles en el cielo, con el correspondiente momento de la entrada del Sol ante la siguiente constelación. Los tránsitos de una constelación a otra difieren en un día, en parte debido a los días bisiestos. El círculo interior tiene la antigua partición astrológica de 30° en doce casas iguales.

El zodiaco es la franja de constelaciones ante la que pasan la Luna y los planetas. A su paso se activan fuerzas que actúan sobre la Tierra.

Los Trígonos



Los trígonos son posiciones de 120º. La Luna pasa cada nueve días por el mismo trígono de fuerzas, por lo que mediante las cavas o pulverizaciones de sílice rítmicas, llevadas a cabo estando en el mismo tipo de trígono que el del día de la siembra, estimulamos ese impulso.

La Luna sideral

En su órbita de 27 días de giro en torno a la Tierra, la Luna pasa ante las doce regiones del zodíaco transmitiendo fuerzas a la Tierra, que se expresan a través de los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y calor. Estas fuerzas activan la "fructificación" en los cuatro órganos de la planta: raíz, hoja, flor, fruto. Podemos favorecer el desarrollo y la salud de la planta eligiendo el periodo de siembra, de labores de cultivo y de recolección.
Estas fuerzas actúan de forma similar en la colmena. Las abejas en su colmena se aíslan del exterior, impermeabilizando todo con el propóleo, una especie de resina. Cuando abrimos la colmena para realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» entre las abejas. En este tumulto puede actuar un nuevo impulso cósmico, que orienta a las abejas hasta la próxima vez que se realice un trabajo en la colmena.
En esta tabla resumimos los resultados que hemos encontrado en experimentos con plantas, la apicultura y en las observaciones meteorológicas:

Constelación Zodiacal		*Elemento*	*Tendencia del clima*	*Órgano vegetal*	*Actividad apícola*
Piscis	♓	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Aries	♈	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Tauro	♉	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Géminis	♊	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Cáncer	♋	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Leo	♌	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Virgo	♍	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Libra	♎	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Escorpio	♏	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Sagitario	♐	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Capricornio	♑	Tierra	Fresco/frío	Raíz.	Construcción panales
Acuario	♒	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen

La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. Este esquema básico puede alterarse de vez en cuando. Las oposiciones entre planetas, por ejemplo en días particulares, pueden modificar los impulsos y superponerlos, o hacer que a través de posiciones de "trígono" se active otro elemento diferente al que la Luna iba a transmitir ese día. También hay días en que la Luna ascendente o descendente llega a cortar la eclíptica (☊ ☋), dando generalmente efectos negativos, que aún pueden verse aumentados cuando dos planetas se encuentran en los puntos de corte de sus órbitas, en los llamados "nodos". En casos así hay eclipses y el planeta que está más cerca de la Tierra interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Son períodos muy poco indicados para sembrar y cosechar.

Clasificación de las plantas para siembra, los cuidados y la cosecha

Las plantas de cultivo se desarrollan engrosando ciertos órganos para dar un «fruto». Según nuestros ensayos, podemos clasificar las plantas en los cuatro grupos siguientes:

Las plantas de raíz en los días de raíz.

La formación del fruto en el ámbito de la raíz lo encontramos en el rabanito, rábano, colinabo, remolacha de mesa y la azucarera, apio, zanahoria, escorzonera etc. También incluimos en este grupo a la patata y a la cebolla. Si trabajamos estos cultivos en los días de raíz, obtendremos buenas cosechas con gran capacidad de conservación.

Las plantas de hoja en los días de hoja.

La formación del fruto en el ámbito de la hoja lo tenemos en casi todo tipo de coles, lechuga, espinaca, hierba de los canónigos, escarola, perejil, hierbas aromáticas de las que se utilizan las hojas, y plantas forrajeras. El espárrago crece mejor plantado y cultivado estos días. Son días favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, pero no para su recolección con el fin de guardarlas, ni para hierbas destinadas a infusiones. Tanto para estos trabajos como para la recolección de la col para elaborar col fermentada, recomendamos los días de flor y los días de fruto.

Las plantas de flor en los días de flor.

Estos días son propicios para la siembra y los cuidados de todas las plantas ornamentales de flor, para cavar y aplicar sílice en las plantas de semillas oleaginosas como lino, colza, girasol, etc. Si se corta las flores para ponerlas en floreros, su aroma es más intenso, se mantienen más tiempo y la planta de la que proceden echará muchos renuevos. Las flores secas cortadas mantienen la plena viveza de sus colores, mientras las cortadas en otros días pierden pronto su color. Va muy bien recoger las semillas oleaginosas en tales días. El bróculi también se incluye en este grupo de plantas.

Las plantas de fruto y los días de fruto.

Son plantas que se engrosan en el ámbito de la semilla, como judía, guisante, lenteja, soja, maíz, tomate, pepino, calabaza, calabacín, etc. Los cereales de verano e invierno y las semillas oleaginosas dan también los mejores resultados. Se obtiene la mejor extracción de aceite realizando los trabajos de cultivo durante los días de fruto. Va muy bien plantar los cultivos para semilla en los días de Leo. Las plantas de fruto se recolectan preferentemente en los días de fruto, ya que ayudan a que los frutos mantengan su calidad si se les guarda y fomentan la fuerza de regeneración. Para la fruta destinada a ser guardada, es recomendable además el período de luna ascendente (◡).

Los Periodos desfavorables

En el calendario hemos omitido los períodos en los que se producen eclipses, nodos lunares o planetarios u otras posiciones con efectos negativos. (en el calendario figuran--------) Si por falta de tiempo nos vemos obligados a sembrar en estos días desfavorables, podemos elegir días más propicios para realizar los trabajos de cava y conseguir de esta manera una mejora considerable.



Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita, ante la constelación de Sagitario, empieza a ascender. Sus órbitas se vuelven cada día más amplias. Sus puntos de salida se desplazan en dirección noreste y sus puntos de puesta en dirección noroeste. No hemos de confundirlo con la luna creciente.

Durante la luna ascendente, las savias se dirigen con más fuerza a la parte superior de la planta, que está llena de savia y fuerza. Es apropiado cortar y realizar los injertos. Aprovechando los días de fruto que se hallen en este periodo, se puede hacer que aumente este efecto sobre las plantas de fruto, y los días de flor para las plantas de flor. La fruta recogida durante este periodo, se mantiene almacenada más tiempo, fresca y jugosa. Estos días son también propicios para cortar los árboles de Navidad, pues las hojas de pino tardan más en caer y su aroma es más intenso cuando se les corta en los días de flor.

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita mensual ante la constelación de Géminis, empieza a descender (♊). Sus órbitas en el cielo del sur serán cada día más bajas, sus puntos de salida se desplazan hacia el sureste y sus puntos de puesta en dirección suroeste. En el Hemisferio Sur se invierte esta situación (♊♋). Véase pág. xx.

Como "siembra" denominamos siempre el momento en el que enterramos la semilla en la tierra. Cuando llevamos las plantas de un sitio a otro hablamos de "trasplante", por ejemplo cuando cambiamos las plantas jóvenes de un lecho de siembra protegido al lugar definitivo a cielo abierto donde se desarrollarán, o al repicar plantas jóvenes, a veces incluso varias veces, para fortalecer el desarrollo de la raíz, como se hace en las plantaciones de frutales, arbustos y plantas de maceta. Aquí elegimos el periodo de la luna descendente, que no debe confundirse con la luna menguante, perteneciente al ritmo luminoso de las fases lunares.

Durante el periodo de plantación, las plantas enraízan mejor y se vinculan rápidamente con el nuevo lugar. Se puede aumentar este impulso en cada especie vegetal eligiendo como periodo de plantación para las plantas de hoja los días de hoja (Cáncer o Escorpio), para las plantas de raíz como el apio los de raíz (Virgo), para pepino y tomate los de fruto (Leo), de modo que además del impulso de enraizamiento, se favorece el órgano que se engrosará. En este periodo, el ascenso de la savia por las plantas es mínimo y así favorable para podar setos, cortar árboles y madera para construir, y abonar prados y frutales.

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita ante la constelación de Sagitario, empieza a descender. Esto significa que comienza el tiempo de plantación. Sus órbitas se vuelven cada día más bajas. A las dos semanas llega a la constelación de Géminis, el punto más bajo de su órbita. Esto significa que termina el tiempo de plantación. Todas las savias y fuerzas se dirigen ahora con más fuerza hacia la parte superior de la planta. Cambian todos los ritmos ascendentes ◡ y descendentes ◠ de la Luna y de los planetas. La orientación frente al zodíaco permanece igual, por ello también se puede seguir contando con la división de la planta en cuatro órganos: raíz, flor, hoja y fruto-semilla. Si por ejemplo en el Hemisferio Norte miramos al cielo en la Nochebuena de 1996, la luna llena sale ante la constelación de Géminis e ilumina la noche durante más de 16 horas; y el signo ◠ dice que ha llegado al punto más alto de su órbita y ahora está bajando, o sea que comienza el tiempo de plantación.

Por el contrario, en el Hemisferio Sur llegó el 7 de enero de 1997 a su punto más alto ante la constelación de Géminis y entonces comenzó a descender. Entonces comenzó el tiempo de plantación para el Hemisferio Sur. Ahora arraiga bien la planta que se ha trasplantado. Unas dos semanas después, el 20 de enero, la Luna llegó frente a la constelación de Géminis. Entonces empezó a ascender ◡ y el tiempo de plantación acabó, volviendo a actuar las savias y las fuerzas en la parte superior.

Si estando en el Hemisferio Sur queremos contemplar las constelaciones conocidas en el Hemisferio Norte, las primeras veces hay que buscarlas con cierto esfuerzo, pues todas están al revés. Tomamos la Tierra como esfera, pero el entorno cósmico como cúpula.

El lector puede invertir con un lápiz rojo los signos para el tiempo de plantación. Esto también se aplica al abonado y la siembra de raíces. Es mejor sembrar las plantas de fruto bajo las constelaciones ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏.

A todas las horas citadas se debe **restar 4**. Donde dice **inicio** de tiempo de plantación (trasplante) debe decir **fin** de tiempo de plantación y viceversa. En los comentarios sobre labores con árboles frutales, cultivos o apicultura, debe considerarse que muchas veces son labores correspondientes a una estación del año determinada, y cuando este sea el caso, debe corregirse para el Hemisferio Sur, buscando el mes contrario o sea **6 meses antes o 6 meses después.** Por ejemplo, si se recomienda podar frutales en una constelación de Fuego y Luna descendente de diciembre, para esa labor en el Hemisferio Sur deberá buscarse una situación similar en junio.

Enero 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾		Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Sa ♌	☉ - ♐	Calor	Época plantación	Fruto Plantación	Td
1. Semana					
2. Do ♍ 4		Calor/Tierra		Fruto hasta 3h, Raíz desde 4h	
3. Lu ♍		Tierra		Raiz hasta 20h	DC
4. Ma ♍	☋23	Tierra		Raiz desde 5h hasta 21h,	DC
5. Mi ♎ 17		Tierra/Luz		Raiz desde 3h hasta 16h, Flor desde 17h	To
6. Ju ♎		Luz		Flor hasta 12h ---------- Fin plantac.12	
7. Vi ♏		Agua		----------	
8. Sa ♏	♄☊	Agua		----------	Td To
2. Semana					
9. Do ♐ 2	☽12	Calor		Fruto desde 2h hasta 20h,	Ta To DC
10. Lu ♐	●13 Pg11	Calor		----------Fruto desde 20h	DC
11. Ma ♑ 1		Tierra		Raiz desde 1h	
12. Mi ♒ 22	☿☋20	Tierra/Luz		----------	
13. Ju ♒		Luz		----------	
14. Vi ♓ 15	☉♂♄	Luz/Agua		----------	
15. Sa ♓	♂☋3	Agua		----------	Td
3. Semana					
16. Do ♓		Agua		Hoja hasta 10h y desde 16h,	Td
17. Lu ♈ 12	☊8	Agua/Calor		Hoja desde 6h, Fruto desde 12h hasta 16h	
18. Ma ♈	☉ - ♑	Calor		---------- Fruto desde 20h,	♀☋9 Td
19. Mi ♉ 10		Calor/Tierra		Fruto hasta 9h, Raíz desde 10h	Td E
20. Ju ♉		Tierra		Raíz	
21. Vi ♉		Tierra		Raíz	
22. Sa ♊ 10	◠21	Tierra/Luz		Raíz hasta 9h, Flor desde 10h	
4. Semana					
23. Do ♊	Ag20	Luz	Época de plantación	Flor Inicio Plantación 00h	Ta
24. Lu ♋ 19		Luz/Agua		Flor hasta 18h, Hoja desde 19h	
25. Ma ♋	☺12 ☿♂♄	Agua		Fruto	Ta
26. Mi ♌ 13		Agua/Calor		Hoja hasta 12h, Fruto desde 13h	
27. Ju ♌	♀♂♄	Calor		Fruto	DC Ta
28. Vi ♌		Calor		Fruto	E
29. Sa ♍ 10		Calor/Tierra		Fruto hasta 9h, Raíz desde 10h	Td
5. Semana					
30. Do ♍		Tierra		Raíz	Td
31. Lu ♍	☋24	Tierra		Raiz desde 14h hasta 20h	

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♏	♏	♏	♑	♊	♒	♑	♏
9. ♐	8. ♐						
29. ♑							

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de enero

Este mes tiene muchos componentes desfavorables para la siembra. Mercurio viene de Escorpio y pasa por Sagitario, desde donde envía algo de calor. A partir del 29, desde la región de invierno de Capricornio, nos trae el invierno. Venus, que viene también del húmedo Escorpio, pasa el 8 ante la región de Calor de Sagitario. Marte se queda ante la región húmeda de Escorpio, adelanta a Plutón y trae precipitaciones de invierno. Júpiter ante Virgo y Neptuno ante Capricornio estimulan el elemento Tierra, al que se une el Sol el 18, ya en ambiente de invierno. Saturno ante Géminis y Urano ante Acuario fomentan luminosidad en general hasta el verano. Plutón ante Escorpio desata de manera rítmica precipitaciones, cuando se encuentre en trígono con otros planetas.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 11 al 21 hasta las 24h.

Tiempo de plantación: del 1 al 6, hasta las 12h, del 23 a las 0h hasta el 31 a las 24h, también son válidas estas fechas para la poda de árboles, vides y setos. Para las plantas de fruto escoger preferentemente los días de Fruto.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 11 al 21 hasta las 24h.

Observaciones para el apicultor: véase pag. 43

Tenemos que esperar bastante a la primavera

Febrero 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾		Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Ma ♍	☼ - ♑	Tierra	Plantac.	Raíz	Plantación
2. Mi ♎ 1		Luz		Flor desde 1h	Td
3. Ju ♏ 9		Luz/Agua		----------	
4. Vi ♏		Agua		Hoja desde 4h, Fin de Plantación a las 24h	E
5. Sa ♐ 12	☾23	Agua/Calor		Hoja hasta 12h, Fruto desde 13h	
6. Semana					
6. Do ♐		Calor		Fruto	To
7. Lu ♑ 13	△Pg23	Calor/Tierra		Raíz hasta 8h ----------	DC
8. Ma ♑	●24	Tierra		Raíz desde 10h	
9. Mi ♒ 9		Tierra/Luz		Raíz hasta las 8h, Flor desde 9h	Td E
10. Ju ♒	△	Luz		Raíz hasta 14h, Flor desde 15h	
11. Vi ♓ 2		Luz/Agua		Flor hasta 1h, Hoja desde 2h	
12. Sa ♓		Agua		Hoja hasta 18h ----------	DC
7. Semana					
13. Do ♈ 20	☊12	Agua/Calor		Hoja hasta 10h, Fruto desde 20h	
14. Lu ♈	☼ - ♒	Calor		Fruto	
15. Ma ♉ 17		Calor/Tierra		Fruto hasta 16h, Raíz desde 17h	Td
16. Mi ♉		Tierra		Raíz	
17. Ju ♉		Tierra		Raíz	Ta
18. Vi ♊ 17		Tierra/Luz		Raíz hasta 16h, Flor desde 17h	
19. Sa ♊	◠2	Luz		Flor Inicio Plantación 3h	DC
8.Semana					
20. Do ♊	Ag6	Luz	Época de plantación	----------	Td
21. Lu ♋ 1		Agua		Hoja desde 10h	
22. Ma ♌ 19		Agua/Calor		Hoja hasta 18h, Fruto desde 19h	
23. Mi ♌		Calor		Fruto	Td
24. Ju ♌	☺6	Calor		Fruto	Td DC
25. Vi ♍ 16		Calor/Tierra		Fruto hasta 15h, Raíz desde 16h	
26. Sa ♍		Tierra		Raíz desde 11h	
9. Semana					
27. Do ♍	△	Tierra		Raíz hasta 8h, Flor desde 18h a 22h	
28. Lu ♍	☋1	Tierra		Raíz desde 4h Fin Plantación a las 24h	Td

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♑	♑	♏	♍	♊	♒	♑	♏
14. ♒	23. ♒	4. ♐					
28. ♓							

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Comentarios al mes de febrero

El Sol y Mercurio están hasta el 14 ante la región de frío de Capricornio, y desde allí van a provocar heladas, también favorecidas por los tres trígonos de Tierra de otros planetas. Venus, desde el 23 ante Acuario, nos trae una fuerte luz, que será reforzada por un trígono de Luz. Podernos contar con brotes de flores tempranos.

Tiempo de plantación: del 1 al 4, hasta las 24h y del 19 a las 3h hasta el 28 a las 24h.
Cortar los vástagos para estacas y las estacas para injertos de vides el 14 y el 15 hasta las 16h, y conservar en un lugar fresco. Si las utilizarnos como estacas, el 23 y el 24 podernos meterlas en la tierra en cuadros tempranos para que enraícen.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: el 6 y del 8 al 18 hasta las 24h.

La elaboración de la leche
Para la producción de mantequilla y buen queso es recomendable evitar los periodos que no se indican en el calendario con ---------
La mayor cantidad de mantequilla se obtiene de la leche que se ha ordeñado en días de Calor o Fruto y en días con tendencia a tormenta. Los días de perigeo son casi siempre desfavorables para la elaboración de la leche y el yogur. Los derivados lácteos de estos días se estropean fácilmente, por lo cual conviene preparar un día antes una cantidad doble. A la leche le van bien los días de Luz y Calor y no los de Hoja-Agua.

Marzo 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Ma ♎ 6	☼ - ♒	Tierra/Luz	Raíz hasta 5h, Flor desde 6h	E
2. Mi ♏ 15		Luz/Agua	Flor h. 14, Hoja de 15 a 20h	Td
3. Ju ♏	☿☊12	Agua	---------- Hoja desde 20h	DC
4. Vi ♐ 20		Agua/Calor	Hoja hasta 4h, ----------	
5. Sa ♐	☋6	Calor	---------- Fruto desde 19h	DC To
10. Semana				
6. Do ♑ 22		Calor/Tierra	Fruto hasta 20h	
7. Lu ♑	♂♂♄	Tierra	---------- Raíz de 16 a 20h	Td
8. Ma ♒ 20	Pg5	Tierra/Luz	---------- Flor desde 20h	
9. Mi ♒		Luz	Flor	
10. Ju ♓ 12	●10	Luz/Agua	Flor	Ta
11. Vi ♓	☼ - ♓ △	Agua	Flor hasta 3h, Hoja desde 4h	
12. Sa ♓	☊19	Agua	Hoja de 9 a 17h y desde 22h	Td
11. Semana				
13. Do ♈ 6		Agua/Calor	Hoja hasta 5h, Fruto desde 6h	
14. Lu ♈	△	Calor	Raiz hasta 10h, Fruto desde 11h	E
15. Ma ♉ 2	△	Calor/Tierra	Flor hasta 5h, Raíz desde 6h	
16. Mi ♉		Tierra	Raíz	Td
17. Ju ♉		Tierra	Raíz hasta 23h	
18. Vi ♊	◠10	Luz	Flor — Inicio Plantación 12h	E Td
19. Sa ♊		Luz	Flor	
12.Semana				
20. Do ♋ 9	Ag00	Luz/Agua	Flor hasta 8h, Hoja desde 9h	Td
21. Lu ♋		Agua	Hoja	To Td
22. Ma ♌ 3		Agua/Calor	Hoja hasta 2h, Fruto desde 3h	DC
23. Mi ♌		Calor	Fruto	To Td
24. Ju ♍ 23		Calor/Tierra	Fruto hasta 22h	
25. Vi ♍ *Viernes Santo*	☺22	Tierra	----------	
26. Sa ♍		Tierra	----------	
13. Semana	*El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas*			
27. Do ♍ *Pascua Resurr.*	♉6	Tierra	Raíz desde 9h	Ta
28. Lu ♎ 12		Tierra/Luz	Raíz hasta 11h, Flor desde 12h	
29. Ma ♏ 20		Luz	Flor	Ta Td
30. Mi ♏		Agua	Hoja	
31. Ju ♏		Agua	Hoja — Fin Plantación 24h	

Época de plantación

Plantación

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♓	♑	♐	♍	♊	♒	♑	♏
	15. ♓	18. ♑					

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de marzo

La primera mitad de mes se reparte entre constelaciones de Luz y de Tierra/Agua. A partir de mediados de mes, dominan las constelaciones de Tierra/Agua. La verdadera primavera va a tener que esperar. Júpiter se encuentra en posición de nodo con la órbita de la Luna desde principios de año. Esto provoca que en la conjunción queda cubierto, es decir impera un aspecto de eclipse, lo que quiere decir que en la oposición de este mes, se impide su efecto.

Vuelo de las mariposas nocturnas del 11 a las 13h hasta el 13 a las 5h.

Tiempo de plantación, el 1 y el 2 hasta las 12h y del 18 a las 12h hasta el 31 a las 24h.

Cortar los vástagos para estacas: del 5 a las 19h hasta el 6 a las 19h. Insertar las estacas en la tierra, también para setos de mimbre: del 22 a las 3h hasta el 24 a las 22h.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 5 a las 19h hasta el 17 a las 23h. Hay que tener en cuenta los periodos desfavorables omitidos.

Las ovejas esperan la hierba fresca

Abril 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Vi ♐ 2	☉ - ♓ ☋11	Agua/Calor	Fruto desde 2h	
2. Sa ♐	♀ ♂ ♃	Calor	Fruto hasta 8h ----------	E
14. Semana				
3. Do ♑ 5	☉ ♂ ♃	Calor/Tierra	Fruto hasta 20h	Td
4. Lu ♑	Pg12	Tierra	---------- Raíz desde 20h	Ta Td
5. Ma ♒ 4		Tierra/Luz	Raíz hasta 3h, Flor desde 4h	
6. Mi ♓ 22		Luz/Agua	Flor hasta 21h, Hoja desde 22h	
7. Ju ♓		Agua	Hoja hasta 19h, Raíz desde 20h	
8. Vi ♓	●22 ☉ ☾ △	Agua	Raíz hasta 7h----------	
9. Sa ♈ 16	☊4 ♀ ☾	Agua/Calor	----------	To
15. Semana				
10. Do ♈	☿ ♉19	Calor	----------	Ta
11. Lu ♉ 11	△	Calor/Tierra	Hoja hasta 12h, Raíz desde 13h	
12. Ma ♉		Tierra	Raíz	
13. Mi ♉		Tierra	Raíz	Ta
14. Ju ♊ 9	◠ 18 △	Tierra/Luz	Hoja h.10,Flor desde 11h Inicio Plantación18h	DC
15. Vi ♊		Luz	Flor	To E DC
16. Sa ♋ 17	Ag20	Luz/Agua	Flor	
16. Semana				
17. Do ♋		Agua	Hoja	DC
18. Lu ♌ 11		Agua/Calor	Hoja hasta 10h, Fruto desde 11h	
19. Ma ♌	☉ - ♈	Calor	Fruto	DC
20. Mi ♍ 8		Calor/Tierra	Fruto hasta 7h, Raíz desde 8h	
21. Ju ♍		Tierra	Raíz	
22. Vi ♍	♃ ☾	Tierra	----------	
23. Sa ♍	♉15	Tierra	Raíz hasta 13h y desde 17h	E DC
17. Semana				
24. Do ♎ 20	☺11	Tierra/Luz	----------	
25. Lu ♎		Luz	Flor	Td
26. Ma ♏ 3		Luz/Agua	Flor hasta 2h, Hoja desde 3h	
27. Mi ♏		Agua	Hoja Fin Plantación 24h	Td
28. Ju ♐ 8	☋17 ☿ ♂ ♃	Agua/Calor	Hoja hasta 7h, Fruto de 8 a 21h	
29. Vi ♐	Pg11	Calor	---------- Fruto desde 20h	To E DC Td
30. Sa ♑ 10		Calor/Tierra	Fruto hasta 9h, Raíz desde 10h	Td

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♓	♓	♑	♍	♊	♒	♑	♏
	15. ♈	25. ♒					

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Comentarios al mes de abril

Mercurio hace un movimiento retrógrado ante la región de Agua de Piscis. Venus se encuentra también ante Piscis, en posición de trígono con Plutón ante Escorpio. Estas constelaciones marcan la primera mitad de abril. Otras posiciones de nodos entre los planetas y los eclipses favorecen los efectos de Agua. Se puede esperar que a partir de la mitad de mes, Venus nos envíe algo de calor de Aries, y Marte nos fomente la luz en la última semana de mes.

Tiempo de plantación: del 14 a las 18h hasta el 27 a las 24h.
Los días de Aries son desfavorables para plantar patatas. **Vuelo de mariposas nocturnas**: del 6 a las 22h hasta el 9 a las 14h se las puede capturar con atrapamoscas e incinerarlas bajo los árboles afectados.

Tiempo de plantación para la mitad sur del planeta: del 1 a las 12h hasta el 14 a las 12h.

Recolección de plantas de los preparados biodinámicos
El diente de león se recoge por la mañana, en días de Luz-Flor, inmediatamente después de empezar a abrirse la flor, cuando su centro está todavía cerrado. La milenrama en día de Fruto-Calor, con el Sol ante la región de Leo, es decir a partir de mediados de agosto. La manzanilla en días de Flor-Luz, poco antes de San Juan, pues más tarde la cabezuela ya está formando semilla y estaremos sembrándola con un preparado de manzanilla mal elaborado. También pierde su efecto si las cabezuelas tienen gusanos -otra razón para esta época de recolección. De la ortiga se recoge toda la planta menos la raíz, cuando empieza a florecer, en días de Flor-Luz; la valeriana preferentemente en días de Flor-Luz, alrededor de San Juan y se seca las flores sobre un papel, a la sombra; y la corteza de roble en días de Tierra, sin líber.

Parásitos animales

Primero hemos de preguntamos: ¿por qué aparece este o aquel animal como plaga? Es importante estudiar las costumbres de los animales y observar los errores que han de evitarse. Si aun así aparece un animal en forma masiva, lo podemos reducir a sus límites naturales con su propio producto incinerado, es decir la ceniza. Al respecto, hemos de tener en cuenta las recomendaciones de las hojas de cada mes.

No hace falta que hagamos uso de productos biológicos o químicos, si no que los animales se regulan por sí mismos. En el caso de los ratones, aves y otros, basta con la piel o el pellejo de algunos ejemplares; en el caso de los insectos, caracoles y otros, se sigue la siguiente regla; tomamos entre 50 y 60 ejemplares, que se incineraran en un horno de madera ante la constelación correspondiente. La ceniza que resulta de la plaga y de la madera se tritura una hora en el mortero. Esto significa "dinamizar".

Después tomamos 1 cc de esta mezcla de ceniza dinamizada introduciéndola en una pequeña botella que contenga 9cc de agua, y la agitamos. Esta es la potencia D1. Se añaden 90cc de agua y lo agitamos todo tres minutos. Esta es la potencia D2. Si continuamos así para llegar a la 08, necesitaríamos 100.000 litros. Lo que resulta de difícil manejo. Por eso, a partir de la 04, se empieza de nuevo con una pequeña cantidad.

Este preparado provoca una reducción de la multiplicación de las plagas, al utilizarlo en la potencia D8, aplicándolo en tres pulverizaciones de gota fina en tres tardes consecutivas. Se nos ha constatado su éxito con diferentes animales. En muchos casos de plagas de animales, obtenemos los mejores resultados si incineramos en el mismo lugar donde aparecen. Los pulgones y los gorgojos de manzano por ejemplo los capturamos con un atrapamoscas y los incineramos seguidamente en el mismo lugar (4).

Anotaciones

Mayo 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
18. Semana				
1. Do ♑	☼ - ♈	Tierra	Raíz	
2. Lu ♒ 9		Tierra/Luz	Raíz hasta 8h, Flor desde 9h	Td
3. Ma ♒		Luz	Flor	DC
4. Mi ♓ 4		Luz/Agua	Flor hasta 3h, Hoja desde 4h	
5. Ju ♓		Agua	Hoja hasta 8h y desde 15h Ascensión	DC
6. Vi ♓	☊12	Agua	Hoja hasta 10h y de 15h a 23h.	Td
7. Sa ♈		Calor	Fruto	To
19. Semana				
8. Do ♉ 20	●10 △	Calor/Tierra	Hoja hasta 15,Fruto de 17 a 19,Raíz desde 20	Td
9. Lu ♉		Tierra	Raíz	Ta DC
10. Ma ♉		Tierra	Raíz hasta 20h	Ta
11. Mi ♊ 17	♀☊12	Tierra/Luz	----------	DC
12. Ju ♊	◠2	Luz	Flor Inicio Plantación 4h	DC
13. Vi ♊	☼ - ♉	Luz	Flor	
14. Sa ♋ 1	Ag15	Agua	Flor hasta 16h, Hoja desde 17h	
20.Semana				
15. Do ♌ 19	Pentecostés	Agua/Calor	Hoja hasta 18h,Fruto desde 19h	
16. Lu ♌		Calor	Fruto	Td
17. Ma ♌	△	Calor	Fruto hasta 12h, Raíz desde 13h	E
18. Mi ♍ 17		Calor/Tierra	Fruto hasta 16h, Raíz desde 17h	Ta DC
19. Ju ♍	24●	Tierra	Raíz hasta 18h	
20. Vi ♍	☋23	Tierra	Raíz desde 1 a 21h	
21. Sa ♍		Tierra	Raíz desde 2h	Td
21.Semana				
22. Do ♎ 5		Tierra/Luz	---------- Flor desde 12h	To E
23. Lu ♏ 12	☺21	Luz/Agua	Flor hasta 11h, Hoja desde 12h	
24. Ma ♏	△	Agua	Raíz hasta 14h, Hoja desde 15h	DC Td
25. Mi ♐ 15		Agua/Calor	Hoja h.14h,Fruto de 15 a 22h Fin Plant.14	Td
26. Ju ♐	◡1 Pg12	Calor	----------	
27. Vi ♑ 16		Calor/Tierra	Fruto hasta 15h, Raíz desde 16h	
28. Sa ♑		Tierra	Raíz	
22. Semana				
29. Do ♒ 15	♀♂♇	Tierra/Luz	Raíz hasta 14h, Flor de 15h a 21h	DC
30. Lu ♒	△☿☊11	Luz	----------	Td
31. Ma ♓ 10	♂●	Luz/Agua	Flor hasta 7h, Hoja desde 14h	

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♓	♈	♒	♍	♊	♒	♑	♏
11. ♈	4. ♉	30. ♓					
25. ♉							

Anotaciones

Comentarios al mes de mayo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mercurio, que está el 10 ante un escenario de Agua, se desplaza del 11 al 24 ante Aries. Este impulso de Calor es favorable para los trabajos con injertos. Marte y Saturno están ante constelaciones de Luz. Solo Venus pasa el 4 ante la región de Tauro. Las noches vuelven a refrescar. Plantamos patatas en días de Raíz. Se puede injertar de escudete del 7 al 8 hasta las 19h, también es válida esta fecha para plantar pequeñas patatas enteras.

Tiempo de plantación: del 12 a las 4h hasta el 25 a las 14h.
Debajo de las plantas de fresas debemos colocar paja o lana vegetal, para que los frutos no se pudran en julio.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tiempo para injertos en las parcelas tardías: del 2 a las 9h hasta el 4 a las 3h y el 7 y el 8 hasta las 19h.
Plaga de polillas: tiempo de incineración del 23 a las 12h hasta el 25 a las 14h.
Plaga de grillotopos: tiempo de incineración del 23 a las 12h hasta el 25 a las 14h.
Desenterramiento y recogida de los preparados biodinámicos: del 16 al 17 hasta las 24h.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ascenso de la temperatura del suelo a partir del 11.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 1 al 10 y del 27 al 31 hasta las 24h.

Regla del campesino: si la luna nueva de mayo cae en un domingo, habrá plaga de ratones. ¿Qué se puede hacer? Tener más gatos…

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

Junio 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Mi ♓	☼ - ♉ △	Agua	Hoja h.6h, Raíz de 7 a 14, Hoja desde 17h	Ta Td
2. Ju ♓	☊16	Agua	Hoja hasta 13h y desde 18h	E Ta Td
3. Vi ♈ 6		Agua/Calor	Hoja hasta 5h, Fruto desde 6h	
4. Sa ♈		Calor	Fruto	
23. Semana				
5. Do ♉ 3	△	Calor/Tierra	Raíz	To
6. Lu ♉	●23	Tierra	Raíz	Td
7. Ma ♉		Tierra	Raíz hasta 23h	
8. Mi ♊	☊9 △ ☿ ♂ ♇	Luz	Raíz hasta 8h, Flor desde 9h Inicio Plantación 11h	
9. Ju ♊		Luz	Flor	Td
10. Vi ♋ 8		Luz/Agua	Flor hasta 7h, Hoja desde 8h	
11. Sa ♋	Ag7	Agua	Flor hasta 8h, Hoja desde 9h	
24. Semana				
12. Do ♌ 3	△	Agua/Calor	Flor hasta 12h, Fruto desde 13h	To Ta Td
13. Lu ♌		Calor	Fruto	
14. Ma ♌	☼ ♂ ♇	Calor	Fruto	Ta
15. Mi ♍ 1		Tierra	Raíz desde 1h	To
16. Ju ♍	♃ ☾ △	Tierra	Raíz hasta 3h, Flor de 10 a 20, Raíz desde 21h	Td
17. Vi ♍	♉5	Tierra	Raíz hasta 3h y desde 7h	G
18. Sa ♎ 15		Tierra/Luz	Raíz hasta 14h, Flor desde 15h	
25. Semana				
19. Do ♏ 22		Luz/Agua	Flor hasta 21h, Hoja desde 22h	
20. Lu. ♏	☼ - ♊	Agua	Hoja	G
21. Ma ♏		Agua	Hoja	Fin Plantac. 21h
22. Mi ♐ 1	☋9 ☺5	Calor	Fruto de 1 a 20h	
23. Ju ♐	Pg13	Calor	---------- Fruto desde 20h	To
24. Vi ♑ 1		Tierra	Raíz desde 1h	Ta
25. Sa ♒ 22		Tierra/Luz	Raíz hasta 21h, Flor desde 22h	Ta
26. Semana				
26. Do ♒	♂ ♂ ♃	Luz	Flor	DC
27. Lu ♓ 16		Luz/Agua	Flor hasta 15h, Hoja desde 16h	E Td
28. Ma ♓		Agua	Hoja hasta 18h	DC
29. Mi ♓	☊17	Agua	Hoja de 2 a 15h y desde 20h	
30. Ju ♈ 11		Agua/Calor	Hoja hasta 10h, Fruto desde 11h	

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
☿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
10. ♊	3. ♊			22. ♋			
26. ♋	25. ♋						

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Comentarios al mes de junio

El principio de mes será fresco y húmedo. Marte permanece durante todo el mes ante la constelación húmeda de Piscis. Venus pasa el 3 ante la región de Luz de Géminis. Esto produce una buena cualidad de heno y es favorable para la multiplicación de las abejas. El 22, Saturno pasa ante la región de agua de Cáncer. Venus y Mercurio le siguen el 25 y 26. Tenemos entonces cinco planetas ante constelaciones húmedas, lo que es una gran alegría para los caracoles. Merece la pena remover una hora el preparado de sílice en la mañana del 26 y pulverizar el huerto con todos sus caminos y bordes.

Tiempo de plantación: del 8 a las 11h al 21 a las 21h.

Tiempo de incineración de plaga de insectos: del 5 a las 3h al 7 a las 20h.

Plaga de moscas de establo: capturar las moscas con un atrapamoscas, y entre el 3 a las 9h hasta el 24 a las 24h, incinerar en un día de Flor en el mismo establo.

Tiempo favorable para la cosecha de heno: del 3 al 24 hasta las 24h. Segar preferentemente en un día de Flor. Especialmente bueno para la siega es el día 12.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta del 1 al 7 a las 24h, el 22 y del 24 al 30 a las 24h.

Plaga de hongos en las plantas

Los hongos en la naturaleza tienen como función desintegrar la vida en descomposición. Aparece en los cultivos cuando utilizamos compost de estiércol no bien elaborado o que contiene sustancias de cuerpo de animal que no han pasado el proceso del compost, como viruta de cuernos o huesos. También puede ocurrir cuando las semillas fueron recolectadas bajo constelaciones desfavorables. Según Rudolf Steiner: "Cuando las fuerzas de la luna actúan intensamente sobre la Tierra…". Podemos hervir infusión de cola de caballo y pulverizar inmediatamente las zonas afectadas con dicha infusión. El nivel de los hongos bajará de la planta al suelo, donde es su lugar. Podemos hacer algo para la curación de la planta, pulverizando infusión de ortiga sobre las hojas de la planta. De esta manera fomentamos la asimilación y la circulación de la savia, desapareciendo también así los hongos.

Julio 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Vi ♈	☉ - ♊	Calor	Fruto	Ta Td
2. Sa ♉ 8	△	Calor/Tierra	Fruto h.7h, Flor de 8 a 19h, Raíz desde 20h	Td
27. Semana				
3. Do ♉		Tierra	Raíz	E
4. Lu ♉		Tierra	Raíz	E
5. Ma ♊ 7	☊ 14	Tierra/Luz	Raíz hasta 6h, Flor desde 7h Inicio Plantac.15h	Td
6. Mi ♊	● 13	Luz	Flor	Ta Td
7. Ju ♋ 15	☿♉18	Luz/Agua	----------	M
8. Vi ♋	Ag19	Agua	Hoja hasta 15h, Flor desde 16h	G Ta DC
9. Sa ♌ 9		Agua/Calor	Hoja hasta 8h, Fruto desde 9h	
28. Semana				
10. Do ♌		Calor	Fruto	
11. Lu ♌		Calor	Fruto	
12. Ma ♍ 8	♀♂♆	Calor/Tierra	Fruto hasta 7h, Raíz desde 8h	
13. Mi ♍	24 ● ☿♂♆	Tierra	Raíz hasta 14h y desde 21h	
14. Ju ♍	♉8	Tierra	Raíz hasta 6 y desde 11h	
15. Vi ♍	△	Tierra	Hoja hasta 20h, Raíz de 21 a 23h	
16. Sa ♎		Luz	Flor	
29. Semana				
17. Do ♏ 8		Luz/Agua	Flor hasta 7h, Hoja desde 8h	Ta
18. Lu ♏		Agua	Hoja	Fin Plantac.24h
19. Ma ♐ 12	☉ - ♋ ☋ 19	Agua/Calor	Hoja hasta 11h, Fruto desde 12h	
20. Mi ♐		Calor	Fruto	Ta Td
21. Ju ♑ 11	☺12 Pg21	Calor/Tierra	----------	
22. Vi ♑		Tierra	Raíz desde 9h	DC
23. Sa ♒ 7		Tierra/Luz	Raíz hasta 6h, Flor desde 7h	
30. Semana				
24. Do ♒		Luz	Flor hasta 23h	
25. Lu ♓		Agua	Hoja	DC
26. Ma ♓	☊19	Agua	Hoja hasta 17h y desde 22h	Ta Td
27. Mi ♈ 18		Agua/Calor	Hoja hasta 17h, Fruto desde 18h	
28. Ju ♈		Calor	Fruto	Td
29. Vi ♉ 14		Calor/Tierra	Fruto hasta 13h, Raíz desde 14h	Td
30. Sa ♉		Tierra	Raíz	
31. Semana				
31. Do ♉	♀♂♇	Tierra	----------	

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♋	♋	♓	♍	♋	♒	♑	♏
15. ♌	13. ♌	26. ♈					
31. ♋							

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de julio

En la primera mitad de mes domina el elemento de Agua. Después, Venus y Mercurio pasan ante la región de Calor de Leo y el 26, Marte pasa ante Aries. Esto nos hace esperar semanas de calor. Los días de Flor y Fruto son favorables para la poda de verano de los árboles frutales. Los frutos de baya destinados a mermelada a pasa, debemos cosecharlos en días de Flor o Fruto.

Tiempo de plantación: del 5 a las 15h hasta el 18 a las 24h.

Tiempo de incineración para saltamontes y langostas: del 5 a las 7h hasta el 7 a las 14h
Tiempo de incineración para plaga de caracoles: del 19 hasta el 9 en días de Agua, sobre todo cuando la Luna está ante Cáncer.
Cosecha de cereales:
segunda mitad de julio en días de Fruto.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 1 al 4 a las 24h y del 19 a las 20h hasta el 30 a las 24h.

Para el apicultor: la alimentación de las abejas
Para la dieta invernal de las abejas son recomendables infusiones complementarias, positivas para la salud de las colonias. Se echa agua hervida en milenrama, manzanilla, diente de león y valeriana, se deja reposar un cuarto de hora y se cuela. Se pone a hervir agua con ortiga, cola de caballo y corteza de roble durante diez minutos, se cuela y se añade al alimento líquido. Bastan tres gramos de cada planta por 100 litros de alimento líquido. Esto es especialmente importante en años que al final trajeron mucho desarrollo foliar (3).

Agosto 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Lu ♊ 12	☼ - ♋ ♠ 19	Tierra/Luz	Raíz hasta 11,Flor desde 12hInicio plantación 21h	
2. Ma ♊	☿ ♂ ♆	Luz	Flor	
3. Mi ♋ 21		Luz/Agua	Flor hasta 20h, Hoja desde 21h	
4. Ju ♋	Ag23	Agua	Hoja hasta 18h, Flor desde 19h	G
5. Vi ♌ 15	●4	Agua/Calor	Hoja hasta 14h, Fruto desde 15h	Ta
6. Sa ♌		Calor	Fruto	
32. Semana				
7. Do ♌		Calor	Fruto	Td
8. Lu ♍ 14	☼ ♂ ♆ ♀ ☾	Calor/Tierra	---------- Raíz desde 14h	
9. Ma ♍		Tierra	Raíz	E
10. Mi ♍	☼ - ♌ ☋9	Tierra	----------Raíz desde 12h	21☾ To Td
11. Ju ♍		Tierra	Raíz	
12. Vi ♎ 7		Tierra/Luz	Raíz hasta 6h, Flor desde 7h	Ta Td
13. Sa ♏ 16		Luz/Agua	Flor hasta 15h, Hoja desde 16h	
33. Semana				
14. Do ♏		Agua	Hoja	Ta Td
15. Lu ♐ 21		Agua/Calor	Hoja hasta 20h,Fruto desde 21h Fin Plantac.20h	
16. Ma ♐	☽4	Calor	Fruto	
17. Mi ♑ 22	△	Calor/Tierra	Fruto hasta 12h, Raíz desde 13h	To
18. Ju ♑		Tierra	Raíz hasta 18h	Td
19. Vi ♒ 18	☺19 Pg7	Tierra/Luz	---------- Flor desde 18h	
20. Sa ♒		Luz	Flor	
34. Semana				
21. Do ♓ 10		Luz/Agua	Flor hasta 9h,Hoja desde 10h	DC
22. Lu ♓	☊24	Agua	Hoja hasta 8h y de 13 a 22h	
23. Ma ♓		Agua	Hoja desde 3h	Td
24. Mi ♈ 2		Agua/Calor	Hoja hasta 1h, Fruto desde 2h	
25. Ju ♉ 21		Calor/Tierra	Fruto hasta 20h,----------	DC
26. Vi ♉	☿ ☊10 ☿ ♂ ♆	Tierra	----------	
27. Sa ♉		Tierra	Raíz	
35.Semana				
28. Do ♊ 18		Tierra/Luz	Raíz hasta 17h,Flor desde 18h	To Td
29. Lu ♊	♠1	Luz	Flor *Inicio plantación 3h	Ta
30. Ma ♊	△	Luz	----------Raíz desde 12h	
31. Mi ♋ 3	♀ ☋1	Luz/Agua	----------	

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♋	♌	♈	♍	♋	♒	♑	♏
25. ♌	11. ♍						

Anotaciones

Comentarios al mes de agosto

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mercurio y Saturno ante Cáncer, Plutón sigue ante Escorpio, con lo que los aspectos de Agua están bien representados. Esperemos que Marte ante Aries y Venus ante Leo contrarresten en los primeros diez días. El 10, Venus es reemplazado por el Sol, y pasa ante Virgo. Desde allí provocará las primeras nieblas de otoño. Agosto no va a tener tales extremos como en los años anteriores. Las oposiciones planetarias ven disminuir sus efectos favorables debido a los nodos y los eclipses.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tiempo de plantación: del 12 a las 4h hasta el 25 las 8h.
Cosecha temprana de fruta: recomendamos los días de Flor y Fruto.
Tiempo para la cosecha de cereales: del 28 al 15 en días de Fruto.
Tiempo de plantación en la mitad sur de planeta: el 1 a las 18h y del 16 a las 12h hasta el 28 a las 24h

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

La recolección, almacenamiento y conservación

Para recoger y elaborar todo tipo de fruta y hortaliza para guardar o conservar, hay que evitar los días de Hoja y los periodos indicados con guiones (-------), al igual que para preparar zumo, jalea, mermelada, fruta cocida y fermentados lácticos de verdura como la col. Cociendo los zumos de ciruela, cereza, escaramujo, manzana y pera, se obtiene un concentrado sabroso para untar sobre el pan, pero si se han recogido los frutos en los días antes mencionados, le aparecerá moho en poco tiempo. En la recolección de flores y hojas para infusiones también se evitará estos periodos, ya que perderían bastante aroma. Para todas las actividades mencionadas, los días de Flor y Fruto son los más aconsejables.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Si hacemos uso de los días desfavorables (indicados con guiones) para la cosecha de cereales, al año siguiente tenemos que contar con cornezuelo en los campos de centeno y herrumbre en los campos de trigo.

28.
29.
30.
31.

Septiembre 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Ju ♌ 21	☉ - ♌ Ag4	Agua/Calor	Fruto y Flor (Todo el día) Plantación ☉♂♇	
2. Vi ♌		Calor	Fruto	
3. Sa ♌	●20	Calor	Fruto	
36. Semana				
4. Do ♍ 19		Calor/Tierra	Fruto hasta 18h,Raíz desde 19h	Td
5. Lu ♍		Tierra	Raíz hasta 15h----------	Ta Td
6. Ma ♍	☽12	Tierra	Raíz desde 2 a 10h y desde 15h	
7. Mi ♍	☿☄	Tierra	Raíz hasta 4h y desde 12h	G Td
8. Ju ♎ 13		Tierra/Luz	Raíz hasta 12h, Flor desde 13h	
9. Vi ♏ 22	☿♂♇	Luz/Agua	----------	E
10. Sa ♏		Agua	---------- Hoja desde 13h	DC
37. Semana				
11. Do ♏		Agua	Hoja Fin Plantac.24h	Td
12. Lu ♐ 5	☾12	Agua/Calor	Hoja hasta 4h ----------	M
13. Ma ♐	△	Calor	Fruto	Td
14. Mi ♑ 7		Calor/Tierra	Fruto hasta 6h, Raíz desde 7h	E
15. Ju ♑	☉ - ♍	Tierra	Raíz	Td
16. Vi ♒ 4	Pg15	Tierra/Luz	----------	E
17. Sa ♓ 21		Luz/Agua	Flor hasta 20h.Hoja desde 21h	E
38. Semana				
18. Do ♓	☺19	△ Agua	Flor de 6 a 20h, Hoja desde 21h	
19. Lu ♓	☊10	Agua	Hoja hasta 7h y de 11 a 14h	
20. Ma ♈ 12		Agua/Calor	Hoja hasta 11h, Fruto desde 12h	To
21. Mi ♈		Calor	Fruto	
22. Ju ♉ 6		Calor/Tierra	Fruto hasta 5h, Raíz desde 6h	
23. Vi ♉		Tierra	Raíz	To Ta
24. Sa ♉		Tierra	Raíz	To
39.Semana				
25. Do ♊ 2	♓ 8	Tierra/Luz	Raíz h.1h,Flor desde 2h Inicio Plantac.10h	E Td
26. Lu ♊		Luz	Flor	DC
27. Ma ♋ 9		Luz/Agua	Flor hasta 8h, Hoja desde 9h	Td
28. Mi ♋	Ag16	Agua	Hoja hasta 12h y desde 19h, Flor de 13 a 18h	Ta
29. Ju ♌ 4	*Micael*	△ Agua/Calor	Raíz hasta 11h, Fruto desde 12h	
30. Vi ♌		Calor	Fruto	Td

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♌	♍	♈	♍	♋	♒	♑	♏
16. ♍	19. ♎	24. ♉					

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Comentarios al mes de septiembre

En la primera mitad de mes podemos esperar algo de verano todavía, mientras que en la segunda mitad de mes esperamos ya el otoño. Venus se siente bien a partir del 19 ante a región de Luz de Libra y despejará la niebla por el día. A mediados de mes, los trígonos de Calor y Luz volverán a traer el verano, lo que es muy favorable para las cosechas tempranas de cereales. La Luna es ascendente, y es posible entonces la cosecha de frutos tempranos. En la segunda mitad de mes predominan las constelaciones del elemento Tierra, así las noches son frescas, pero hay muy buenas condiciones para la cosecha de frutos de Raíz.

Tiempo de plantación: del 1 hasta el 11 a las 24h y del 25 a las 10h hasta el 30 a las 24h.

Tratamiento anti-hormigas en edificios: del 1 a las 21h hasta el 4 a las 18h.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta:
del 12 a las 15h hasta el 24 a las 24h.

Cosecha de fruta: se recomiendan los días en los que la Luna se encuentra ante Aries o Sagitario. Los últimos ensayos de parcelas lo han demostrado de nuevo. La cosecha de frutos de Raíz es muy favorable en los días de Raíz, como hemos visto en los ensayos comparativos con cebollas, zanahorias, remolachas y patatas.

Octubre 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Sa ♌	☼ - ♍	Calor	Fruto	Plantación
40. Semana				
2. Do ♍ 2	☿☌♂	Calor/Tierra	Fruto hasta 12h, Raíz desde 13h	DC
3. Lu ♍	●11 ☼☍	Tierra	---------- ☿☋17 ☋18	Ta DC
4. Ma ♍	☿☍	Tierra	----------	
5. Mi ♎ 18		Tierra/Luz	Raíz hasta 17h, Flor desde 18h	
6. Ju ♎		Luz	Flor	Ta Td
7. Vi ♏ 3		Luz/Agua	Flor hasta 2h, Hoja de 3 a 18h, Raíz desde 19h	
8. Sa ♏	△	Agua	Raíz hasta 8h, Hoja desde 9h	
41. Semana				
9. Do ♐ 11	☽18	Agua/Calor	Hoja hasta 10, Fruto desde 11h, Fin plantación 9h	
10. Lu ♐		Calor	Fruto	DC Td
11. Ma ♑ 14		Calor/Tierra	Fruto hasta 13h, Raíz desde 14h	
12. Mi ♑		Tierra	Raíz	
13. Ju ♒ 13		Tierra/Luz	Raíz hasta 12h, Flor desde 13h	E
14. Vi ♒	Pg15	Luz	----------	Ta
15. Sa ♓ 6		Luz/Agua	Flor hasta 5h, Hoja desde 6h	Ta DC
42. Semana				
16. Do ♓	☊20	Agua	Hoja hasta 17h y desde 22h	
17. Lu ♈ 22	☺☄ △	Agua/Calor	Hoja hasta 8 y de 15 a 21h, Fruto desde 22h	
18. Ma ♈		Calor	Fruto hasta 17h----------	To
19. Mi ♉ 16		Calor/Tierra	Fruto hasta 15h, Raíz desde 16h	Td
20. Ju ♉		Tierra	Raíz	
21. Vi ♉		Tierra	Raíz	
22. Sa ♊ 10	☊16 ☿☌♂	Tierra/Luz	Fruto	Inicio plantación 18h
43. Semana				
23. Do ♊		Luz	Flor	
24. Lu ♋ 17		Luz/Agua	Flor hasta 16h, Hoja desde 17h	
25. Ma ♋		Agua	Hoja	
26. Mi ♌ 12	Ag11	Agua/Calor	Fruto	DC
27. Ju ♌		Calor	Fruto	
28. Vi ♌		Calor	Fruto	
29. Sa ♍ 10		Calor/Tierra	Fruto hasta 9h, Raíz desde 10h	
44. Semana	Fin de cambio de horario			
30. Do ♍		Tierra	Raíz	E Td
31. Lu ♍	♋2	Tierra	Raíz desde 4h	DC

Época de plantación

Época de plantación

El cambio de horario de verano no se ha considerado, sumar 1 h a las horas aquí escritas

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♍	♎	♉	♍	♋	♒	♑	♏
14. ♎	5. ♏	9. ♈					
27. ♏							

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de octubre

Marte hace un movimiento retrógrado ante Aries. Aquí despliega toda su fuerza. Su posición de oposición con Venus a principios de mes y con Mercurio a finales de mes crea un buen contrapeso ante las constelaciones de Tierra-Agua de los otros planetas.

Tiempo de plantación:
del al 9 a las 9h y del 22 a las 18h hasta el 31 a las 24h.
Fruta para almacenar: Cosechar en días de Flor y Fruto fuera del tiempo de plantación. Los frutos Raíz en días de Raíz, a ser posible durante el tiempo de plantación.
Siembra de cereales: en días de Fruto.
Incineración de pieles y plumas de parásitos de sangre caliente: el 20.
Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 10 al 22 a las 12h.

Elaboración de pan de centeno
Ya sea con levadura u otro producto auxiliar de panificación, podemos trabajar bien la harina gruesa o fina de trigo, cebada, avena, maíz, arroz y mijo. Para el centeno hemos de utilizar otros métodos. Unos investigadores finlandeses han descubierto además que las personas con tendencia a cáncer se curan consumiendo pan de centeno. Encontrará una receta detallada de pan de centeno en nuestra publicación "Sobre las investigaciones de constelaciones", o en el último Calendario. El centeno necesita una temperatura de 28° C. Estaba asombrada como con el calor del año 2003, en cuatro horas todas las cinco etapas de elaboración de pan de centeno estaban terminadas. Es decir que el ingrediente agrio sube con la temperatura adecuada.

Noviembre 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Ma ♍	☼ - ♎	Tierra	Raíz	Plantación DC
2. Mi ♎ 2	●2	Tierra/Luz	Raíz hasta 1h, Flor desde 2h	E Td
3. Ju ♏ 10		Luz/Agua	Flor hasta 9h, Hoja desde 10h	
4. Vi ♏		Agua	Hoja	
5. Sa ♐ 16	☾23	Agua/Calor	Hoja hasta 15h,Fruto desde 16h Fin Plant.12h	To
45. Semana				
6. Do ♐		Calor	----------	To Ta
7. Lu ♑ 20	☼☌♂	Calor/Tierra	Fruto de 11 a 19h, Raíz desde 20h	M E
8. Ma ♑		Tierra	Raíz	Td
9. Mi ♒ 19		Tierra/Luz	Raíz hasta 12h ----------	
10. Ju ♒	Pg1	Luz	---------- Flor desde 15h	Td
11. Vi ♓ 14		Luz/Agua	Flor hasta 13h, Hoja desde 14h	
12. Sa ♓		Agua	Hoja	
46. Semana				
13. Do ♓	☊3	Agua	Hoja desde 5h	
14. Lu ♈ 7		Agua/Calor	Hoja hasta 6h, Fruto de 7 a 20h	Td
15. Ma ♈	☌☊12	Calor	----------	
16. Mi ♉ 1	☺2	Tierra	Raíz desde 1h	Td
17. Ju ♉	△	Tierra	Fruto	
18. Vi ♊ 19		Tierra/Luz	Raíz hasta 18h, Flor desde 19h	
19. Sa ♊	☼ - ♏ ◠1	Luz	Flor Inicio plantación 3h	
47.Semana				
20. Do ♊		Luz	Flor	
21. Lu ♋ 2		Luz/Agua	Flor hasta 1h, Hoja de 2 a 18h	Ta
22. Ma ♌ 20	☿☊12	Agua/Calor	----------	
23. Mi ♌	Ag7	Calor	Fruto hasta 15h----------	
24. Ju ♌		Calor	---------- Fruto desde 18h	DC Td
25. Vi ♍ 19		Calor/Tierra	Fruto hasta 18h, Raíz desde 19h	DC
26. Sa ♍		Tierra	Raíz	
48. Semana				
27. Do ♍	♉8	Tierra	Raíz hasta 6h y desde 11h	
28. Lu ♍		Tierra	Raíz	Ta
29. Ma ♎ 11		Tierra/Luz	Raíz hasta 10h, Flor desde 11h	Ta
30. Mi ♏ 19		Luz/Agua	Flor hasta 18h, Hoja desde 19h	Ta

Época de plantación

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♏	♏	♈	♍	♋	♓	♑	♏
29. ♎	3. ♐						

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Comentarios al mes de noviembre

Mercurio hace un movimiento retrógrado ante Escorpio a partir del 14, cerca de Plutón, que se encuentra en posición de trígono con Saturno ante Cáncer. Tenemos que contar con un aumento de precipitaciones. Venus ante Sagitario y Marte ante Aries permiten sobretodo alrededor del 17 un tiempo favorable para la cosecha de frutos y uvas tardías y para la siembra de cereales tardíos.

Tiempo de plantación: del 3 a las 00h hasta el 13 a las 19h y a partir del 29 a las 10h hasta el 30

Los días de Flor y Fruto son apropiados para la poda de árboles frutales y vides, así como para la tala de troncos para madera de construcción.

Tala de árboles de madera especial: como robles, tejos, fresnos, pinos y abetos: el 8.

Para enterrar los bulbos: en días de Flor hasta el 20.

Tala de árbol de Navidad: para ser vendido: en días de Flor y Fruto del 7 al 18 a las 22h.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 7 al 18 a las 22 h.

Antes de que venga el frío, la salamandra se recoge.

El estiércol que se vierte fermenta generalmente mejor que el que ha pasado por la esparcidora.

Diciembre 2005

Día ☾/Constel.	Posiciones	Elemento☾	Órgano estimulado por ☾ ó planetas	Tendencia
1. Ju ♏	☼ - ♏ ●16	Agua	Hoja	E
2. Vi ♏		Agua	Hoja hasta 23h	
3. Sa ♐	☽6 △	Calor	Hoja hasta 9h, Fruto desde 10h	
49. Semana				
4. Do ♐		Calor	Fruto hasta 18h ----------	
5. Lu ♑ 2	Pg6 ☌♂ 24	Calor/Tierra	---------- Raíz desde 18h	
6. Ma ♑		Tierra	Raíz	Td
7. Mi ♒		Luz	Flor	E
8. Ju ♓ 19		Luz/Agua	Flor hasta 18h, Hoja desde 19h	
9. Vi ♓		Agua	Hoja	
10. Sa ♓	☊6	Agua	Hoja de 4 a 9h	Ta
50. Semana				
11. Do ♈ 13		Agua/Calor	Hoja hasta 12h, Fruto de 13 a 20h	
12. Lu ♈	☌♂	Calor	Fruto desde 8h	
13. Ma ♉ 9		Calor/Tierra	Fruto hasta 8h, Raíz desde 9h	
14. Mi ♉		Tierra	Raíz	
15. Ju ♉	☺17	Tierra	Raíz	DC Td
16. Vi ♊ 4	☊8	Tierra/Luz	Raíz hasta 3h, Flor desde 4h Inicio Plantac.10h	Td
17. Sa ♊		Luz	Flor	M DC
51. Semana				
18. Do ♋ 10		Luz/Agua	Flor hasta 9h, Hoja desde 10h	
19. Lu ♋	☼ - ♐	Agua	Hoja	Ta
20. Ma ♌ 4		Agua/Calor	Hoja hasta 3h, Fruto desde 4h	
21. Mi ♌	Ag4 △	Calor	Hoja hasta 14h----------	
22. Ju ♌	☿☊5	Calor	---------- Fruto desde 18h	To Td
23. Vi ♍ 3		Calor/Tierra	Fruto hasta 2h, Raíz desde 3h	
24. Sa ♍	☋12	Tierra	Raíz hasta 10h y desde 15h	Td
52.Semana				
25. Do ♍	Navidad	Tierra	Raíz	E Td
26. Lu ♎ 20		Tierra/Luz	Raíz hasta 14h ----------	
27. Ma ♎		Luz	Flor	Td
28. Mi ♏ 5		Luz/Agua	Flor hasta 4h, Hoja desde 5h	
29. Ju ♏		Agua	Hoja Fin Plantación 24h	Td
30. Vi ♐ 10	☽15 ☿☋17	Agua/Calor	----------	
31. Sa ♐	●4	Calor	Fruto	To Td

Época de plantación

Mercurio	Venus	Marte	Júpiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
☌	♐	♈	♍	♋	♒	♑	♏
9. ♏	10. ♑		8. ☌				

Anotaciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comentarios al mes de diciembre

Durante los primeros diez días del mes, Mercurio y Venus transmiten fuerzas de Luz y Calor, Marte sigue en movimiento retrógrado ante la región de Calor de Aries. El 10, Venus intenta traer un cielo nocturno claro desde la región de invierno de Capricornio. El 8, Júpiter cambia ante la región de Luz de Libra. Desde allí puede transmitir bien sus fuerzas. A principios de año, Júpiter pasa a Acuario en posición de trígono con Urano.

Tiempo de plantación: del 1 al 2 hasta las 21h y del 16 a las 10 hasta el 29 a las 24h. Estas fechas son válidas también para la poda de árboles, vides y setos. Para los árboles frutales, preferentemente en días de Flor y Fruto.

Tala de maderas especiales: como robles tejos, manzanos y arces: día 6.

Tala de árbol de Navidad: los días 3, 4, 7, 8, 12 hasta las 18h, el 11 a partir de las 13h u el 12 hasta las 24h.

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta:
del 3 a las 12h hasta el 15 a las 24h.

Deseamos a nuestros lectores una Feliz Navidad, buena salud y fuerza creativa para el nuevo año.

Ramos de pino que se han abierto en el jarrón. Han sido cortadas en la luna ascendente

El cuidado de las abejas

La colmena vive en una colmena de paja o en un cajón, aislada del mundo exterior. Además como protección, las abejas recubren su hogar con propóleo para defender a la colmena de lo nocivo. La unión directa con el mundo exterior se hace a través de las piqueras.
Cuando el apicultor quiere beneficiar a la colmena de las fuerzas cósmicas, tiene que crear en la colmena una situación parecida a la que crea el agricultor cuando cuida sus plantas. Este último trabaja el campo. Con el aire entran las fuerzas cósmicas en la tierra, que son absorbidas por la planta y puede aprovecharlas hasta los próximos trabajos.
El apicultor tiene que abrir la vivienda de la colmena e interrumpir la capa de propóleo. De esta manera se crea un desorden, por el que las fuerzas cósmicas entran en la colmena y pueden actuar hasta el siguiente control. Así el apicultor puede trasmitir fuerzas cósmicas a la colmena de manera acertada.
No es indiferente que tipo de fuerzas se trasmiten en los trabajos en determinados momentos. El apicultor puede intervenir conscientemente y utilizar los días para determinados trabajos que en ese momento son importantes para el desarrollo de la colmena y la producción de alimento de la misma. La colmena recompensa al apicultor y le da parte de la miel de las sustancias almacenadas y bien elaboradas. Recomendamos los días de Tierra/Raíz cuando la colmena tiene que construir intensamente. Los trabajos en días de Luz/Flor estimulan la incubación y ayudan al aumento de la colmena. Los trabajos en días de Calor/Fruto fomentan la búsqueda de néctar. Los días húmedos de Hoja son desfavorables tanto para los trabajos como para la extracción de miel y la centrifugación de la misma.
Desde finales de los años setenta, la varroa está extendida en la mayoría de las colmenas europeas. Después de varios ensayos de incineración, recomendamos incinerar la varroa como de costumbre, triturarla y dinamizarla durante una hora para después pulverizarla entre los pasillos de los panales. La elaboración de la ceniza y su aplicación en la colmena se realizará en ambos casos con el Sol y la Luna ante Tauro (3).

Comentarios mensuales para el apicultor

Enero: la humedad en la primera semana de enero va a hacer que las abejas estén tranquilas. Las constelaciones planetarias que seguirán estimularán la colmena.

Febrero: en los días de Flor y Fruto, estimulamos a las abejas a su vuelo de purificación, aunque en la primera mitad de mes, las noches sean bastante frías.

Marzo: la primera mitad de mes es muy agradable para las abejas, pero durante la segunda hay una vuelta de frío en regiones de por si más frescas. Hay que controlar el alimento de invierno.

Abril: hasta el 15 de mes, no contamos con un clima agradable para las abejas. Si es posible, hay que proteger las colmenas todavía con calor.

Mayo: a partir del 11 empieza la primavera para las abejas.

Junio: a partir del 3, utilizar los días de Flor para aumentar las colmenas y para la cría de reinas. Los trabajos de cría, es decir su preparación tiene que estar lista hasta el 22.

Julio: en la segunda mitad de mes hay de nuevo buenas constelaciones de miel. Entre tanto hemos preparado un alimento para las abejas.

Agosto: tiene que estar listo el alimento de invierno. Es posible que a partir del 28 haya pequeñas recolecciones de miel. Si observamos el otoño, parece que quisiera compensar la mala primavera.

Septiembre: Mercurio y Marte cuidan en la primera mitad de mes para una recolecta de néctar y Venus estimula la posibilidad de una recolección de polen a partir del 19.

Octubre: también en octubre puede haber pequeñas recolecciones, si las abejas encuentran flores, que pueden haber sido plantadas como frutos intermedios o plantas de forraje.

Noviembre: este mes está muy marcado por Venus y Marte y traerá días agradables para las abejas.

Diciembre: en los días de Calor y Flor, las abejas encontrarán la posibilidad de volar. Hay que controlar las piqueras con rejillas contra los ratones.

Guía de tratamiento con Ácido oxálico.
Guía de tratamiento con Ácido fórmico.

Ejemplo de cultivo de verdura en un huerto

Bancal 1:	En otoño se echa abono animal. Se reservan los bordes para rabanitos y rábanos
Bancal 2:	En otoño se echa compost vegetal.
Bancal 3:	La mitad del bancal recibe abono animal en otoño.
Bancal 4:	La mitad del bancal recibe compost animal en otoño.
Bancal 5:	Antes de plantar, se echa compost animal.

Recomendaciones para posibles cultivos durante el primer año:

Bancal 1	Bancal 2	Bancal 3	Bancal 4	Bancal 5
Repollo blanco	Zanahorias	Guisantes	Patatas	Fresas
Lombarda	Pastinaca	Habas	Patatas	
Col rizada	Escorzonera	Guisante Zafra	Patatas	
Coliflor	Remolacha	Judías	Patatas	
Bróculi	Cebolla	Frijoles	Patatas	
Col verde	Maíz	Apio	Batata	
Col de Bruselas	Puerro	Pimiento	Batata	
Colinabo	Acelgas	Pepino	Batata	
Rabanitos	Hinojo	Calabacín	Batata	
Rábanos	Perejil	Tomates	Batata	

En el bancal 3, sólo se abonó a los 4 últimos frutos, los 5 primeros son leguminosas, que no requieren abono.

Plantar los diferentes cultivos de tal forma que se pueda cavar entre ellos.

La lechuga y la col se pueden plantar juntas.

En los años sucesivos se fueron cambiando los bancales. Las plantas del bancal 1 pasaron al bancal 2 y así. Las espinacas, la lechuga, el armuelle de huerta, y la escarola se pueden plantar como cultivos intermedios. Estas plantas no dependen de los frutos anteriormente plantados, pero no deben plantarse el mismo año, en el mismo lugar. La superficie destinada a los rabanitos y los rábanos se queda sin abono. Es importante que las plantas del bancal 1 se queden siempre juntas en un mismo bancal, cambiando solo a lo largo de los años. Las flores solo reciben compost vegetal, las rosas compost de ortigas.

Consejos prácticos para los cultivos sucesivos

Para los agricultores que comercian con sus productos, será difícil practicar los cultivos sucesivos de forma correcta en los invernaderos y túneles de plástico, ya que están bajo la presión de tener que vender y trabajar de forma rentable. En parte tienen que plantar más frutos vendibles que lo que uno debiera si practica consecuentemente los cultivos sucesivos. En tales casos, hace 40 años hice la propuesta de unirme a un agricultor que tenía paquetes de paja que se colocan en los túneles de plástico. Cortamos los paquetes de paja por un lado, echamos dentro una mezcla de compost y tierra y plantamos dentro pepinos o tomates. En las fincas biodinámicas se aplicarán también preparados biodinámicos. Cuando después de tres meses la planta ya no da más frutos, el agricultor que ha cedido los paquetes de paja los recibe de vuelta para el compost, y el agricultor que los había utilizado, empieza otra nueva serie. El año pasado hicimos un ensayo comparativo entre nuestra paja y paja de una granja convencional. En los paquetes de paja ajena se formaron rápidamente hongos debido a la continua humedad, y los pepinos enfermaron, mientras que las plantas de nuestra paja crecieron sanos y dieron buenos frutos. Queremos repetir este ensayo con paja de todo tipo de cereales, ya que las cualidades de cada uno de ellos darán diferentes frutos de pepino y tomates.

Paquete de paja con compost.

Compost de sustancias especiales

El inspector de planificación de jardines, el señor Herr, de Baden-Baden nos recomendó utilizar compost de ortigas para las rosas. Hay que segar las ortigas en mayo o en junio, cuando están en el mejor momento de su crecimiento. Cuando se hace el montón de estas pequeñas cantidades de compost terminado, se pulveriza algo de preparado combinado de boñiga (preparado de María Thun) o de los otros preparados biodinámicos y se tapa con hierba recién cortada. Si llueve poco hay que humedecer de vez en cuando. En otoño tendremos un compost negruzco magnifico, ya hecho tierra que se puede utilizar para los macizos de rosas. Podemos guardar algo de compost para los bancales de ruibarbo. El ruibarbo lo agradece al año siguiente con un crecimiento magnífico, tallos fuertes y rojizos y un aroma intenso.

Cuidado de frambuesas

Muchos lectores del calendario de Maria Thun nos hablan del mal estado de sus frambuesas. En la naturaleza, la frambuesa crece en la linde de los bosques, es decir, no está durante todo el día expuesta al sol, sino que está a medio sol. Sus raíces se entrelazan con la hojarasca del bosque, quizá también con las pinochas de los abetos. Las frambuesas selectas prefieren algo de compost al plantarlas. Podemos producir fácilmente compost de ramas de picea. Podemos utilizar todas las ramas que en noviembre y diciembre se utilizaron para decorar las tumbas en los cementerios (costumbre alemana) o como decoración navideña. No podemos usar ramas gordas, pero al hacer el montón debemos añadir pequeñas cantidades de compost terminado, algo de preparado de Maria Thun. Después humedecemos todo. Este compost se empieza en primavera, cuidándolo siempre bien hasta otoño, cuando ya se puede utilizar para cubrir generosamente los bancales de frambuesas. Este compost también sirve para los macizos de arbustos. Las frambuesas van a sentirse bien con estos cuidados y podrán crecer sin enfermedades. Las flores y las hierbas se lo agradecerán también al agricultor.

Cobertura de hojas al pie de las frambuesas

Compost para setos de flores

Para los que plantan setos con flores, es decir plantas con tallo leñoso, necesitan compost especial. Necesitan compost que provenga de celulosa transformada, para estimular el florecimiento de estas plantas. Así tenemos por ejemplo la corteza de pino triturado. No debemos utilizarlo tal y como se vende, sino que hay que ponerlo en el compost para que siga en proceso de transformación. Colocamos este compost, se mezcla con 10 kg de guano por metro cúbico, añadimos los preparados de compost, se humedece, y al ponerlo para reposar añadimos de 10 a 15 litros de preparado compuesto de boñiga. Después tapamos el montón de compost con hojas secas, paja o hierba. En las próximas semanas lo humedecemos una o dos veces más. Con esta cobertura de suelo los setos de flores tienen el mejor recubrimiento en otoño que podemos darle.

Si utilizamos corteza de árbol fresca o serrín, tenemos que comprobar que estos materiales no contienen productos protectores de madera que perjudicarían a los setos. Las cortezas de árbol y el serrín tienen que haber estado en el compost al menos dos años, ya que si no los eláteros del trigo ponen sus huevos debajo de los setos y tenemos que luchar contra sus gusanos durante años.

Para el cuidado de los setos podemos utilizar ramas de pino troceadas y hacer compost

Método de rotación de cultivos en la Agricultura

Se trata de grandes fincas de agricultura. Para empezar una rotación de cultivos, muchos agricultores prefieren plantar durante dos años una mezcla de hierba y trébol. Cuando segamos regularmente la parte exterior de la hierba, aparecen muchas sustancias orgánicas en la tierra. Al segar, muere siempre una parte de la raíz, por lo que los organismos de la tierra están continuamente trasformando el suelo y se va creando humus. Este proceso se ve estimulado si después de segar se pulveriza ese mismo día por la tarde el preparado combinado de boñiga (preparado de María Thun), después de una semana se pulveriza con el preparado de boñiga, y poco tiempo después, en un día de Hoja por la mañana, pulverizamos el preparado de sílice. Si no trabajamos con preparados biodinámicos, después de segar debemos pulverizar por la tarde con una infusión de ortigas, y una vez más, en un día de Hoja por la mañana, debemos pulverizar con una infusión de milenrama. Si no damos estos estímulos existe el peligro de que el elátero de trigo ponga huevos en la celulosa estancada de la tierra. De estos huevos nacerán unos gusanos que pueden dañar mucho el futuro cultivo de trigo. Estos animales necesitan varios años hasta que se desarrollen en escarabajos completos y mientras tanto viven de las raíces del cultivo. Con las pulverizaciones estimulamos la actividad de los organismos de la tierra y creamos las mejores condiciones para el cultivo posterior de trigo. Después del trigo tiene que seguir un fruto de raíz. Si nos decidimos por las patatas, remolachas forrajeras o remolachas de mesa, recomendamos que en el otoño anterior, si tenemos ovejas, echemos compost de estiércol de oveja en el campo a cultivar. El mismo efecto tenemos si pasa una manada de ovejas por los surcos de tierra de invierno. Para hacer trabajar el abono se recomienda pulverizar con el preparado de boñiga. Si escogemos como tubérculo las zanahorias o las remolachas, recomendamos hacer otra sucesión de cultivos. Después del trigo, debemos plantar centeno, que enraíza muy profundo y deja la tierra bien mineralizada.

Estiércol de oveja tras una majada en un campo

Las zanahorias, las cebollas y las remolachas aprecian esta tierra. Les gusta el nitrógeno que penetra la tierra con el aire, si realizamos los trabajos de cava en días de Raíz. Además según investigaciones del profesor Ahrens los organismos de la tierra trasforman así más fácilmente este suelo en humus. Recomendamos que aparte de los trabajos de cava, pulvericemos por la mañana o bien con el preparado de sílice o bien con una infusión de manzanilla en días de Raíz, para fomentar el crecimiento y la calidad. En los frutos de Raíz que producen azúcar, se recomienda además que en otoño apliquemos una vez un preparado de sílice, cuando la luna esté ante Aries o Libra, a eso de la 3 de la tarde. Con esta pulverización, la proteína madura bien y resultan valores de nitrato menores que los de azúcar. Si realizamos los trabajos de cava de estos frutos de Raíz con la luna ante Capricornio crecen pocas hierbas adventicias.
Después de los frutos de Raíz, la tierra aprecia un cultivo de plantas de Flor. Tenemos la colza, el lino y el girasol. La colza enriquece la tierra con azufre, que es importante para el posterior cereal que se cultive. También podemos plantar malva forrajera que activa el fósforo de la tierra para el cultivo posterior de cereal. Después tendríamos guisantes, alubias o lentejas, en parte para un cultivo de hojas o también semillas. Se venden muy bien entre los clientes ecologistas. El estiércol de los animales que se encuentren en la granja da impulsos de crecimiento a las diferentes plantas. La avena y el maíz reaccionan positivamente ante el estiércol de caballo.

Si además aplicamos el preparado de sílice en días de Fruto por la mañana o una vez además una infusión de milenrama, quedaremos asombrados del tamaño de los granos y de la cantidad recolectada. Esta avena es ideal para los copos.

Estiércol de caballo

Siembra de apoyo

En el cultivo de cereales quiero añadir la siembra de apoyo. En la granja de mis padres, después de la siembra de avena en primavera se sembraba inmediatamente después trébol rojo, que algunos años llegaba a crecer tanto que daba problemas al cultivo de avena, ya que había que retirar el trébol antes de agavillar. Después se daba como alimento a las vacas. Había que añadir paja para que no produjera gases.
Mejores resultados daban las lentejas como siembra de apoyo en los cultivos de cebada de verano. Las lentejas se enganchaban a las espigas de la cebada, las semillas maduraban al mismo tiempo, pudiendo ser separadas después de la cosecha. En años de muchas lluvias, era difícil cosechar lentejas, ya que las plantas caían a la tierra y resultaba difícil cultivarlas.
Entretanto sabemos que los cultivos de apoyo del aciano menor, de la neguilla y la facelia a través de las segregaciones de sus raíces facilitan fósforo a los campos de cebada y trigo. De esta manera el rendimiento de los cereales aumenta entre un 12% y un 15%. Después de la cosecha hay incluso más fósforo en la tierra que antes de la siembra de los cereales y las plantas antes citadas.

Centeno con aciano menor

Las fresas

Si observamos el crecimiento de las fresas silvestres, podemos comprobar que ya florecen a principios de la primavera. En este tiempo, las hojas son muy pequeñas. Tenemos la impresión que estas flores y hojas pertenecen a la cosecha del año anterior. Después crece el tallo relativamente. Después crecen los frutos y van más allá de la planta vecina, buscando el sol. Fuera en el fruto, crece la semilla, y después, cuando ha madurado, empiezan a crecer las hojas alcanzando un gran tamaño. Protegidas bajo estas grandes hojas quedan los capullos de flores en los cuellos de las raíces, guardándose para el año siguiente.

Desgraciadamente no nos dejamos guiar por la planta cuando cultivamos fresas. Antes de plantar echamos en la tierra bastante abono, así obligamos a la planta a que tenga un fuerte desarrollo de hojas. Los capullos crecen en tallos cortos y la planta da frutos grandes, que no puede cargar el tallo. Los frutos caen pesados a la tierra, lo que no es bueno ni para el aroma ni para todo el fruto.

Si intentamos seguir correctamente el desarrollo de la fresa, empieza su año ya en la cosecha. La planta intenta "huir" del lugar donde nace, y envía a sus hijos lejos de la planta madre. Podemos coger estos y plantarlos en otro lugar añadiendo pequeñas cantidades de compost hecho tierra. Una parte de los hijos los devolvemos cerca del círculo de su madre. A esta vieja familia le ponemos compost fermentado entre las filas, trabajándolo en la tierra. En estas superficies abonadas pulverizamos fuera de la planta con preparado combinado de boñiga. Pronto vemos como crecen las hojas. En este momento la planta prepara las flores para el año próximo. La planta necesita ahora un impulso de Luz. Es el momento de aplicar preparado de sílice que está hecho a base de cuarzo. Removemos el preparado en un día de Fruto por la mañana cuando sale el sol. Debemos removerlo una hora y pulverizamos fino sobre las hojas. Esto produce un impulso de Luz y Calor en la planta, que empieza a formar capullos, que quedan protegidos como una semilla en la parte interior de la planta, esperando hasta el año siguiente. Esta semilla etérica, hablando metafóricamente, desea tener una experiencia de madurez. Por esta razón volvemos a pulverizar con sílice una segunda vez, en un día de Fruto entre las 15h y las 16h. De esta manera la planta puede interiorizar completamente el impulso de Calor.

Fresas

Fresas silvestres

En el exterior la planta empieza a enrojecer, sus hojas brillan todavía, antes de que se recojan como en una semilla, hasta que deje ir saliendo sus pequeñas hojas en primavera, pero esta vez con tallos fuertes que pueden cargar con flores y frutos. Las hojas del año anterior se han marchitado y están en el suelo. Las nuevas crecen por encima. Ningún fruto debe tocar directamente la tierra, ya que es el lugar de los hongos. Así conservan un olor y aroma perfectos.

Nuevos campos de fresas

Dejamos a las fresas muchos años en el mismo bancal. Plantamos las nuevas en agosto. Se cultivan de igual manera, como hemos descrito. Dejamos 1,20m de distancia entre las filas. Esto es para el primer año bastante distancia. Echamos abono en todo el bancal, no sólo en donde están las fresas. El espacio entre medias lo reservamos para otras plantas. Ya que hacemos los trabajos de cava y cuidado en días de Fruto tratándose de fresas, tenemos que escoger una planta que también se trabaje en estos días. Tenemos así tomates pequeños, pimiento, calabacín, maíz, etc. No debemos de cargar las filas.
En el segundo año, lo que haya crecido fuera de las filas de fresas se devuelve a su lugar, se pulveriza el espacio intermedio con preparado de boñiga y se remueve la tierra. Ahora podemos sembrar o plantar plantas de flor entremedias, como el aciano menor, la facelia, la mostaza, que enriquecen el suelo con las segregaciones de sus raíces.
El tercer año podemos sembrar judías de mata o lupino, enriqueciendo la tierra con nitrógeno. En el cuarto año, las filas de fresas se han ampliado tanto que ya queda poco espacio entre ellas. Con este método tenemos cosechas ricas y frutos aromáticos, que compartimos con nuestros invitados. Al cambiar el bancal, dejamos un campo sano para un cultivo de coles.

Cultivo nuevo de fresas con grandes espacios intermedios. Entre las filas de fresas se han plantado cebollas que también se cuidan en días de fruto

Abono de excrementos de aves

Para las pequeñas huertas existe a la venta el abono de excrementos de aves. Nunca puede utilizarse fresco, sino que hay que fermentarlo con otras sustancias vegetales. Hay que mantenerlo húmedo, ya que se calienta rápidamente, y las mejores partes de abono se evaporan. No es apropiado para plantas de Hoja, puede utilizarse sin embargo para plantas de Fruto y flores. Si ha fermentado con muchas sustancias vegetales, puede utilizarse en otoño para matorrales de frutos de baya y árboles frutales. Funciona mejor si se trabaja este abono un poco en la tierra.

Efecto específico de los diferentes abonos animales

Hemos hablado ya a menudo del efecto específico de los excrementos de caballo. Tiene un fuerte efecto de calor, que no les gusta a las plantas de Hoja como la lechuga, las espinacas y el rapónchigo. Estas plantas prefieren tranquilidad. Esto no es posible con estiércol de caballo. Cuando hablo de estiércol animal, me refiero por supuesto a compost. El impulso del caballo estimula la formación de semilla. Precisamente es lo que queremos evitar en las plantas de Hoja. Éstas prefieren el abono de vaca. La toma de alimento pausada, el proceso de rumiar, todo esto son cualidades que producen un abono pensado sobre todo para las plantas de Hoja. No ha de utilizarse fresco, sino que tiene que pasar todo el proceso de fermentación de compost hasta hacerse tierra. Esto es lo más exquisito que desean las plantas de Hoja, hasta las coles. En cuanto al cerdo, es un animal que come de todo. Su sistema digestivo es poco complicado. Cuando echamos sus excrementos para fermentar, emiten poco calor. Los hongos tardan en aparecer. En los ensayos comparativos, solo el apio y la pastinaca reaccionan de forma positiva al abono de cerdo.

Instalación de compost con paja de pino, estiércol de caballo y vaca

A las ovejas no les gusta la cría en sitios cerrados. Cuando van por el campo, comen sobre todo de los bordes, donde crecen hierbas. Tan pronto como empiezan a comer, el movimiento peristáltico de los intestinos empieza a funcionar y aparecen los primeros excrementos. Si utilizamos estiércol de oveja para el compost, hay que mantenerlo siempre húmedo, si no emite demasiado calor y se evaporan las mejores cualidades. Este estiércol es apropiado para los frutos de semilla. En los ensayos comparativos, reaccionan bien las patatas, su crecimiento es sano y tienen mucha calidad. Durante años tuvimos cabras. Cuando se sacan los animales al campo, reaccionan de forma diferente que las ovejas. Rápidamente comían las ramas de los perales del vecino, o incluso los rosales. No les interesaban las hierbas. Se ponían a dos patas cuando veían setos de flores o árboles para comer sus hojas, sus pinochas, ramas o corteza. Su abono actúa como el de oveja.

Tiempo de siembra para árboles y matorrales

27-1	♀☍♄	Ciruelo, enebro, tuya, endrino, abedul, peral, tilo
7-3	♂☍♄	Ojaranzo, serbal, cerezo silvestre, roble, tejo, membrillo
2-4	♀☍♃	Abedul, peral, tilo, manzano, arce, haya
3-4	☉☍♃	Manzano silvestre, arce, fresno, espino albar, pino, nogal, castaño
28-4	☿☍♄	Olmo, vid, manzano silvestre, melocotonero, castaño, haya
26-6	♂☍♃	Roble, tejo, serbal, guindo agrio, membrillo, arce, manzano
1-9	☉☍♅	Avellano, pino, abeto, cedro, olivo, nogal, fresno
2-10	♀☍♂	Abedul, tilo, peral, roble, tejo, guindo agrio
22-10	☿☍♂	Saúco, alerce, olmo, serbal
7-11	☉☍♂	Avellano, castaño, roble, tejo, fresno, nogal
5-12	♂☍♃	Roble, arce, manzano, guindo agrio, escaramujo

Seminífero de arce

Dos generaciones de piñas

Nueces

Cuidado de parcelas de frutales, vides y matorrales de frutos de baya

Los agricultores de frutales y vides nos han solicitado información sobre el cuidado de los cultivos de frutales, vides y matorrales de frutos de baya (sin los arándanos):
En la mitad norte del planeta los cultivos de frutales comienzan a principios de noviembre. Primero, por cada hectárea hay que echar 10tn (10.000 kg) de compost hecho. Cuando haya terminado la caída de la hoja, podemos llevar a cabo tres trabajos en la tierra en días de Fruto, al mismo tiempo que pulverizamos el preparado combinado de bostas boñiga (preparado de María Thun) (con la masa para embadurnar el leño) sobre el tronco y las ramas. Esto sustituye al anteriormente recomendado embadurnado del leño en primavera.

Elaboración de la masa para el leño: metemos en una cuba de madera echamos 10 kg de boñigas de vaca, 10 kg de arcilla, 2,5 kg de harina basáltica (¡harina!), 2,5 kg de ceniza de madera, 1 litro de suero. Todo se remueve con una pala durante una hora, es decir se dinamiza. Se deja la masa en un lugar oscuro y fresco y puede utilizarse durante semanas.

Para elaborar el preparado combinado de boñiga María Thun, vertemos un kilo de masa en 100 litros de agua y lo removemos durante 20 minutos. Se deja reposar y se cuela con dos medias de perlón, para que las toberas del pulverizador no se atasquen. Esto se repite tres veces en días de Fruto, al mismo tiempo que los trabajos de laboreo.

Grosella roja

Grosella negra

En marzo se pulveriza con el preparado de boñiga tres veces en días de Fruto, al mismo tiempo que los trabajos de laboreo. Pulverizamos también los troncos y las ramas. En primavera, cuando aparezcan las primeras hojas, pulverizamos con una decocción de ortiga una vez por la tarde, en un día de Hoja.

Si después de las primeras flores aparecen las primeras hojas, podemos aplicar la primera pulverización del preparado de sílice sobre las hojas.

En un día de Fruto, empezamos a remover una hora antes de que salga el sol, después pulverizamos inmediatamente.

En un día de Flor a primera hora de la mañana, pulverizamos una vez con una infusión de ortiga y una vez con decocción de manzanilla.

Uva espina

En un día de Fruto puede rociarse infusión de milenrama, independientemente del preparado de sílice.

Las infusiones siempre han de pulverizarse sobre las hojas. Para la aplicación de un preparado de sílice como apoyo a la formación de capullos, tenemos en el 2005 varias fechas: 1, 10, 11, 12 de julio hasta las 8h y más tarde los días 20, 21, 28 y 29 de julio.

Cuando es necesario una poda de verano, escogemos un día de Flor o de Fruto, del 19 de junio a finales de mes, o en parcelas tardías, también en días de Flor o de Fruto, del 15 al 18 de julio.

Para la cosecha de frutos para ser conservados, escogemos días de Flor o de Fruto, que sean con la Luna ascendente, es decir no en el tiempo de plantación.

Después de la cosecha, pero antes de que caiga la hoja, aplicamos una pulverización de sílice en un día de Fruto a primeras horas de la tarde, a partir de las 15 horas. Esta pulverización permite madurar a la madera y es una medida preventiva para posibles parásitos y hongos para el año próximo.

Aparición masiva de insectos nocivos

Recomendamos a los agricultores que ya en verano observen el mundo animal y vegetal, así como su vida con los ritmos cósmicos. Así pudimos ver claramente como en el año 2004, las fuerzas de la constelación de Tauro a través del Sol, la Luna y los planetas incitaron a que se multiplicaran el escarabajo de la patata, la cetoína y el abejorro hortícola. En el Calendario les llamamos los "insectos de quitina". Si hay un exceso de multiplicación, podemos conseguir una regulación local de los mismos al incinerar unos pocos ejemplares, para evitar una aparición masiva (véase página de parásitos nocivos).

Escarabajo de la patata

Cetoína

Abejorro hortícola

Notas bibliográficas

1. Curso de agricultura biológico-dinámica, Rudolf Steiner GA 327 Ed. R.S.
2. Sobre las abejas, Rudolf Steiner GA 351
3. Die Biene, Haltung und Pflege (La abeja, conducta y cuidados), Matthias K. Thun.
4. El control de las plagas. María Thun. 88 páginas Ed. Rudolf Steiner, Madrid.
5. Constelaciones y agricultura biodinámica, María Thun.
6. Kosmologische und Evolutionsaspekte (Cosmología y aspectos evolutivos). Para los cálculos astronómicos sirvieron las efemérides Raphael´s astromical Ephemeris of the Planet for 2005, Londres, así como la experiencia adquirida en los ensayos.
7. La elaboración de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. Scheibe, H. Heilmann.
8. El empleo de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. Scheibe, H. Heilmann. U.J. König.
9. Las acciones de los planetas y los procesos vitales en el ser humano y en la tierra. B.C.J. Lievegoed.
10. Sembrar plantar y recolectar en armonía con el cosmos. María Thun. Ed. R.S.
11. ¿Qué es la agricultura biodinámica? Herbert Koepf. Ed. R.S.
12. La granja y el huerto biodinámicos (Tierra y pan). Kjell Arman. Ed. R.S.
13. La fertilidad de la tierra, su conservación y renovación. Ehrenfried Pfeiffer. Ed. Antroposófica. 388 pág. Disponible en Ed. R.S.
14. Cultivar en armonía con la Luna y el Cielo. Xavier Florín. Ed. Susaeta.

Asociación de Agricultura Biodinámica de España

Se fundó el 28 de abril de 1981 en Canarias. Allí el 19 de febrero de 1987 volvió a fundarse con ámbito nacional. Sus fines son promover, guiar y proteger el método agrícola biodinámico, sus prácticas y principios. Para ello, la Asociación apoya las publicaciones y la comunicación, el asesoramiento, conferencias, cursillos, reuniones con los grupos regionales, el suministro de los preparados, etc.

Ser miembro de la Asociación está abierto a cualquier persona con interés en promocionar actividades como las mencionadas. La cuota anual es de xxx euros. Los miembros reciben descuentos en cursos.

Solicitud de preparados biodinámicos en España.

La elaboración cuidadosa del compost es una base importante en el cultivo biológico. En otoño, colocamos las sustancias listas en superficies preparadas, permitiendo de esta manera que los organismos de la tierra trabajen durante el invierno.

Los cuidados de los campos de sembradío y la siembra de semillas según los ritmos cósmicos, que corresponden a cada tipo de planta, es un sistema que permite que los cultivos germinen rápidamente, creciendo fácilmente sin sufrir por los efectos de los parásitos.

Todos los cuidados y consideraciones desde el punto de vista de las constelaciones nos ayudan a obtener una cosecha de calidad, que corresponde a las exigencias de salud del hombre.



EDITORIAL RUDOLF STEINER

c/ Guipúzcoa 11, 1°, 28020 Madrid. Tel. 91 553 14 81 - 91 185 07 97/99
Fax 91 553 14 81 pedidoseditorial@rudolfsteiner.jazzel.es

ISBN 84-89197-84-9

9 788489 197848