MARIA THUN®

CALENDARIO DE AGRICULTURA BIODINÁMICA 2016

EL ORIGINAL DESDE HACE 54 AÑOS

A PARTIR DE ENSAYOS CON LAS CONSTELACIONES

ELABORACIÓN
MARIA THUN® – MATTHIAS K. THUN

MARÍA THUN

CALENDARIO DE AGRICULTURA BIODINÁMICA 2016

Compilado por Matthias K. Thun y Christina Schmidt-Rüdt

Adaptación a España e informaciones complementarias
Pablo San Miguel de las Heras
Asesoramiento: Julio Arroyo

CON LAS ÉPOCAS DE SIEMBRA, CULTIVO Y COSECHA Y LOS DÍAS FAVORABLES PARA EL APICULTOR

Editorial Rudolf Steiner S.L.
Calle Guipúzcoa nº 11 -1ºIzda
28020 Madrid - España
TEL. 915531481
www.editorialrudolfsteiner.com

Índice

Instrucciones para el uso del calendario	4
Horno público de pan en Edertal Walther Thun	5
Walter Thun, Horno público de pan en Edertal, acuarela, 1980, 61x49 cm	6
Introducción	7
Molinos antiguos	8
Introducción para los nuevos lectores del calendario de María Thun	11
¿Qué son oposiciones, trígonos y conjunciones?	12
Conjunciones y acumulación de conjunciones.	13
Fechas favorables para la siembra de árboles y arbustos 2016	14
La luna ascendente y la luna descendente. Sobre el Hemisferio Sur	16
La Luna sideral	18
El zodiaco. Los trígonos	19
Clasificación de las plantas para la siembra, los cuidados y la cosecha	20
Elaboración de pan de centeno	22
Elaboración de la leche	22
Época de tala para maderas especiales	22
Enero y comentarios.	24
Febrero y comentarios.	26
Marzo y comentarios.	28
Abril y comentarios.	30
Mayo y comentarios.	32
Junio y comentarios.	34
Julio y comentarios.	36
Agosto y comentarios.	38
Septiembre y comentarios.	40
Octubre y comentarios.	42
Noviembre y comentarios.	44
Diciembre y comentarios.	46
Plaga de hongos en las plantas	48
Recolección de plantas de los preparados biodinámicos. El cuidado de las abejas.	49
El alimento de las abejas. Elaboración del pan de centeno	50
María Thun y la elaboración del pan	52
El eclipse solar del 20 de marzo de 2015	56
Los efectos del invierno 2014/2015 en las abejas. Plagas de ácaros de varroa	62
Loque americana (bacillus larvae)	67
Plaga de gorgojo del trigo y su regulación	69
Predicciones Meteorológicas y posición de los Planetas. Por Pablo San Miguel	70
El impulso de Rudolf Steiner a la agricultura	107
Bibliografía	108
Asociación de Agricultura Biodinámica de España	108
Los Preparados Biodinámicos	108
Pedidos de preparados biodinámicos	108
Enlaces de libros recomendados	109
Contraportada	110

Instrucciones para el uso de este Calendario

A menudo recibimos consultas de lectores que tienen dificultades para interpretar las indicaciones de los meses. Por lo general preguntan por las cifras, que se refieren a las horas del día. Rogamos lean atentamente esta página, donde encontrará respuesta a esas preguntas. Gracias.

- Junto a la fecha y el **día** de la semana está indicada la **constelación** zodiacal ante la que se encuentra la **Luna** durante ese día, con la hora de entrada en dicha constelación. La Luna permanece ante esta constelación hasta que se indica una nueva.
- En la siguiente columna están indicadas otras **posiciones importantes**, por ejemplo para el desarrollo de la planta.
- En la columna tercera se indica especialmente al **apicultor** cuál es el **elemento** más estimulado por la Luna en ese día. Las influencias de calor en tiempos de tormenta se citan como «Tendencia a tormenta» (Ta) en la columna quinta.
- En la columna curta se indica el órgano de desarrollo de la planta que está favorecido por la siembra y los trabajos de cultivo en ese día, con las horas exactas. Si después del órgano no aparece ninguna hora, entonces actúa durante todo el día.
- Por último, en la columna quinta aparecen abreviados otros fenómenos naturales o predicciones meteorológicas que afectan a la disposición general del clima.

Cuando en un mismo día se mencionan elementos diferentes de los que corresponderían a la posición lunar en ese momento, **no se trata de errores** sino de alteraciones debidas a otras **posiciones cósmicas, que modifican y se superponen al impulso lunar-zodiacal** y asimismo favorecen a otro órgano de la planta.
Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa y pueden ser convertidas a la «hora local» en otros continentes.

Símbolos astronómicos y Abreviaturas

Constelación		*Planetas*		*Posición*		*Tendencia a*	
♓	Piscis	☉	Sol	☺	Luna llena	Td	Tempestad
♈	Aries	♁	Tierra	●	Luna Nueva	Ta	Tormenta
♉	Tauro	♀	Venus	☊	Nodo ascendente	To	Terremoto
♊	Géminis	☿	Mercurio	☋	Nodo descendente	DC	Día conflictivo
♋	Cáncer	♂	Marte	◠	Luna descendente	E	Erupción
♌	Leo	♃	Júpiter	◡	Luna ascendente	M	Mal Tiempo
♍	Virgo	♄	Saturno	Pg	Perigeo (luna cerca)	Q	Quintil
♎	Libra	♅	Urano	Ag	Apogeo (luna lejos)	❑	Cuadratura
♏	Escorpio	♆	Neptuno	●	Eclipse		
♐	Sagitario	♇	Plutón	●	Eclipse		Trasplante
♑	Capricornio	☍	Oposición	△	Trigono		
♒	Acuario	☌	Conjunción				

Horno público de pan en Edertal

Walter Thun

Todavía encontramos hornos públicos de pan en algunos pueblos de Alemania. Los muros son de piedras naturales de la región y el tejado está sujeto por la celosía de la construcción.
Una tercera parte del pequeño edificio es un espacio cerrado, es el lugar donde se horneaba el pan. Dos terceras partes es una entrada techada. Podemos reconocer la forma de una enorme barriga de vaca, que en realidad es un horno de chamota con una capa de revoco.

El horno público está algo alejado de nuestra granja, en medio de una pradera que está en pendiente. Alrededor pastan tranquilamente vacas y gallinas. No es de extrañar, que el pintor Walter Thun, que admiraba el paisaje al volver a casa, lo visualizara recordándole a una inmensa barriga de vaca con una cabeza enorme y brillante. ¿Se le mostró en esta imagen el "Yo" de las vacas que allí pastaban? ¿Al horno con forma de barriga de vaca le creció una cabeza luminosa?

María Thun

Si miramos el cuadro un rato y nos dejamos impregnar por la imagen, encontramos todo lo que el pan necesita para ser digestivo y nutritivo:

La vaca, no solo por el calor que irradia, sino también por sus boñigas únicas que abonan la tierra para que crezcan mejor los cultivos.

La gallina, cuyas fuerzas fosfóricas apoyan toda formación de semillas y la campesina, que con todo respeto lleva a casa el pan horneado.

Antiguamente el proceso de hornear el pan era casi un culto. Mis abuelos y mis padres, cuando éramos niños intentaban explicarnos de manera sencilla que el pan es algo especial y no se puede tirar. El pan que se ponía duro, se ablandaba en agua y se daba a los animales, que nunca se saciaban de comerlo.

Las imágenes están disponibles en tamaño de 40x50 cm.



Walter Thun, Horno público de pan en Edertal, acuarela, 1980, 61x49 cm

Introducción

Estimado lector, con el calendario María Thun de 2016, no solo queremos presentar un calendario normal, sino que vamos a responder preguntas que nos han ido planteando. En el calendario de 2015 nos centramos en explicaciones sobre el cultivo de cereales y el pan de levadura madre. En el calendario de este año queremos mostrar los diferentes molinos de harina y hornos de pan para abarcar todo lo referente al pan.

Tuvimos buenas cosechas de miel en las primaveras de 2014 y 2015, pero abordamos también el continuo problema que tenemos con la varroa (varroa jacobsonii y también varroa destructor) y con la loque americana (Paenibacillus larvae).
Damos explicaciones sobre la reparación de las colmenas tradicionales de cestos de mimbre y este año dedicamos más espacio de lo habitual a las abejas.

No faltan por supuesto las recomendaciones del calendario. Les deseamos que disfruten de la lectura y nos alegraría poder facilitarles el trabajo con la tierra, los cultivos y las abejas con este calendario de María Thun.

Dexbach, junio de 2015
Para el editor Matthias K. Thun

Corrección del calendario de 2015:

En el calendario de 2015 explicamos extensamente el problema de las babosas.

En un párrafo escribimos un error. Las babosas se alimentan generalmente de plantas, desde las semillas germinadas hasta las plantas adultas. Hay también babosas que se nutren principalmente de partes muertas de la planta y los huevos de otras babosas los devoran como una exquisitez. Este tipo de babosa es beneficiosa y hay que apoyarla, teniendo en cuenta además que es muy rara. Pertenece a la familia Limacidae y en el calendario del año pasado no citamos sus virtudes. En la imagen vemos una babosa (Limax maximus) de unos 10 a 18 cm.
Igual que las otras babosas se activa por la noche y por el día apenas se deja ver.

Algunos lectores nos han llamado la atención sobre este descuido. Aprovechamos para darles las gracias y nos disculpamos también ante estas babosas.

Molinos antiguos

Cada vez hay más familias y campesinos que quieren hacer su propio pan y muchos lo consiguen con éxito. Queremos presentar varias opciones que tuvimos en cuenta en nuestros ensayos de pan. Hay muchos gustos sobre la calidad de la harina. Hay quienes quieren el grano triturado y hay otros que quieren harina fina.

En los molinos de grano profesionales utilizan un mecanismo del que no vamos a hablar. En las familias, en los hornos comunitarios o de pequeñas panaderías con molino propio, usan molinos que trabajan según los principios de antaño. Los molinos tienen muelas que se mueven al girar las palas que son impulsadas por la fuerza del viento, si es un molino de viento, por el agua, si es molino de agua, o por la electricidad. Los molinos de viento y agua son muy raros de encontrar y al verlos tenemos recuerdos nostálgicos de la infancia. En la realidad ya solo se encuentran en museos al aire libre.

Los molinos de viento solo los encontramos en regiones donde todo el año corre el viento. Suele ser en las zonas costeras o en regiones en las que por sus formas se propician las corrientes de viento. Hay diferentes tipos de molinos. El viento puede venir de varias direcciones, pero el molino tiene que estar construido de tal manera que las aspas puedan orientarse según la dirección del viento.

Walter Thun, Molino de viento de Worpswede, acuarela de 1970, 64x64 cm

Según el tipo de región encontramos molinos que giran enteros, otros solo giran la parte superior y el edificio se queda fijo. En la imagen de "El molino de Worpsweder" de Walter Thun, el molino solo gira la parte superior. El inconveniente del molino de viento es que no se mueve si no hay viento. Debido a la geografía, los molinos de viento son enteramente de madera, excepto en el sur de Europa que son de piedra, y solo la parte superior es una estructura de madera. Este tipo de molino no permitía fácilmente los giros, por lo que los molinos se construían en dirección del viento principal.

En regiones desérticas, en las que el viento no es un factor importante, están las tahonas o norias de sangre. Son molinos que se mueven por el movimiento en círculo de un burro que mueve la muela de piedra del molino, al estar unido a una estructura de vigas.

En las regiones montañosas de Alemania por las que corren muchos arroyos, los molinos de agua eran lo más corriente. En algunos pueblos había varios molinos en el mismo arroyo. Se utilizaban para la elaboración de aceite de colza o para moler cereales. Los arroyos no llevaban suficiente agua todo el año para poder mover la rueda del molino, por lo que se construyeron pequeñas presas que retenían el agua y se crearon balsas o albercas de molinos. Las esclusas se abrían cuando se molía para poder mover las grandes ruedas de los molinos.

Las balsas de molino de las regiones montañosas tenían el inconveniente que los arroyos de montaña arrastraban piedras que se depositaban en las balsas, reduciendo el tamaño de las mismas. Los molinos tenían menos agua para mover las ruedas.

Los antiguos molineros sabían que podían retirar las piedras de las balsas sin grandes esfuerzos. En determinadas constelaciones abrían las esclusas de las balsas y el agua se llevaba las piedras.

Con el tiempo se perdió ese conocimiento y la limpieza de las balsas con grúas era complicada.

Theodor Schwenk, ingeniero e investigador de agua y las corrientes de agua, tenía su instituto en la Selva Negra en el sur de Alemania y oyó hablar del dilema. Durante largas investigaciones intentó descubrir cuál era la constelación que limpiaba las balsas de los molinos.

En aquella época Theodor Schwenk y Maria Thun estaban regularmente en contacto. En una ocasión que se encontraron en el instituto, estudiaron intensamente el tema. Se cristalizó la idea de la constelación de la "luna nueva descendente". En esta luna el agua parece promover fuerzas en forma de torbellino que podrían arrastrar los cantos de las balsas al abrir las esclusas.



Walter Thun, Molino de agua en Münchhausen, acuarela, 1965, 55x45 cm

María Thun había observado durante años los movimientos del agua en el mar del norte y pudo participar en la solución del dilema.
Existen diversas construcciones de molinos de agua. Los molinos de montaña son diferentes a los molinos de la llanura. En las montañas se necesitaban balsas que se construían en una parte superior al molino. Estas balsas o albercas eran necesarias ya que el nivel de caudal del agua variaba según la estación y solo podía equilibrarse con una reserva de agua. Se conducía el agua hacia el molino, la rueda del molino tenía "cucharas" que una vez llenas movían el molino por el peso del agua.

Los molinos de agua en los llanos solían construirse a orillas de grandes ríos, ya que siempre había corriente de agua.

Este tipo de molino no tenía "cucharas", sino palas, que entraban desde arriba en el agua, de tal manera que la velocidad de la corriente hacía mover el molino. Es un principio parecido al de los barcos de vapor con ruedas hidráulicas.

Hoy en día el viento y la fuerza hidráulica han sido sustituidas por la electrotécnica.

Walter Thun, esclusa en una alberca en Schwalm, acuarela, 1958, 55x38 cm

Introducción para los nuevos lectores del calendario de María Thun

Desde hace más 60 años hacemos ensayos teniendo en cuenta la acción de los ritmos cósmicos y las constelaciones sobre la agricultura, la horticultura y de alguna manera en especial sobre la vida de las abejas.

Los resultados de estos estudios son la base para las recomendaciones que anualmente indicamos en el calendario de María Thun®. No podemos editar todos los nuevos conocimientos en una sola publicación, por lo que hemos sacado varios libros (se indican en la bibliografía al final del calendario). Queremos contarles de forma breve los pasos más importantes de todo este periodo. La información más detallada la encuentran en los diferentes libros. Las siembras de rabanitos realizadas durante varios días en el año 1952, presentaron muy diferentes desarrollos. Esto me animó a sembrar rabanitos durante semanas en iguales condiciones. Como no podía explicar las diferencias y no conocía el impulso que actuaba en el crecimiento, decidí continuar el trabajo al año siguiente. Suponía que las diferencias se debían a los ritmos cósmicos. Así empecé a estudiar astronomía.

Después de varios años comprendí que las diferencias se producían cuando sembraba y cavaba en días de iguales fuerzas cósmicas. Cuando preparaba un campo de unos diez metros de largo y sembraba cada semana una fila de rabanitos, las diferencias entre las plantas eran bastante menores que si todos los días preparaba la tierra y luego sembraba.

Las hojas tenían formas diferentes. Pero cuando regaba en época de sequía, las hojas que crecían, lo hacían de manera uniforme. Fueron dos experiencias fundamentales que tenía que tener en cuenta si quería llegar al fondo de los resultados.

Después de nueve años, pude publicar los primeros resultados: si se cava la tierra a una pala de profundidad, se activaban los impulsos cósmicos de la tierra, que habían sido tomados en la siembra y se expresaban en la forma de la planta. Estas fuerzas provienen de las constelaciones y se transmiten a la Tierra a través de la Luna, que a su vez se vale de los elementos clásicos para actuar: tierra, agua, aire/luz y calor. Estos elementos son originalmente de las estrellas, cuando la luna pasa por una constelación determinada en el momento de la siembra, se ponen en marcha diferentes impulsos en la planta.

A lo largo de los años hemos ido descubriendo nuevas fuerzas cósmicas. Nos referimos a los planetas, que también influyen al desarrollo de las plantas.

Por un lado había unos impulsos cósmicos favorables a las plantas, por otro había desfavorables. Como consecuencia aparecían plagas o las plantas desarrollaban semillas que no podían germinar.

También comprobamos que pulverizar con los preparados biodinámicos solamente favorecía el crecimiento si se realizaba bajo condiciones cósmicas favorables, cuando las condiciones eran desfavorables, se impedía el crecimiento y la cualidad era peor.

De esta manera hemos llegado a las recomendaciones sobre la siembra en el calendario de María Thun, de acuerdo con el funcionamiento favorable para la siembra, los cuidados y los trabajos de cava, así como la aplicación de los preparados y la cosecha.
De esta manera podemos contar con los mejores resultados y la mejor calidad nutritiva de las plantas.

¿Qué son oposiciones, trígonos y conjunciones?

Oposición ☍

En una oposición geocéntrica, el observador se encuentra en la Tierra y en el entorno cósmico hay dos planetas que está en un ángulo de 180º entre sí. Se miran, su visión traspasa uno a otro. Sus rayos caen a la Tierra y estimulan el crecimiento de las semillas, que acaban de ser sembradas. En los ensayos realizados bajo oposiciones, hemos obtenido el mejor rendimiento y la mejor calidad de cultivos.
En las oposiciones heliocéntricas, el observador tiene que imaginarse en el sol. Aquí de nuevo hay dos planetas en un ángulo de 180º que se miran. Sus rayos también serán captados por la Tierra y toda su vegetación, estimulando el crecimiento.
En una oposición siempre hay dos constelaciones del zodiaco con una influencia positiva. Si un planeta está ante una constelación de calor, el otro está ante una constelación de luz o a la inversa. Si un planeta está ante una constelación de agua, el otro está ante una del elemento tierra. En el clima sucede entonces un "subidón" (alta presión= anticiclón y "subidón" son en alemán la misma palabra) que también influye positivamente en los seres humanos.

Trígono △

En un trígono tenemos dos planetas en un ángulo de 120º entre sí. Dos planetas se encuentran ante trígonos de igual elemento de fuerza, pero ante constelaciones diferentes, por ejemplo ante Aries y Leo. Son dos constelaciones de calor, dos trígonos de calor. Si dos planetas están ante constelaciones de agua en posición de trígono, la influencia del elemento agua aumenta, es decir se producirán generalmente más precipitaciones. Las plantas sembradas crecerán con más follaje que en otros días.
Si sembramos en un Trígono de Calor, estimularemos la formación de frutos y semillas.
El efecto de los trígonos puede hacer cambiar el crecimiento de las plantas.

Conjunciones y acumulación de conjunciones ☌

En el caso de las conjunciones o acumulación de conjunciones, dos o más planetas están alineados en el universo. Generalmente el planeta que está más cerca de la Tierra es el que va a influir en nuestro planeta y el mundo vegetal. Si la influencia de la conjunción es más fuerte que la luna sideral de ese día, entonces hay desacuerdos cósmicos, como consecuencia las plantas se irritan y sufren en su crecimiento. El efecto negativo aumenta si la luna o un planeta oculta otro, en este caso hablamos de eclipse (🌘). La siembra en estos momentos impide el crecimiento armonioso de la planta o daña su fuerza regenerativa.

Plantación/Transplante (Aclaración)

La luna descendente es favorable para realizar podas y plantaciones (no hay que confundir la siembra con la plantación; por siembra se entiende: cuando ponemos semillas en la tierra o en los semilleros, lo cual puede hacer tanto en Luna ascendente como en Luna descendente. Por plantación se entiende: cuando tomamos un esqueje de otra planta o plantas que arrancamos de los semilleros o de las macetas compradas en viveros, para plantarlas en el sitio definitivo del huerto donde culminarán todo su desarrollo.

Los Periodos desfavorables

En el calendario hemos omitido los períodos en los que se producen eclipses, nodos lunares o planetarios u otras posiciones con efectos negativos (en el calendario figuran--------) Si por falta de tiempo nos vemos obligados a sembrar en estos días desfavorables, podemos elegir días más propicios para realizar los trabajos de cava y conseguir de esta manera una mejora considerable.

Fechas favorables para la siembra de árboles y arbustos 2016

19-1-2016	♀☍♃	Acacia, robina, ciruela, abedul, peral, tilo, arce, manzano, sauce
8-3-2016	☉☍♃	Fresno, serval, avellano, manzano, ciruelo, arce
15-3-2016	☿☍♃	Alerce, aliso, olmo, arce, manzano, haya, fresno, castaño, nogal
22-5-2016	☉☍♂	Tejo, roble, castaños, abeto, picea, tuya
25-5-2016	♀☍♂	Acacia, robina, ciruela, abedul, peral, tilo, tejo, roble, castaños, pícea
3-6-2016	☉☍♄	Fresno, abeto rojo, avellano, abeto, cedro, tuya, enebro, ciruelo, ojaranzo, pino, espino, aliso, picea
4-6-2016	♀☍♄	Betula, peral, tilo, acacia, sauces, tuya, enebro, ciruelo, ojaranzo
9-6-2016	☿☍♂	Aliso, alerce, tilo, olmo, tejo, roble, castaños
20-6-2016	☿☍♄	Aliso, alerce, tilo, olmo, tuya, enebro, ciruelo, ojaranzo
7-7-2016	☿☍♇	Aliso, alerce, tilo, olmo, sauco
8-7-2016	☉☍♇	Fresno, pícea, cedro, abetos, avellano
7-8-2016	☿☍♆	Aliso, alerce, tilo, olmo
14-8-2016	♀☍ ♆	Abedul, sauce, tilo, acacias, betula, alerce
2-9-2016	☉☍ ♆	Fresno, pícea, cedro, abetos, avellano
15-10-2016	☉☍ ⚷	Fresno, pícea, cedro, abetos, avellano, serval
20-10-2016	☿☍ ⚷	Aliso, alerce, tilo, olmo
26-12-2016	♃☍ ⚷	Arce, manzano, haya, fresno

También para este año desde la Asociación de Agricultura biodinámica de España, queremos aportar una información adicional que complete las recomendaciones del Calendario de María Thun, como ya venimos haciendo desde hace unos tres años, al lado de la fecha recomendada hemos añadido el motivo de la recomendación, que en este caso siempre es la columna central, en la que se indica los planetas que se encuentran en Oposición, (lo cual no viene en el original en alemán).
Esta información se basa en investigaciones realizadas en la zona de Europa Central, e indicaciones de Rudolf Steiner en la que se recomendaba tener en consideración ciertos ritmos planetarios que influyen favorablemente en el crecimiento de cada especie de árboles. Así Rudolf Steiner recomendaba tener en consideración los ritmos de Saturno en las coníferas, atendiendo en este caso a cuando los anillos son visibles o no, y si está en ascendente o descendente. En el caso de los Robles y otros Quercus, recomendaba tener en cuenta los ciclos de Marte. Para los manzanos, recomendaba tener en cuenta los ritmos de Júpiter. Pero sobre todo se trataba de indicaciones a desarrollar e investigar por los agricultores y viveros forestales, de manera que se puedan aprovechar los mejores

momentos de siembras o plantación de esquejes, en cada especie arbórea y arbustiva para un sano crecimiento y óptima producción de frutos, evitando otros períodos desfavorables, como por ejemplo las conjunciones, nodos, eclipses, etc..., que pueden explicar en algunos casos, ciertas plagas que afectan a algunas zonas de bosque que suelen ser de una sola especie cultivada por el hombre, ya que en el bosque mixto auto-regenerado naturalmente es más raro que se den estos problemas. En nuestros tiempos de grandes incendios, lo normal es que se realice una reforestación dirigida por el hombre, que no suele tener en cuenta estos ritmos y la diversidad de especies en el bosque, al reforestar con un interés puramente económico en base a la producción maderera. Se seleccionan buenas semillas, pero no se tiene en cuenta cuando es el mejor momento para la siembra y lo habitual es plantar una sola especie.
Por otra parte los lectores ya se habrán percatado de que muchas de las especies de gran interés forestal y frutal en nuestro país, no son habituales en Centro Europa, y por tanto no hay ningún tipo de recomendación en el calendario al respecto: la higuera, la vid, el olivo, el almendro, el naranjo, el pino piñonero, el granado, el pistachero, el aguacate, la platanera, el kiwi, la piña el algarrobo, son algunos ejemplos. Será una tarea de futuro observar las características de cada especie y establecer la relación correspondiente con el planeta que rige su crecimiento. Por el momento como reglas generales se puede recomendar, que todas las Oposiciones son favorables para un buen crecimiento de árboles y arbustos, y que conviene evitar los nodos y conjunciones. Como experiencias personales podemos mencionar que cuando hemos trasplantado o sembrado algún árbol frutal o forestal en días de Oposiciones planetarias e incluso de Trígonos-fruto, los frutales han respondido con abundantes cosechas.

Para los árboles y arbustos que no se mencionan es porque no hay fecha especial de siembra en este año. Podemos guiarnos por el tipo de fruto del árbol o arbusto y plantar durante la constelación y luna correspondientes.



Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita, ante la constelación de Sagitario, empieza a ascender. Sus órbitas se vuelven cada día más amplias. Sus puntos de salida se desplazan en dirección noreste y sus puntos de puesta en dirección noroeste. No hemos de confundirlo con la luna creciente.

Durante la luna ascendente, las savias se dirigen con más fuerza a la parte superior de la planta, que está llena de savia y fuerza. Es apropiado cortar y realizar los injertos. Aprovechando los días de fruto que se hallen en este periodo, se puede hacer que aumente este efecto sobre las plantas de fruto, y los días de flor para las plantas de flor. La fruta recogida durante este periodo, se mantiene almacenada más tiempo, fresca y jugosa. Estos días son también propicios para cortar los árboles de Navidad, pues las hojas de pino tardan más en caer y su aroma es más intenso cuando se les corta en los días de flor.

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita mensual ante la constelación de Géminis, empieza a descender (). Sus órbitas en el cielo del sur serán cada día más bajas, sus puntos de salida se desplazan hacia el sureste y sus puntos de puesta en dirección suroeste. En el Hemisferio Sur se invierte esta situación (). Véase pág. siguiente.

Como "siembra" denominamos siempre el momento en el que enterramos la semilla en la tierra. Cuando llevamos las plantas de un sitio a otro hablamos de "trasplante", por ejemplo cuando cambiamos las plantas jóvenes de un lecho de siembra protegido al lugar definitivo a cielo abierto donde se desarrollarán, o al repicar plantas jóvenes, a veces incluso varias veces, para fortalecer el desarrollo de la raíz, como se hace en las plantaciones de frutales, arbustos y plantas de maceta. Aquí elegimos el periodo de la luna descendente, que no debe confundirse con la luna menguante, perteneciente al ritmo luminoso de las fases lunares.

Durante el periodo de plantación, las plantas enraízan mejor y se vinculan rápidamente con el nuevo lugar. Se puede aumentar este impulso en cada especie vegetal eligiendo como periodo de plantación para las plantas de hoja los días de hoja (Cáncer o Escorpio), para las plantas de raíz como el apio los de raíz (Virgo), para pepino y tomate los de fruto (Leo), de modo que además del impulso de enraizamiento, se favorece el órgano que se engrosará. En este periodo, el ascenso de la savia por las plantas es mínimo y así favorable para podar setos, cortar árboles y madera para construir, y abonar prados y frutales.

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita ante la constelación de Sagitario, empieza a descender. Esto significa que comienza el tiempo de plantación. Sus órbitas se vuelven cada día más bajas. A las dos semanas llega a la constelación de Géminis, el punto más bajo de su órbita. Esto significa que termina el tiempo de plantación. Todas las savias y fuerzas se dirigen ahora con más fuerza hacia la parte superior de la planta. Cambian todos los ritmos ascendentes ♒ y descendentes ♈ de la Luna y de los planetas. La orientación frente al zodíaco permanece igual, por ello también se puede seguir contando con la división de la planta en cuatro órganos: raíz, flor, hoja y fruto-semilla. Si por ejemplo en el Hemisferio Norte miramos al cielo en la Nochebuena de 1996, la luna llena sale ante la constelación de Géminis e ilumina la noche durante más de 16 horas; y el signo ♈ dice que ha llegado al punto más alto de su órbita y ahora está bajando, o sea que comienza el tiempo de plantación.

Por el contrario, en el Hemisferio Sur llegó el 7 de enero de 1997 a su punto más alto ante la constelación de Géminis y entonces comenzó a descender. Entonces comenzó el tiempo de plantación para el Hemisferio Sur. Ahora arraiga bien la planta que se ha trasplantado. Unas dos semanas después, el 20 de enero, la Luna llegó frente a la constelación de Géminis. Entonces empezó a ascender ♒ y el tiempo de plantación acabó, volviendo a actuar las savias y las fuerzas en la parte superior.

Si estando en el Hemisferio Sur queremos contemplar las constelaciones conocidas en el Hemisferio Norte, las primeras veces hay que buscarlas con cierto esfuerzo, pues todas están al revés. Tomamos la Tierra como esfera, pero el entorno cósmico como cúpula.

El lector puede invertir con un lápiz rojo los signos para el tiempo de plantación. Esto también se aplica al abonado y la siembra de raíces. Es mejor sembrar las plantas de fruto bajo las constelaciones ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏.

A todas las horas citadas se debe **restar 4**. Donde dice **inicio** de tiempo de plantación (trasplante) debe decir **fin** de tiempo de plantación y viceversa. En los comentarios sobre labores con árboles frutales, cultivos o apicultura, debe considerarse que muchas veces son labores correspondientes a una estación del año determinada, y cuando este sea el caso, debe corregirse para el Hemisferio Sur, buscando el mes contrario o sea **6 meses antes o 6 meses después.** Por ejemplo, si se recomienda podar frutales en una constelación de Fuego y Luna descendente de diciembre, para esa labor en el Hemisferio Sur deberá buscarse una situación similar en junio.

La Luna sideral

En su órbita de 27 días de giro en torno a la Tierra, la Luna pasa ante las doce regiones del zodíaco transmitiendo fuerzas a la Tierra, que se expresan a través de los cuatro elementos clásicos: tierra, agua, aire y calor. Estas fuerzas activan la "fructificación" en los cuatro órganos de la planta: raíz, hoja, flor, fruto. Podemos favorecer el desarrollo y la salud de la planta eligiendo el periodo de siembra, de labores de cultivo y de recolección.
Estas fuerzas actúan de forma similar en la colmena. Las abejas en su colmena se aíslan del exterior, impermeabilizando todo con el propóleo, una especie de resina. Cuando abrimos la colmena para realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» entre las abejas. En este tumulto puede actuar un nuevo impulso cósmico, que orienta a las abejas hasta la próxima vez que se realice un trabajo en la colmena.
En esta tabla resumimos los resultados que hemos encontrado en experimentos con plantas, la apicultura y en las observaciones meteorológicas:

Constelación Zodiacal		*Elemento*	*Tendencia del clima*	*Órgano vegetal*	*Actividad apícola*
Piscis	♓	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Aries	♈	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Tauro	♉	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Géminis	♊	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Cáncer	♋	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Leo	♌	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Virgo	♍	Tierra	Fresco/frío	Raíz	Construcción panales
Libra	♎	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen
Escorpio	♏	Agua	Húmedo	Hoja	Preparación de miel
Sagitario	♐	Calor	Cálido	Fruto	Recolección de néctar
Capricornio	♑	Tierra	Fresco/frío	Raíz.	Construcción panales
Acuario	♒	Luz	Aireado/luminoso	Flor	Recolección de polen

La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. Este esquema básico puede alterarse de vez en cuando. Las oposiciones entre planetas, por ejemplo en días particulares, pueden modificar los impulsos y superponerlos, o hacer que a través de posiciones de "trígono" se active otro elemento diferente al que la Luna iba a transmitir ese día. También hay días en que la Luna ascendente o descendente llega a cortar la eclíptica (k l), dando generalmente efectos negativos, que aún pueden verse aumentados cuando dos planetas se encuentran en los puntos de corte de sus órbitas, en los llamados "nodos". En casos así hay eclipses y el planeta que está más cerca de la Tierra interrumpe o cambia el efecto del que está más lejos. Son períodos muy poco indicados para sembrar y cosechar.

El Zodiaco

Esta ilustración muestra en el círculo exterior las dimensiones de las constelaciones visibles en el cielo, con el correspondiente momento de la entrada del Sol ante la siguiente constelación. Los tránsitos de una constelación a otra difieren en un día, en parte debido a los días bisiestos. El círculo interior tiene la antigua partición astrológica de 30° en doce casas iguales.

El zodiaco es la franja de constelaciones ante la que pasan la Luna y los planetas. A su paso se activan fuerzas que actúan sobre la Tierra.

Los Trígonos △



Los trígonos son posiciones de 120º. La Luna pasa cada nueve días por el mismo trígono de fuerzas, por lo que mediante las cavas o pulverizaciones de sílice rítmicas, llevadas a cabo estando en el mismo tipo de trígono que el del día de la siembra, estimulamos ese impulso.

Clasificación de las plantas para siembra, los cuidados y la cosecha

Las plantas de cultivo se desarrollan engrosando ciertos órganos para dar un «fruto». Según nuestros ensayos, podemos clasificar las plantas en los cuatro grupos siguientes:

Las plantas de raíz en los días de raíz.

La formación del fruto en el ámbito de la raíz lo encontramos en el rabanito, rábano, colinabo, remolacha de mesa y la azucarera, apio, zanahoria, escorzonera etc. También incluimos en este grupo a la patata y a la cebolla. Si trabajamos estos cultivos en los días de raíz, obtendremos buenas cosechas con gran capacidad de conservación.

Las plantas de hoja en los días de hoja.

La formación del fruto en el ámbito de la hoja lo tenemos en casi todo tipo de coles, lechuga, espinaca, hierba de los canónigos, escarola, perejil, hierbas aromáticas de las que se utilizan las hojas, y plantas forrajeras. El espárrago crece mejor plantado y cultivado estos días. Son días favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, pero no para su recolección con el fin de guardarlas, ni para hierbas destinadas a infusiones. Tanto para estos trabajos como para la recolección de la col para elaborar col fermentada, recomendamos los días de flor y los días de fruto.

Las plantas de flor en los días de flor.

Las plantas de flor son todas las que dan su "fruto" en el ámbito de la flor y que se pretende que pasen un largo periodo de floración: flores, bulbos de flores, plantas para la elaboración de los preparados biodinámicos, algunas plantas medicinales y el brócoli. Estos días son propicios para la siembra y los trabajos de cultivo de todas las plantas ornamentales de flor, para cavar y aplicar sílice en las plantas de semillas oleaginosas como lino, colza, girasol, etc. Si se corta las flores para ponerlas en floreros, su aroma es más intenso, se mantienen más tiempo y la planta de la que proceden echará muchos renuevos. Las flores secas cortadas mantienen la plena viveza de sus colores, mientras las cortadas en otros días pierden pronto su color. Va muy bien recoger las semillas oleaginosas en tales días. El brócoli también se incluye en este grupo de plantas.

Las plantas de fruto y los días de fruto.

Las plantas de fruto son las que reaccionan de forma positiva a los días de fruto, cuando se siembran, se cultivan y recolectan. Son plantas que se engrosan en el ámbito de la semilla, como las legumbres, judía, guisante, lenteja, soja, maíz, tomate, pepino, calabaza, calabacín, cereales como el arroz, etc. Los cereales de verano e invierno y las semillas oleaginosas dan también los mejores resultados. Se obtiene la mejor extracción de aceite realizando los trabajos de cultivo durante los días de Fruto. Va muy bien plantar los cultivos para semilla en los días de Leo (♌). Las plantas de fruto se recolectan preferentemente en los días de fruto, ya que ayudan a que los frutos mantengan su calidad si se les guarda y fomentan la fuerza de regeneración. Para la fruta destinada a ser guardada, es recomendable además el período de luna ascendente (🌔).

Elaboración del pan de centeno

Ya sea con levadura o con otro producto auxiliar de panificación, podemos trabajar bien la harina gruesa o fina de trigo, cebada, avena, maíz, arroz y mijo. Para el centeno hemos de utilizar otros métodos. Unos investigadores finlandeses han descubierto además que las personas con tendencia al cáncer se curan consumiendo pan de centeno. El centeno necesita una temperatura ambiente de 28º C. Fue sorprendente como la alta temperatura ambiente provocó que las cinco etapas para la elaboración del pan de centeno se realizaran en tan solo cuatro horas. Está claro, que para que suba el fermento se necesita la temperatura adecuada, no solo depende de la harina de granos bien formados.

La elaboración de la leche

Para una buena producción de mantequilla y queso es recomendable evitar los periodos que se indican en el calendario con -------. La mayor cantidad de mantequilla se obtiene de la leche que se ha ordeñado en días de Calor o Fruto y en los días con tendencia a tormenta (Ta). Los días de perigeo son casi siempre desfavorables para la elaboración de la leche y el yogur. Los derivados lácteos de estos días se estropean fácilmente, por lo cual conviene preparar un día antes el doble de cantidad. A la leche le van bien los días de Luz y de Calor y no los días Hoja-Agua

Época de tala para maderas especiales en 2016

FECHA	TRÍGONO	MADERAS
13-01-2016	♀△♁	Arce, haya, castaño, nogal, picea, pino, tuya, cedro, ciruelo
15-01-2016	☉△♃	Aliso, alerce, tilo, olmo, betula, peral, falsa acacia, sauce, arce, manzano, haya
3-07-2016	☉△♆	Fresno, picea, avellano, abeto, cedro
11-07-2016	☿△♆	Aliso, alerce, tilo, olmo
1-08-2016	☉△♄	Betula, peral, alerce, tilo, acacias, sauces
11-08-2016	☿△♇	Fresno, picea, avellano, abeto
18-08-2016	♀△♇	Peral, tilo, picea, avellano, abeto, cedro
30-10-2016	☿△♆	Aliso, alerce, tilo, olmo
01-11-2016	☉△♆	Fresno, picea, avellano, abeto, cedro
05-11-2016	♀△♁	Betula, peral, alerce, tilo, acacias, sauces
26-11-2016	☿△♁	Aliso, alerce, tilo, olmo
12-12-2016	☉△♁	Fresno, abetos, avellanos, cedro, pícea, ojaranzo
25-12-2016	♀△♃ ♄△♁	Betula, peral, alerce, tilo, acacias, sauces, arce, manzano, haya, castaño, nogal, pinos, olmo

Por maderas especiales hay que entender aquellas que van a utilizarse para la construcción de objetos artísticos y en particular de instrumentos musicales.
En la luna descendente la savia se retira hacia abajo, hacia la raíz, la madera está más prieta y con menos humedad, por lo que madura mejor al secarse y es más difícil sufrir ataques de parásitos como la carcoma, si además es día de Trígono o la Luna pasa por una constelación de Luz, el sonido de los instrumentos musicales fabricados con esta madera es más nítido. En cuanto a la construcción de muebles y de otros materiales de construcción, estos factores también deberían ser tenidos en consideración.
Si alguna madera no está mencionada, utilizar las fechas de la época de plantación de noviembre o diciembre en días Flor. Si con estas fechas no tenemos suficiente tiempo para las talas, podemos coger la sierra y cortar el cambium de los árboles en un día conveniente, cortando así la subida de savia. De esta podemos talar en cualquier otro momento. Si queremos una buena calidad de madera, podemos seguir los consejos de los viejos leñadores. Ellos eran conscientes de que en cada árbol vivía un espíritu que se encargaba del árbol. El leñador comunicaba al espíritu antes de talar, que su árbol iba a caer, y si lo sabía, le explicaba también para que iba a utilizarse la madera. El espíritu podía separarse y asegurar la mejor calidad de la madera.

Enero 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Vi ♍	☉ - ♐	Tierra	Raíz desde 2h **Trasplante**	
2. Sa ♍	Ag13	Tierra	Raíz hasta 3h, Flor 4-16h, Raíz dsd 17	☉♀♂ Td DC
2. Semana				
3. Do ♍		Tierra	Raíz hasta 2h ----------	♀♀♃ DC
4. Lu ♎ 16	☿♌3	Tierra/Luz	---------- Flor desde 16h	Td
5. Ma ♎		Luz	Flor 12ªNoche Santa	♀☐♆ Td To
6. Mi ♏ 4 **Día de Reyes**		Luz/Agua	Flor hasta 3h, Hoja desde 4h	☉☌ ♇4 Td E
7. Ju ♏		Agua	Hoja	☉☐⚷ Td Ta
8. Vi ♐ 14	♃R ♡19	Agua/Calor	Hoja hst.13h, Fruto dsd 14h. **Fin trasplante 19h**	Td
9. Sa ♐		Calor	Fruto	♂♀ ♇ DC E
3. Semana				
10. Do ♑ 19	●3	Calor/Tierra	Fruto hasta 18h. Raíz desde 19h	Td
11. Lu ♑		Tierra	Raíz	Td
12. Ma ♒ 20	☿☐♐	Tierra/Luz	Raíz hst 17h. Hoja desde 18h	
13. Mi ♒	△ △	Luz	Hoja hst 4h, Flor 5-11h, Fruto dsd 12h	♀△⚷ Td To
14. Ju ♓ 14	♉17	Luz/Agua	Fruto hst. 3h, Flor 4-13h, ------ ☉☌☿	☉△♃ Td To
15. Vi ♓	Pg3 △	Agua	---------- Hoja desde 16h	
16. Sa ♓		Agua/Calor	Hoja	
4. Semana				
17. Do ♈ 7		Calor	Hoja hasta 6h, Fruto desde 7h	♀♀ ♂ Td DC
18. Lu ♈		Calor	Fruto hasta 23h	Td
19. Ma ♉ 00	☉ - ♑	Tierra	Raíz desde 00h	♀☍♃
20. Mi ♉		Tierra	Raíz	☿☐⚷ ♀♀ ♆ Td To Ta DC
21. Ju ♊ 14	♏18 ♂♎	Tierra/Luz	Raíz hasta 13h, Flor desde 14h ***In.Traspl. 19h**	♃♌
22. Vi ♊		Luz	Flor	☿☌♇ Td To
23. Sa ♋ 16	♀♐	Luz/Agua	Flor hasta 15h, Hoja dsd 16h	
5. Semana				
24. Do ♋	☺3	Agua	Hoja	
25. Lu ♌ 7	☿D	Agua/Calor	Hoja hasta 6h, Fruto desde 7h	☉♀⚷ Ta DC
26. Ma ♌		Calor	Fruto	
27. Mi ♌		Calor	Fruto hasta 20h ----------	
28. Ju ♍ 4	♌1	Calor/Tierra	--------- Raíz desde 5h	Td
29. Vi ♍		Tierra	Raíz hasta 24h	
30. Sa ♍	Ag10	Tierra	Flor 1-13h, Raíz desde 14h	☿☌♇
6. Semana				
31. Do ♍		Tierra	Raíz hasta 24h	

Época de trasplante

Los símbolos del zodiaco se refieren a las constelaciones astronómicas visibles, no a la muestra astrológica del zodiaco (Ver pág. 28). Válido para todos los meses del año.

ENERO 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♑	♏	♍	♌	♏	♓	♒	♐
10. ♐	22. ♐	21. ♎					

Época de trasplante:
del 01.01 a las 00h hasta 08.01 a las 19h
del 21.01 a las 15h hasta 31.01 a las 24h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 08.01 a las 20h hasta el 21.01 a las 17h

En época de trasplante podemos **podar viñedos, árboles frutales y setos**. Escogemos preferentemente los días de flor y fruto.

Cosecha de frutos y sus semillas en el sur del planeta: del 25.01 a las 7h hasta el 27.01 a las 20h y el resto de los días de fruto.
Cosecha de flores y sus semillas en el sur del planeta: en los días de flor.
Cosecha de hojas y sus semillas en el sur del planeta: en dias hoja.
Cosecha de frutos de raíz y sus semillas en el sur del planeta: en días de raíz.
Regulación de caracoles: del 23.01 a las 16h hasta el 25.01 a las 5h.

Incinerar aves o pieles de parásitos de sangre roja:
Del 19.01 a las 00 horas hasta el 21.01 a las 13 horas. Este año disponemos de tiempo suficiente para tener una buena brasa de leña de madera. Cuando la tengamos preparada (no usar madera de barbacoa) poner las plumas secadas al aire libre o las pieles, encima del fuego. Después que se haya enfriado la ceniza, potenciarla durante una hora en el mortero. De esta manera aumentamos la eficacidad y podemos usar esta ceniza para ser potenciada. **¡El 21.01 a las 13 horas tenemos que haber acabado todo el proceso de incineración y a ser posible la trituración!**

Febrero 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Lu ♎ 1	☉ - ♑	Tierra/Luz	Trasplante	Flor desde 1h **Trasplante**	☉☐⚷ Td Ta
2. Ma ♏ 12		Luz/Agua		Flor hasta 12h, Hoja desde 13h	
3. Mi ♏		Agua		Hoja	
4. Ju ♏		Agua		Hoja hasta 24h	
5. Vi ♐ 1	☽6	Agua/Calor		Fruto desde 1h **#Fin trasplante 5h**	Td
6. Sa ♐	☿△♃	Calor		Fruto de 8 a 23h Muy favorable	♀☐⚷ ♀☌♇ Td Ta
7. Semana					
7. Do ♑ 5		Calor/Tierra		Fruto h.4h, Raíz desde 5h	Td
8. Lu ♑	●16	Tierra		Raíz	Td To
9. Ma ♒ 4		Tierra/Luz		Raíz hasta 3h, Flor desde 4h	☿☐⚷ Td
10. Mi ♓ 22	♋22 ☿△♃	Luz/Agua		Flor h.1h, Fruto de 2 a 13h ----------	
11. Ju ♓	Pg4 ☿♋	Agua		--------- Hoja desde 23h	Td E
12. Vi ♓		Agua		Hoja	Td To
13. Sa ♈ 12	☿-♑	Agua/Calor		Hoja hst.11h, Fruto d.12 a 15h -------	
8. Semana					
14. Do ♈	♀♋	Calor		----------	Td
15. Lu ♉ 5		Calor/Tierra		--------- Raíz desde 12h	
16. Ma ♉	☉-♒ ☿-♑	Tierra		Raíz	☉☐♄ Td To DC
17. Mi ♊ 20		Tierra/Luz		Raíz hasta 19h, Flor desde 20h	☿☐♂ Td DC
18. Ju ♊	♘1	Luz		Flor ***In. trasplante 1h**	☿☐⚷ Td Ta DC
19. Vi ♋ 23		Luz/Agua		Flor hasta 22h, Hoja desde 23h	Td To Ta
20. Sa ♋		Agua		Hoja	Td E
9. Semana					
21. Do ♌ 15		Agua/Calor	Época de trasplante	Hoja hasta 14h, Fruto desde 15h	Td Ta DC
22. Lu ♌	☺20	Calor		Fruto	♀☐⚷ Td Ta DC
23. Ma ♌		Calor		Fruto	♀☐♂
24. Mi ♍ 11	♌7	Calor/Tierra		Fruto hasta 3h, --- Raíz desde 11h	DC Td
25. Ju ♍		Tierra		Raíz	
26. Vi ♍		Tierra		Raíz hasta 19h, Flor desde 20h	
27. Sa ♍	Ag5	Tierra		Flor hasta 8h, Raíz desde 9h	
10. Semana					
28. Do ♎ 8	♂-♏	Tierra/Luz		Raíz hasta 7h, Flor desde 8h	☉☌♅ DC Td
29. Lu ♏ 21		Luz/Agua		Flor hasta 20h, Hoja desde 21h	

Los símbolos del zodiaco se refieren a las constelaciones astronómicas visibles, no a la muestra astrológica del zodiaco (Ver pág. 28). Válido para todos los meses del año.

FEBRERO 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♐	♐	♎	♌	♏	♓	♒	♐
12.♑	16.♑	29.♏					

Época de trasplante:
del 01.02 a las 00h hasta 05.02 a las 5h
del 18.02 a la 1h hasta el 29.02 a las 24h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 05.02 a las 7h hasta el 17.02 a las 23h

Este mes el sol se mueve el día 15 del frio capricornio al luminoso acuario. Las fuerzas de luz serán apoyadas por Neptuno ante una constelación de luz, y por Marte ante libra. Esto significa que puede hacer frío. En la primera mitad del mes, Mercurio y Venus están ante sagitario y favorecen el calor, Júpiter los apoya desde leo. Saturno ante escorpio y Urano ante piscis se encargan del elemento agua.
Este mes es favorable y en época de trasplante podemos **podar viñedos, árboles frutales y setos**: Escogemos preferentemente los días de flor y fruto. **Abstenerse los días indicados con línea discontinua.**

Cosecha de frutos y sus semillas en el sur del planeta: del 06.02 de 8h a 23h y el 21.02 a las 15h hasta el 24.02 a las 2h y el resto de **días de fruto.**
Cosecha de flores y sus semillas en el sur del planeta: **Los días de flor**
Regulación de caracoles: del 19.02 a las 23h hasta el 21.02 a las 14h.

Cortar cañas de sauce para vallas y setos: en días de flor fuera de la época de plantación. Guardar en lugar caliente en la época de trasplante para que no segreguen savia.

Marzo 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Ma ♏	☉ - ♒	Agua	Hoja Trasplante	Td E
2. Mi ♏		Agua	Hoja	Td Ta
3. Ju ♐ 9	☾16	Agua/Calor	Hoja hasta 8h, Fruto desde 9h	#Fin 14h trasplante
4. Vi ♐		Calor	Fruto	☿Q♄ DC
5. Sa ♑ 15		Calor/Tierra	Fruto hasta 14h, Raíz desde 15h	Td
11. Semana				
6. Do ♑		Tierra	Raíz	Td E
7. Lu ♒ 15		Tierra/Luz	Raíz hasta 14h, Flor desde 15h	♂Q♃ Td Ta DC
8. Ma ♒		Luz	Flor hasta 24h	☉☍♃
9. Mi ♓ 8	●3 ☉☌♉8	Luz/Agua	----------Hoja de 12 a 19h	
10. Ju ♓	Pg8 ♀-♒	Agua	---------- Hoja desde 21h	♃-☊
11. Vi ♈ 20	☉ - ♓	Agua/Calor	Hoja hasta 19h, Fruto desde 20h	☿☌♆ ♀Q♄ DC
12. Sa ♈		Calor	Fruto	Td E Ta
12. Semana				
13. Do ♉ 12		Calor/Tierra	Fruto hasta 11h, Raíz desde 12h	
14. Lu ♉		Tierra	Raíz	Td E
15. Ma ♉		Tierra	Raíz	☿☍♃Td Ta
16. Mi ♊ 2	♋6 ♃△☋	Tierra/Luz	Raíz hasta 1h, Flor 2-8h, Fruto dsd 9h *In. traspl.7h	
17. Ju ♊	☿-♓	Luz	Fruto hasta 3h, Flor desde 4h	
18. Vi ♋ 5		Luz/Agua	Flor hasta 4h, Hoja desde 5h	Td Ta
19. Sa ♌ 21		Agua/Calor	Hoja hasta 20h, Fruto desde 21h	☉Q☋ E DC
13. Semana				
20. Do ♌		Calor	Fruto	♀☌♆
21. Lu ♌		Calor	Fruto	☿Q☋ E DC
22. Ma ♍ 18	♌14	Calor/Tierra	Fruto h.9h, ------ Raíz dsd 18h	
23. Mi ♍	♎13 ♎☍	Tierra	Raíz hasta 9h ------- Raíz dsd 18h	☉☌☿ Td Ta
24. Ju ♍	☿△♂	Tierra	Raíz hasta 13h, Hoja de 14 a 24h	
25. Vi ♍	Ag15-**V.Santo**	Tierra	----------	♄-R ♀☍♃Td
26. Sa ♎ 15	☉△♂	Tierra/Luz	----------	
14. Semana	**Domingo**			
27. Do ♎	**Resurrección**	Luz	Flor desde 1h	
28. Lu ♏ 4		Luz/Agua	Flor hasta 3h, Hoja desde 4h	
29. Ma ♏		Agua	Hoja desde 17h **Muy favorable**	
30. Mi ♐ 18	☿△♄ ♀-♓	Calor	Hoja hst.8h **Favorable,** Fruto dsd 18h	☿□☋ Td To E
31. Ju ♐	☾1	Calor	Fruto hst.2h ------- #Fin 00h trasplante	☿☌⚷

Época de Trasplante

MARZO 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♑	♑	♏	♌	♏	♓	♒	♐
3. ♒	9. ♒						
17. ♓	30. ♓						

Época de trasplante:
del 01.03 a las 00h hasta 03.03 a las 14h
del 16.03 a las 20h hasta 30.03 a las 24h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 03.03 a las 18h hasta el 16.03 a las 4h
el 31.03 de 2 a 24h

El 11 de marzo el sol pasa ante piscis. Mercurio y Urano están también ante piscis, Marte y Saturno ante escorpio, esto nos indica una posible abundancia de precipitaciones. Los tres trígonos del mes apoyan el elemento agua. Plutón y Júpiter transmiten calor, mientas que Neptuno, Venus y Mercurio influyen con luz desde acuario.

Cosecha de flores y sus semillas en el sur del planeta: del 16.03 a las 2h hasta el 18.03 a las 4h. Muy favorable también en los días flor.
Cosecha de frutos de hoja y semillas en el sur del planeta: del 28.03 a las 4h hasta el 30.03 a las 17h. Muy favorable también en los días de hoja.
Cosecha de frutos y sus semillas en el sur del planeta: del 16.03 a las 9h hasta el 17.03 a las 3h. Muy favorable también en los días de fruto.
Cosecha de frutos de raíz y sus semillas en el sur del planeta: en los días de raíz.

Plantar esquejes de sauce para producir polen:
Del 16.03 a las 2h hasta el 18.03 a las 4h
Para la recolección de miel: Del 19.03 a las 21h hasta el 22.03 a las 9h.
Regulación de caracoles: del 18.03 a las 5h hasta el día 19.03 a las 20h.
Cortar injertos: Fuera de la época de trasplante. Tener en cuenta los tipos de frutos y abstenerse los días con línea discontinua.

Abril 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Vi ♐	☉-♓ ☿♌	Calor	--------- Fruto dsd 16h	Td
2. Sa ♑ 2		Calor/Tierra	Fruto hasta 1h, Raíz desde 2h	Td
15. Semana				
3. Do ♑		Tierra	Raíz	Td To
4. Lu ♒ 2		Tierra/Luz	Raíz hasta 1h, Flor desde 2h	
5. Ma ♓ 20	♉20 ☉△♄	Luz/Agua	Flor hasta 17h ----------	♀Q ⚭ E DC
6. Mi ♓	♀●	Agua	Hoja de 00 a 7h y desde 13h	☉□⚭ Td To E
7. Ju ♓	●14 Pg20	Agua	Hoja hasta 7h ----------	Td
8. Vi ♈ 8		Agua/Calor	Fruto desde 9h	
9. Sa ♉ 22		Calor/Tierra	Fruto hasta 21h, Raíz desde 22h	☉♂⚷
16. Semana				
10. Do ♉		Tierra	Raíz	Td Ta
11. Lu ♉		Tierra	Raíz	Td
12. Ma ♊ 10	♒15 ♀△♂	Tierra/Luz	Raíz h.9h, Hoja desde 10h ***In. trasplante 16h**	
13. Mi ♊		Luz	Hoja hasta 1h,Flor desde 2h	Td
14. Ju ♋ 12	☿△♃	Luz/Agua	Flor hasta 7h, Fruto de 8 a 24h	
15. Vi ♋		Agua	Hoja desde 1h	Td To
16. Sa ♌ 4		Agua/Calor	Hoja hasta 3h, Fruto desde 4h	
17. Semana				
17. Do ♌	☿△⚭	Calor	Fruto hasta 15h. **Especialmente favorable**	
18. Lu ♌	♌20 ♀△♄	Calor	Fruto h.9h, Hoja de 10 a 15h ------	Td
19. Ma ♍ 1	☉ - ♈	Calor/Tierra	Raíz dsd 1h	♀□⚭ Td To E
20. Mi ♍		Tierra	Raíz	Td
21. Ju ♍	Ag18	Tierra	Raíz hasta 9h, Flor 10-21h, Raíz dsd 22h	Td
22. Vi ♎ 22	☺8	Tierra/Luz	Raíz hasta 21h, Flor dsd 22h	♀♂⚷ Td
23. Sa ♎		Luz	Flor	
18. Semana				
24. Do ♏ 10		Luz/Agua	Flor hasta 9h, Hoja desde 10h	Td
25. Lu ♏		Agua	Hoja	
26. Ma ♏	☿-♉	Agua	Hoja hasta 24h	☿Q♆ To DC
27. Mi ♐ 1	☽7	Calor	Fruto de 1 a 10h ------- **#Fin 6h trasplante**	Td
28. Ju ♐	♂♉ ☿R	Calor	----------	Td
29. Vi ♑ 9	♀-♈	Calor/Tierra	--------- Raíz desde 11h	Td
30. Sa ♑		Tierra	Raíz	☿Q♆ Td To DC

Época de trasplante

ABRIL 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♓	♓	♏	♌	♏	♓	♒	♐
5. ♈	29. ♈						

Época de trasplante:
del 12.04 a las 16h hasta el 27.04 a las 6h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.04 a las 00h hasta el 12.04 a la 14h
del 27.04 a las 8h hasta el 30.04 a las 24h

La primera mitad de mes está marcada por muchas constelaciones de agua y tres trígonos de agua, por lo que podemos esperar un clima bastante húmedo.
En la segunda mitad rigen los planetas de calor que no serán eclipsados seriamente por ninguna constelación de tierra-agua.
La tierra empieza a calentarse el día 5.
Para los agricultores biodinámicos: podemos extraer los preparados de la tierra.
Abstenerse de los días indicados con línea discontinua.

Cosecha de frutos y sus semillas en el sur del planeta: del 01.04 a las 00h hasta el 12.04 a las 14h y del 27.04 a las 8h hasta el 30.04 a las 24h.
Cosecha de frutos de raíz y sus semillas en el sur del planeta: en los días de raíz.
Abstenerse los días indicados con línea discontinua.
Cosecha de flores y sus semillas en el sur del planeta: en los días de flor.
Evitar otros dias.
Cosechas de frutos de hoja y sus semillas en el sur del planeta: en días de hoja.

Trabajos de Injertos: arbustos de fruto, en días de fruto fuera de la época de trasplante.
Arbustos de flor: En días flor, fuera de la época de trasplante.
Regulación de caracoles: del 14.04 a las 12h hasta el 16.04 a las 3h.

Mayo 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
19. Semana				
1. Do ♒	☉ - ♈	Tierra/Luz	Raíz hasta 10h, Flor desde 11h	Td
2. Lu ♒		Luz	Flor hasta 23h,	
3. Ma ♓ 6	♋4 ☉△♃	Luz/Agua	------ Fruto de 8 a 13h, Hoja dsd 14h	
4. Mi ♓		Agua	Hoja	
5. Ju ♈ 19	**Ascensión**	Agua/Calor	Hoja hst 17h ----------	Td Ta
6. Vi ♈	●22 Pg6	Calor	---------- Fruto desde 19h	
7. Sa ♉ 9	☉△♇	Calor/Tierra	Fruto hasta 18h, Raíz desde 19h	Td
20. Semana				
8. Do ♉		Tierra	Raíz hasta 9h ----------	
9. Lu ♊ 19	☿♋ ♃D	Terra/Luz	--------- Flor dsd.22h	☉☌☿
10. Ma ♊	♒00 ♀△♃	Luz	Flor hasta 13h, Fruto dsd 14h ***Inicio 1h traspl.**	
11. Mi ♋ 20		Luz/Agua	Flor de 1 a 19h, Hoja desde 20h	
12. Ju ♋		Agua	Hoja hasta 18h, Fruto desde 19h	
13. Vi ♌ 10	☿△♇	Agua/Calor	Fruto y dsd 10h **Especialmente favorable**	☿☌♀
14. Sa ♌	☿△♇ ☉-♉	Calor	Fruto **Especialmente favorable**	To DC
21. Semana				
15. Do ♌	**Pentecostés** ♌23	Calor	Fruto hasta 18h ----------	
16. Lu ♍ 7		Calor/Tierra	Fruto de 3 a 6h, Raíz desde 7h	
17. Ma ♍		Tierra	Raíz	
18. Mi ♍		Tierra	Raíz hasta 14h, Flor desde 15h	
19. Ju ♍	Ag00 ☉-♉	Tierra	Flor hasta 3h, Raíz desde 4h	♀Q♆ Td To DC Ta
20. Vi ♎ 4		Tierra/Luz	Raíz hasta 3h, Flor desde 4h	
21. Sa ♏ 16	☺24	Luz/Agua	Flor hasta 15h, Hoja desde 16h	Td E
22. Semana				
22. Do ♏	☿D	Agua	Hoja	☉☍♂ Td E
23. Lu ♏		Agua	Hoja	Td Ta
24. Ma ♐ 5	☾14	Agua/Calor	Hoja hasta 4h, Fruto desde 5h **# Fin traspl. 13h**	
25. Mi ♐		Calor	Fruto	♀☍♂
26. Ju ♑ 14		Calor/Tierra	Fruto hasta 13h, Raíz desde 14h	Td E
27. Vi ♑		Tierra	Raíz	
28. Sa ♒ 17		Tierra/Luz	Raíz hasta 16h, Flor desde 17h	Td Ta
23. Semana				
29. Do ♒		Luz	Flor	
30. Lu ♓ 13	♋7	Luz/Agua	Flor hasta 2h, Hoja 13-17h Fruto dsd 18h	Td Ta
31. Ma ♓	☿△♇	Agua	Fruto hasta 8h, Hoja desde 9h	Td Ta

Época de trasplante

MAYO 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♈	♈ 19. ♉	♏	♌	♏	♓	♒	♐

Época de trasplante:
del 10.05 a la 1h hasta el día 24.05 a las 13h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.05 a las 00h hasta el 09.05 a las 23h
del 24.05 a las 15h hasta el 31.05 a las 24h

En este mes dominan seis trígonos de calor, sobre todo en la primera mitad de mes. El sol se encuentra ante aries, le acompañan Mercurio y Venus. Júpiter ante Leo y Plutón ante sagitario apoyan las fuerzas de calor. El sol se mueve de Aries a Tauro. A mediados de mes le ayuda Venus, propiciando noches más frescas. Neptuno apoya desde acuario.

Patatas de mesa: en días de raíz.
Patatas destinadas para la siembra 2017:
del día 06.05 a las 19h hasta el 07.05 a las 18h
Poda de setos: en días de flor.

Inicio de la cría de reinas en el apiario (traslarve, otros métodos de multiplicación sin traslarve): del día 09.05 a las 22h hasta el 11.05 a las 19h. Son días muy favorables. También en días de flor.

Moscas de establo: capturar con atrapamoscas en días flor e incinerarlas en el establo.
Varroa, grillo topo o alacrán cebollero: del 21.05 a las 16h hasta el 24.05 a las 4h

Junio 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Mi ♓	☉ - ♉	Agua	Hoja	Td E
2. Ju ♈ 5		Agua/Calor	Hoja hst 4h Fruto de 5 a 24h	☉□♆ Td To E
3. Vi ♉ 19	Pg13 ☿●	Calor/Tierra	----------	♀□♆ ☉☍♄ Td To
4. Sa ♉		Tierra	Raíz desde 1h	♀☍♄ Td
24. Semana				
5. Do ♉	●5	Tierra	Raíz hasta 20h ----------	Td
6. Lu ♊ 5	☊11 ♂-♎	Tierra/Luz	---------- *In.Trasplante 12h	☉☌♀
7. Ma ♊	♀☊	Luz	--------- Flor desde 17h	♂Q♃ DC
8. Mi ♋ 5	☿ - ♉	Luz/Agua	Flor hasta 4h, Hoja desde 5h	☿Q♆ To DC
9. Ju ♌ 19		Agua/Calor	Hoja hasta 18h, Fruto desde 19h	☿☍♂
10. Vi ♌		Calor	Fruto	
11. Sa ♌		Calor	Fruto hasta 20h ---------	
25. Semana				
12. Do ♍ 14	☊1	Calor/Tierra	------ Fruto de 5 a 13h, Raíz desde 14h	Td Ta
13. Lu ♍		Tierra	Raíz	
14. Ma ♍		Tierra	Raíz	Td E
15. Mi ♍	Ag14	Tierra	Raíz hasta 4h, Flor de 5 a 17h, Raíz desde 18h	
16. Ju ♎ 11		Tierra/Luz	Raíz hasta 10h, Flor dsd 11h	
17. Vi ♏ 23	♀-♊	Luz/Agua	Flor desde 22h, Hoja desde 23h	Td
18. Sa ♏		Agua	Hoja	♄□♆Td To Ta
26. Semana				
19. Do ♏		Agua	Hoja	Td E
20. Lu ♐ 12	☉-♊ ☾21	Agua/Calor	Hoja hst 11h Fruto dsd 12h #Fin.20h☺13	☿☍♄Td ToDC
21. Ma ♐		Calor	Fruto	♀Q♃
22. Mi ♑ 20		Calor/Tierra	Fruto hasta 19h, Raíz desde 20h	♀Q♁ Ta DC
23. Ju ♑		Tierra	Raíz	Td
24. Vi ♒ 23		Tierra/Luz	Raíz hasta 22h, Flor desde 23h	Td
25. Sa ♒		Luz	Flor hasta 23h	☉Q♃ DC
27. Semana				
26. Do ♓19	♉8 ♃△♇ ♆●	Luz/Agua	Fruto de 12 a 18h, Hoja desde 19h	
27. Lu ♓	♀△♆	Agua	Hoja hasta 2h ----------	Ta DC
28. Ma ♓	☿☊	Agua	---------- Hoja desde 16h	
29. Mi ♈ 12		Agua/Calor	Hoja hasta 11h, Fruto desde 12h	Td DC
30. Ju ♈	☿-♊	Calor	Fruto hasta 20h, ----------	

Epoca de Trasplante

JUNIO 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♈	♉	♏	♌	♏	♓	♒	♐
7. ♉	17. ♊	3. ♎					
29. ♊							

Época de trasplante:
del 06.06 a las 12h hasta 20.06 a las 20h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.06 a las 00h hasta el 06.06 a las 10h
del 20.06 a las 22h hasta el 30.06 a las 24h

El Sol pasa del frío tauro al luminoso géminis. Apoyan las fuerzas de luz, Marte ante aries, Neptuno ante acuario y Venus ante géminis. Puede que haya un clima más bien fresco, sobre todo por las noches.
Saturno y Urano trabajan contra las fuerzas de luz desde constelaciones de agua. Plutón y Júpiter siguen apoyando con calor y podemos sorprendernos de quien va a imponer el clima.

Poda de setos: en días de flor.

Cría de reinas de abejas: en días de flor.
Moscas de establo:
capturar con atrapamoscas e incinerar en el establo en días de flor.

Varroa, grillo topo o alacrán cebollero: del 17.06 a las 23h hasta el 20.06 a las 11h
Regulación de saltamontes: del 06.06 a las 5h hasta el 08.06 a las 4h.

Insectos daniños, gorgojo del trigo, escarabajo de la patata y varroa: del 03.06 a las 19h hasta el 06.06 a las 4h.

Julio 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Vi ♉ 4	☉-♊ Pg9	Calor/Tierra		--------- Raíz desde 22h	Td
2. Sa ♉		Tierra		Raíz	Ta DC
28. Semana					
3. Do ♊ 15	♒22 ☉△♆	Tierra/Luz		Raíz hasta 2h, Flor desde 3h ***In.23h traspl.**	Td
4. Lu ♊	●13	Luz		Flor	
5. Ma ♋ 15	☿△♆	Luz/Agua		Flor de 3 a 18h **Muy favorable** Hoja desde 19h	
6. Mi ♋	♀△♂	Agua		Hoja hasta 15h, Flor desde 16h	
7. Ju ♌ 4	♀□⚷	Agua/Calor		Flor hasta 3h, Fruto desde 4h ☉☌☿ ☿☌♇	Td Ta
8. Vi ♌		Calor		Fruto hasta 24h ☉☌♇	Td
9. Sa ♍ 22	♌4 ☿☌	Calor/Tierra		Fruto 8-10h----- Fruto 15-21h, Raíz dsd 22h	Td To Ta
29. Semana					
10. Do ♍		Tierra		Raíz hasta 17h Flor desde 18h	
11. Lu ♍	☿△♂	Tierra		Flor hasta 7h, Raíz 8-22h Flor desde 23h ☉□⚷	Td Ta
12. Ma ♍		Tierra		Raíz de 00 a 22h, Flor desde 23h	Td To
13. Mi ♎ 19	Ag8	Tierra/Luz		Flor hasta 11h, Raíz 12-18h, Flor desde 19h	
14. Ju ♎		Luz		Flor	
15. Vi ♏ 7		Luz/Agua		Flor hasta 6h, Hoja desde 7h	Td
16. Sa ♏		Agua		Hoja hasta 19h, Flor desde 20h ☉□⚷	Td To Ta
30. Semana					
17. Do ♐ 19	☉△♂	Agua/Calor		Flor hasta 9h, Hoja 10-18h, Fruto desde 19h	Td
18. Lu ♐	☽6	Calor		Fruto hasta 22h, Hoja desde 23h **#Fin traspl.5h**	Td To
19. Ma ♐	☿△♄	Calor		Hoja hasta 12h, Fruto desde 13h	
20. Mi ♑ 3	☉-♋ ☺1	Calor/Tierra		Fruto h.2h,Raíz 3-8h,Hoja 9-19h,Raíz d.20h ♀△♄	TdTo
21. Ju ♑		Tierra		Raíz	Td
22. Vi ♒ 5		Tierra/Luz		Raíz hasta 4h, Flor desde 5h	
23. Sa ♒	♉10 ♆☌	Luz		Flor hasta 4h,----- Flor de 14 a 24h	
31. Semana					
24. Do ♓ 1		Agua		Hoja desde 1h	Td
25. Lu ♓		Agua		Hoja	Td E
26. Ma ♈ 17		Agua/Calor		Hoja hasta 16h, Fruto desde 17h	
27. Mi ♈	Pg14 ♀-♌	Calor		Fruto hasta 2h ----------	
28. Ju ♉ 10		Calor/Tierra		Fruto 3-9h, Raíz desde 10h	Td To
29. Vi ♉	⚷R	Tierra		Raíz	Td E
30. Sa ♊ 23		Tierra/Luz		Raíz hasta 22h, Flor desde 23h	
32. Semana					
31. Do ♊	♒7	Luz		Flor	***Inicio 8h traspl.** Td E

Época de trasplante

JULIO 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♊	♊	♎	♌	♏	♓	♒	♐
12. ♋	10. ♋	27. ♏					
23. ♌	27. ♌						

Época de trasplante:
del 03.07 a las 23h hasta 18.07 a las 5h
el 31.07 de 9 a 24h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.07 a las 00h hasta el 03.07 a las 21h
del 18.07 a las 7h hasta el 31.07 a las 6h

En la primera mitad del mes, la calidad de las fuerzas de luz será intensa, no solo por el sol, sino también por Mercurio, Venus, Urano y Neptuno, además de los cinco trígonos de luz. El calor tan deseado en esta época viene de Júpiter, Mercurio, Venus y Plutón.

Poda de setos: en días de flor.

Regulación de plaga de saltamontes: del 03.07 a las 15h hasta el 05.07 a las 14h.

Moscas de establo: capturar con atrapamoscas e incinerar en días de flor en el establo. Abstenerse los días indicados con líneas discontinuas.

Regulación de caracoles: incinerar del 05.07 a las 15h hasta el 07.07 a las 3h. En días de flor por la mañana temprano pulverizar con preparado de sílice el terreno de las plantas de hoja.

Cosecha de flores y sus semillas: del 03.07 a las 3h hasta el 05.07 a las 18h. Son dias muy favorables, también los otros días Flor.

Cosecha de hojas y sus semillas: en días de Hoja.

Cosecha de frutos y sus semillas: del 07.07 a las 4h hasta el día 09.07 a las 21h. Abstenerse los días indicados con líneas discontinuas

Cosecha de frutos de raíz y sus semillas: los días de raíz.

Agosto 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Lu ♋ 23	☉-♋ ☉△♄	Luz/Agua	Flor hasta 16h, Hoja desde 17h **Trasplante**	
2. Ma ♋	●23	Agua	Hoja	
3. Mi ♌ 13		Agua/Calor	Hoja hasta 12h, Fruto desde 13h	
4. Ju ♌		Calor	Fruto hasta 8h ---------	Td E Ta
5. Vi ♌	☊10 ☿♉	Calor	--------- Fruto desde 22h	☿☍
6. Sa ♍ 7	♃☍	Calor/Tierra	Fruto hasta 2h, ---- Raíz desde 8h	Td E Ta
33. Semana				
7. Do ♍		Tierra	Raíz	Td
8. Lu ♍		Tierra	Raíz	
9. Ma ♍		Tierra	Raíz hasta 16h, Flor desde 17h	
10. Mi ♎ 3	Ag2	Tierra/Luz	Flor hasta 15h, Fruto desde 16h	Td
11. Ju ♏ 15	☉-☊ ☿△♇	Luz/Agua	Fruto hasta 5h, Flor 6-14h, Hoja desde 15h	
12. Vi ♏		Agua	Hoja	
13. Sa ♏	♄D	Agua	Hoja	Td E Ta
34. Semana				
14. Do ♐ 4	☾15	Agua/Calor	Hoja hasta 3h, Fruto desde 4h **#Fin Traspl.14h** ♀☌⚷	
15. Lu ♐		Calor	Fruto	
16. Lu ♑ 12		Calor/Tierra	Fruto hasta 11h, Raíz desde 12h	
17. Ma ♑		Tierra	Raíz hasta 21h, Fruto dsd 22h	
18. Mi ♒ 13	☺12 ♀△♇	Tierra/Luz	Fruto hst.8h, Raíz 9-12h, Flor dsd.13h	
19. Ju ♒	♉16 ☿-♏	Luz	Flor hasta 10h----- Flor desde 20h	
20. Vi ♓ 8		Luz/Agua	Flor hasta 7h, Hoja desde 8h	♂Q♃ Td DC Ta
35. Semana				
21. Do ♓		Agua	Hoja hasta 15h ---------	
22. Lu ♈ 23	Pg4 ☿☌♃	Agua/Calor	------- Hoja 17-22h, Fruto desde 23h	Td E
23. Ma ♈		Calor	Fruto	Td E Ta
24. Mi ♉ 15		Calor/Tierra	Fruto hasta 14h Raíz desde 15h	♂☌♄
25. Ju ♉		Tierra	Raíz	☿Q♄ DC
26. Vi ♉		Tierra	Raíz	♂□⚷ Td To
27. Sa ♊ 5	◠14	Tierra/Luz	Raíz hasta 4h, Flor desde 5h ***In. traspl. 15h**	
36. Semana				
28. Do ♊		Luz	Flor	♀☌♃ DC
29. Lu ♋ 6		Luz/Agua	Flor hasta 5h, Hoja desde 6h	♀Q♄
30. Ma ♌ 21	☿R	Agua/Calor	Hoja hasta 20h, Fruto desde 21h	☿☌♀
31. Mi ♌		Calor	Fruto	♀Q♂ DC

Época de trasplante

Trasplante

AGOSTO 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
☊	☊	♏	☊	♏	♓	♒	♐
19. ♍	27. ♍		9. ♍				

Época de trasplante:
del 01.08 a las 00h hasta el 14.08 a las 14h
del 27.08 a las 15h hasta el 31.08 a las 24h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 14.08 a las 16h hasta el 27.08 a las 13h

El sol pasa ante leo el día 10 de agosto y esperamos que sea apoyado por Plutón ante sagitario, Júpiter ante leo y Venus ante leo. Venus pasa luego ante Virgo, una constelación de frío. Marte intenta traer la deseada humedad con ayuda de Saturno y Urano. Neptuno sigue actuando con las fuerzas de luz desde acuario.
Recolectamos las semillas de cultivos de frutos y cereales para la siembra en días de fruto. Después de la cosecha sembrar rápidamente un cultivo alternativo, como altramuz, facelia, mostaza o camelia sativa.

Cosecha de frutos de hoja y sus semillas: del 01.08 a las 10h hasta el 03.08 a las 12h y también los otros días de hoja
Cosecha de frutos de flor y sus semillas: en días de flor.

Moscas de establo: Capturar con atrapamoscas e incinerar en el establo desde el 27.08 a las 5h hasta el 29.08 a las 5h. También es posible en otros días de flor.
Regulación de hormigas en edificios: Incinerar del 03.08 a las 13h hasta el 06.08 a las 2h. Abstenerse los días indicados con línea discontinua.

Septiembre 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Ju ♋	☉-♋ ☉☌ ●11	Calor	Época de Trasplante	Fruto h.7h---Fruto dsd.22h **Trasplante**	☊18 Td Ta
2. Vi ♍ 15	☉☍♆	Calor/Tierra		Fruto h.14h, Raíz 15 a 21h	☿☌♃ Td
3. Sa ♍	♃☌ ♀☌	Tierra		Raíz 3-11h, ----- Raíz desde 17h	☿Q♄ DC
37. Semana					
4. Do ♍		Tierra		Raíz	
5. Lu ♍		Tierra		Raíz	Td To
6. Ma ♎ 10	Ag21	Tierra/Luz		Raíz hasta 9h, Flor 10 a 21h **favorable**, Fruto d.22h	
7. Mi ♏ 23	☉△☋	Luz/Agua		Fruto h.11h, Flor 12-22h, Hoja dsd 23h	
8. Ju ♏		Agua		Hoja	
9. Vi ♏		Agua		Hoja	
10. Sa ♐ 13	☿-♋	Agua/Calor		Hoja h.12h, Fruto d.13h **#Fin trsp.23h**	♄❑♆ Td ToTa
38. Semana					
11. Do ♐	☽00	Calor		Fruto	♀❑☋ Td E
12. Lu ♑ 21		Calor/Tierra		Fruto h.20h, Raíz dsd 21h	Td To
13. Ma ♑		Tierra		Raíz	☉☌☿ Td
14. Mi ♒ 23		Tierra/Luz		Raíz hasta 22h, Flor desde 23h	
15. Ju ♒	♆☌	Luz		Flor hasta 19h ----------	
16. Vi ♓ 17	☉-♍ ☊2	Luz/Agua		Flor 6-16h, Hoja desde 17h	☺21 Td Ta
17. Sa ♓	♂△⚷	Agua		Hoja de 00 a 12h **Muy favorable**	Td
39. Semana					
18. Do ♓	Pg19	Agua		Hoja h. 6h----------	♀☍⚷
19. Lu ♈ 7		Agua/Calor		------ Fruto desde 8h	Td To
20. Ma ♉ 22		Calor/Tierra		Fruto	Td
21. Mi ♉	☿△☋	Tierra		Fruto hasta 7h, Raíz dsd 8h	⚷Q♄ DC
22. Ju ♉		Tierra		Raíz	
23. Vi ♊ 10	☊17 ☿△☋	Tierra/Luz		Raíz hasta 1h ----------	***In. trasplante 18h** Td
24. Sa ♊	☿☊	Luz		-------- Flor desde 15h	♂Q♆ To DC
40. Semana					
25. Do ♋ 12	♂-♐	Luz/Agua		Flor hst.9h ----------	
26. Lu ♋	♀♉ ♃☌	Agua		----------	♀Q☋ E DC
27. Ma ♋ 3		Agua/Calor		Fruto desde 6	Td Ta
28. Mi ♋		Calor		Fruto hasta 19h ----------	Td
29. Ju ♍ 22	☊00 ☿☌	Calor/Tierra		Fruto 4-9h, ----- Fruto 15-21h, Raíz d.22h	**San Miguel**
30. Vi ♍	♃☌	Tierra		Raíz hst.16h ----- Raíz desde 22h	

SEPTIEMBRE 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♍	♍	♏	♍	♏	♓	♒	♐
10. ♌		25. ♐					

Época de trasplante:
del 01.09 a las 00h hasta 10.09 a las 23h
del 23.09 a las 18h hasta 30.09 a las 24h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 11.09 a la 1h hasta el 23.09 a las 16h

El trígono del día 7, el Sol ante leo hasta el 16, Mercurio ante leo, Marte y Plutón ante sagitario auguran un clima cálido. Venus y Júpiter pasan ante Virgo y les sigue el sol el día 16, empezando así las noches frescas. Saturno y Urano ante constelaciones de agua fomentaran la formación de niebla. Solamente Neptuno ante acuario se encarga del elemento luz.
Para la **cosecha de fruta** recomendamos los días con la luna ante Aries o Sagitario. También puede ser el resto de los días de fruto.
La cosecha de los **frutos de raíz** en días de raíz es inigualable, como han demostrado los ensayos de cebollas, zanahorias, remolachas y patatas guardadas en almacén.
Para la **siembra de los cereales de invierno** recomendamos las franjas de tiempo ante leo y sagitario.
El **centeno** puede sembrarse en casos excepcionales en días de raíz. Todos los trabajos deben realizarse, sin embargo, imprescindiblemente en días de fruto.

Regulación de plaga de hormigas en edificios:
Incinerar del 27.09 a las 3h hasta el 29.09 a las 21h.
Regulación de caracoles: del 25.09 a las 12h hasta el 27.09 a las 2h.

Octubre 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Sa ♍	☉-♍ ♀△♆	Tierra	Época de trasplante	Raíz h.11h, Flor 12-22h, Raíz d.23h **Trasplante**	●2
41. Semana					
2. Do ♍		Tierra		Raíz	Td
3. Lu ♎ 18	☿-♍	Tierra/Luz		Raíz hasta 17h, Flor desde 18h	
4. Ma ♎	Ag13	Luz		Flor	
5. Mi ♏ 6		Luz/Agua		Flor hasta 5h, Hoja desde 6h	
6. Ju ♏		Agua		Hoja	Td
7. Vi ♐ 20	☉☐♇	Agua/Calor		Hoja hasta 19h, Fruto desde 20h	☿Q♄ Td E DC
8. Sa ♐	☽8	Calor		Fruto **#Fin trasplante 7h**	Td To
42. Semana					
9. Do ♐		Calor		Fruto	
10. Lu ♑ 6		Calor/Tierra		Fruto hasta 5h Raíz desde 6h	
11. Ma ♑		Tierra		Raíz	☿♂♃ Td
12. Mi ♒ 9		Tierra/Luz		Raíz hasta 8h, Flor 9-24h	
13. Ju ♒	♉12 ♆●	Luz		-------- Flor desde 16h	Td
14. Vi ♓ 4		Luz/Agua		Flor hasta 3h, Hoja desde 4h	
15. Sa ♓		Agua		Hoja	☉☍⚷
43. Semana					
16. Do ♈ 17	☺7 ♀- ♏	Agua/Calor		Hoja hasta 13h ----------	☿☐♇ Td To E
17. Lu ♈	Pg2	Calor		-------- Fruto desde 15h	Td To Ta
18. Ma ♉ 7		Calor/Tierra		Fruto hasta 6h, Raíz desde 7h	Td E
19. Mi ♉		Tierra		Raíz	♂☌♇
20. Ju ♊ 17		Tierra/Luz		Raíz hasta 16h, Flor desde 17h	☿☍⚷
21. Vi ♊	♘2	Luz		Flor ***In. trasplante 3h**	Td To
22. Sa ♋ 18		Luz/Agua		Flor hasta 17h, Hoja desde 18h	
44. Semana					
23. Do ♋		Agua	Época de trasplante	Hoja	
24. Lu ♌ 8		Agua/Calor		Hoja hasta 7h, Fruto desde 8h	Td Ta
25. Ma ♌		Calor		Fruto hasta 23h	Td E
26. Mi ♌	☊4☿Q♇	Calor		Fruto desde 8h	♀☐♆ ☉Q♇ Td To E DC
27. Ju ♍ 4		Calor/Tierra		Fruto hasta 3h, Raíz desde 4h	☉☌☿
28. Vi ♍		Tierra		Raíz	
29. Sa ♍		Tierra		Raíz	♂☐⚷ Td Ta
45. Semana					
30. Do ♎ 23	●19	Tierra/Luz		Raíz hasta 22h, Flor desde 23h	♀☌♄ ☿-♎
31. Lu ♎	Ag21	Luz		Flor hasta 7h ----------	Td

OCTUBRE 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♌	♎	♐	♍	♏	♓	♒	♐
3. ♍	16. ♏						
30. ♎							

Época de trasplante:
del 01.10 a las 00h hasta el 08.10 a las 7h
del 21.10 a las 3h hasta el 31.10 a las 24h

Época de trasplante en el hemisferio Sur:
del 08.10 a las 9h hasta el 21.10 a la 1h

¡¡Ha llegado el otoño!!

Llega el otoño, el sol y Júpiter se encuentran ante el frío de la constelación de virgo durante todo el mes. Les acompaña Mercurio.

Marte y Plutón, ante sagitario, puede que traigan algunos días cálidos. Saturno y Venus, ante escorpio, junto a Urano ante piscis, propiciarán las precipitaciones. Neptuno trae luz, influido por acuario y le apoya Venus en la primera mitad de mes al estar ante libra.

Para la **cosecha de fruta** destinada a ser almacenada recomendamos los días de fruto y flor fuera de la época de trasplante.

Cosecha de frutos de raíz y sus semillas: en días de raíz.

Cosecha de frutos de flor y sus semillas: en días de flor.

Cosecha de frutos de hoja y sus semillas: en días de hoja.

Tenemos que esparcir compost en los campos cosechados, pulverizamos con el preparado de boñiga y hacemos la cava de invierno.

Regulación de caracoles: del 22.10 a las 18h hasta el 24.10 a las 7h.

Noviembre 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾		Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Ma ♏ 11	☉-♎ ☿♉	Luz/Agua	Trasplante	--------- Hoja desde 21h Trasplante	☿Q♂ Td To DC
2. Mi ♏		Agua		Hoja	
3. Ju ♏		Agua		Hoja	
4. Vi ♐ 2	☽14	Agua/Calor		Hoja h.1h, Fruto 2-24h #Fin 13h trasplante	Td
5. Sa ♐	♀△♃	Calor		Hoja de 1 a 11h, Fruto desde 12h	
46. Semana					
6. Do ♑ 13		Calor/Tierra		Fruto hasta 12h, Raíz desde 13h	
7. Lu ♑	♂-♑	Tierra		Raíz	♀Q♃ DC
8. Ma ♒ 17		Tierra/Luz		Raíz hasta 16h, Flor desde 17h	
9. Mi ♒	♉17 ♆●	Luz		Flor hst 12h ----- Flor dsd 21h	Td
10. Ju ♓ 13		Luz/Agua		Flor hasta 12h Hoja desde 13h	To DC
11. Vi ♓	☿-♏ ♀-♐	Agua		Hoja	Td Ta
12. Sa ♓	♀△♃	Agua		Hoja **Muy favorable**	DC
47. Semana					
13. Do ♈ 3		Agua/Calor		Hoja hasta 2h, Fruto 3-24h	Td E Ta
14. Lu ♉ 17	☺15 Pg13	Calor/Tierra		----------	
15. Ma ♉		Tierra		Raíz desde 2h	
16. Mi ♉		Tierra		Raíz	Td Ta
17. Ju ♊ 2	☾11	Tierra/Luz		Raíz hasta 1h, Flor desde 2h	*In. trasplante 12h
18. Vi ♊		Luz		Flor hasta 23h	☿□♆ Td To
19. Sa ♋ 00	☉ - ♏	Agua		Hoja desde 00h	Td E Ta
48. Semana					
20. Do ♌ 14	♆D	Agua/Calor	Época de Trasplante	Hoja hasta 13h, Fruto desde 14h	
21. Lu ♌		Calor		Fruto hasta 23h	♂Q♃ Ta DC
22. Ma ♌	♋4	Calor		Fruto desde 8h	Td To E
23. Mi ♍ 8		Calor/Tierra		Fruto h.7h, Raíz dsd 8h	☿☌♄
24. Ju ♍		Tierra		Raíz	♃□♇
25. Vi ♍		Tierra		Raíz	♀☌♇ Td E
26. Sa ♍	☿△♃	Tierra		Raíz h.4h, Hoja 5 -18h, Raíz dsd 19h	
49. Semana					
27. Do ♎ 5	Ag22	Tierra/Luz		Raíz hst 4h, Flor dsd 5h	Td Ta
28. Lu ♏ 17		Luz/Agua		Flor hasta 16h, Hoja desde 17h	
29. Ma ♏	●14	Agua		Hoja	♀□♃ Td Ta
30. Mi ♏		Agua		Hoja	☿Q♆

NOVIEMBRE 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♎	♏	♐	♍	♏	♓	♒	♐
11.♏	2. ♐	7. ♑					

Época de trasplante:
del 01.11 a las 00h hasta 04.11 a las 13h
del 17.11 a las 12h hasta el 30.11 a las 24h

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 04.11 a las 15h hasta el 17.11 a las 10h

En la oscuridad del mes de noviembre tenemos esperanza de algunos impulsos de luz en la primera mitad del mes. El sol ante libra hasta el día 19, Mercurio y Neptuno ante acuario apo-yan las fuerzas de luz. Plutón ante sagitario, junto con Marte y Venus, puede que traigan algo de calor. Sin embargo Júpiter permanece todo el mes ante el frío virgo y Saturno ante las fuerzas de agua de escorpio. Vamos a ver si las precipitaciones lo hacen en forma de lluvia o nieve.

Los días de flor en la época de plantación son muy apropiados para plantar bulbos de flores. Crecerán mucho mejor y tendrán colores más intensos. Los restantes días de flor son solo una alternativa, que nunca darán los colores tan intensos.

Si no lo hemos hecho en octubre, recogemos los restos orgánicos y hacemos compost. Si lo tratamos con los preparados biodinámicos, pronto tendremos hongos y una buena transformación. El preparado de boñiga acelera también la fermentación. En época de trasplante, en los días que corresponden, podemos también plantar los arbolitos frutales y del bosque, que pulverizamos con el preparado combinado de estiércol o el preparado de cantera.

Cortar para la corona de adviento y los adornos de Navidad:
en días de flor, fuera de la época de trasplante.

Tala de árboles de Navidad destinados al transporte:
en días de flor, fuera de la época de trasplante.

Moscas de establo: capturar con atrapamoscas e incinerar en el establo del 17.11 a las 2 hasta el 18.11 a las 23h.

Diciembre 2016

Día ☾ en la Constelación	Posiciones	Elemento ☾	Órgano estimulado por ☾ ó Planetas	Constelaciones menores y Tendencia
1. Ju ♐ 8	☉-♏ ☋9	Agua/Calor	Hoja h.7h, Fruto 8-16h, **Adviento** Raíz d.17h	☉☐♆ Td E DC To **#Fin trasplante 20h**
2. Vi ♐	♂△♃	Calor	Raíz hasta 8h, Fruto desde 9h ☿-♐	☿Q♃ Td To DC
3. Sa ♑ 18		Calor/Tierra	Fruto hasta 17h, Raíz desde 18h	
50. Semana				
4. Do ♑		Tierra	Raíz	
5. Lu ♑		Tierra	Raíz hasta 23h	
6. Ma ♒ 00	☊19 ♆●	Luz	Flor 00-14h ----------	♀-♑
7. Mi ♓ 21		Luz/Agua	Flor de 2 a 20h, Hoja desde 21h	Td
8. Ju ♓		Agua	Hoja	
9. Vi ♓		Agua	Hoja	Td E
10. Sa ♈ 13		Agua/Calor	Hoja hasta 12h, Fruto desde 13h	☉♂♄ Td To
51. Semana				
11. Do ♈		Calor	Fruto hasta 21h, Hoja desde 22h	Td
12. Lu ♉ 4	☉△⚷	Calor/Tierra	Hoja hasta 11h ----------	
13. Ma ♉	Pg1	Tierra	-------- Raíz desde 14h	
14. Mi ♊ 3	☺1 ☊23	Tierra/Luz	Raíz hasta 12h, Flor desde 13h	Td
15. Ju ♊	♂-♒	Luz	Flor ***In. traspl.00h**	♀Q⚷ DC Ta
16. Vi ♋ 11		Luz/Agua	Flor hasta 10h, Hoja desde 11h	
17. Sa ♌ 23		Agua/Calor	Hoja hasta 22h, Fruto desde 23h	
52. Semana				
18. Do ♌		Calor	Fruto	
19. Lu ♌	☊6	Calor	Fruto h.1h ------ Fruto 10-23h	☉Q♆ Td To DC
20. Ma ♍ 16	☉-♐	Calor/Tierra	----------	
21. Mi ♍	☿☊	Tierra	-------- Raíz desde 13h	Td E
22. Ju ♍		Tierra	Raíz	♂Q♄ DC
23. Vi ♍		Tierra	Raíz	☉Q♃ DC
24. Sa ♎ 11	**Nochebuena**	Tierra/Luz	Raíz h.10h, Flor 11-18h, Hoja d.19h	Td
53. Semana				
25. Do ♎	**NAVIDAD** Ag7	Luz	Hoja h.5h, Flor 6-8h, Raíz 9-18h, Flor de 18 a 23h	♄△⚷ ♀△♃
26. Lu ♏ 00		Agua	Hoja desde 00h	♃♂⚷ Td Ta
27. Ma ♏		Agua	Hoja	Td E
28. Mi ♐ 14		Agua/Calor	Hoja hst.13h, Fruto dsd 14h	☉♂☿ Td
29. Ju ♐	●8 ☋5	Calor	Fruto **#Fin 4h trasplante**	⚷-D
30. Vi ♐		Calor	Fruto hasta 23h	
31. Sa ♑ 00	♀-♒	Tierra	Raíz	

Época de Trasplante

DICIEMBRE 2016

Mercurio	Venus	Marte	Jupiter	Saturno	Urano	Neptuno	Plutón
♏	♐	♑	♍	♏	♓	♒	♐
2. ♐	6. ♑	15. ♒					
	31. ♒						

Época de trasplante:
del 01.12 de 00h a 8h
del 15.12 a las 00h hasta el 29.12 a las 4h.

Época de trasplante en el hemisferio sur:
del 01.12 a las 22h hasta el 14.12 a las 22h
del 29.12 a las 6h hasta el 31.12 a las 24h

El sol se encuentra ante las fuerzas de agua de escorpio hasta el 20 de diciembre, le acompaña Saturno, que permanecerá allí todo el mes. Urano actúa con el elemento agua desde piscis. Tendremos lluvia o nieve. El sol pasa a sagitario el día 20, donde se encontrará a Plutón y puede que ambos nos ofrezcan algunos momentos cálidos. Marte aportará impulsos de luz desde acuario a partir de mediados de mes.

Cortar ramas para **decoraciones de Adviento y Navidad y cortar el árbol de Navidad:** en días de flor para que mantengan el olor.

Esta época es favorable también para la **poda de árboles y setos**. Para plantas de flor escogemos días de flor y fruto.

Incineración de caracoles en el sur del planeta:
el 16.12 a las 11h hasta el 17.12 a las 22h.

Cosechas de frutos de hoja y sus semillas en el sur del planeta: en días de hoja.
Cosecha de frutos y sus semillas en el sur del planeta: en días de fruto
Cosecha de frutos de raíz y sus semillas en el sur del planeta: en días de raíz.
Cosecha de frutos de flor y sus semillas en el sur del planeta: en días de flor.

DESEAMOS A NUESTROS LECTORES
FELIZ ADVIENTO Y NAVIDAD
Y BUENA SALUD PARA EL NUEVO AÑO 2017

Plaga de hongos en las plantas

En el caso de los hongos nos referimos a parásitos vegetales, ya que en la naturaleza, el hongo normalmente se dedica a destruir y transformar lo orgánico que está descomponiéndose. Los hongos en la naturaleza tienen como función desintegrar la vida descomponiéndola. Aparecen en los cultivos cuando utilizamos compost de estiércol no bien elaborado o que contiene sustancias de cuerpo de animal que no han pasado el proceso del compost, como viruta de cuernos o huesos. También puede ocurrir cuando las semillas fueron recolectadas bajo constelaciones desfavorables. Según Rudolf Steiner: *"Cuando las fuerzas de la luna actúan intensamente sobre la Tierra…".* Podemos hervir infusión de cola de caballo y pulverizar inmediatamente las zonas afectadas con dicha infusión. El nivel de los hongos bajará de la planta al suelo, donde está su lugar. Podemos hacer algo para la curación de la planta, pulverizando infusión de ortiga sobre las hojas de la planta. De esta manera fomentamos la asimilación y la circulación de la savia, desapareciendo también así los hongos. Sin embargo esto quiere decir que ya antes tiene que existir una enfermedad y que el hongo aparece como consecuencia. Por lo tanto no se puede hablar de enfermedades producidas por hongos.

Rudolf Steiner explica este que fenómeno en su "Curso sobre agricultura Biodinámica" de la siguiente manera:

"Si las fuerzas de la Luna influyen en lo acuoso se hacen demasiado fuertes en la tierra, quizás porque ha llovido demasiado, el nivel de hongos, que normalmente se encuentra a ras del suelo, asciende a la planta". Según Steiner, se les puede hacer volver a su ámbito original preparando decocciones de cola de caballo (Equisetum arvense) y aplicándolas al suelo donde se cultivan las plantas atacadas.

En parte puede haber también otros motivos para que haya hongos. Así se ha comprobado que los abonos orgánicos no maduros o sustancias animales que no han pasado por un proceso de compostaje provocan su aparición en el cultivo del año siguiente. Si se queman los frutos infectados por hongos se deberían separar antes las semillas.

Recolección de plantas de los preparados biodinámicos

El diente de león: se recoge por la mañana, en días de Luz-Flor, inmediatamente después de empezar a abrirse la flor, cuando su centro está todavía cerrado y se secan las flores sobre un papel a la sombra.
La milenrama en días de Calor-Fruto, con el sol ante la región de Leo, es decir a partir de mediados de agosto. *(Esto es válido para Centroeuropa, en España es posible recolectarla ya en mayo, junio y julio).*
La manzanilla en días de Luz-Flor, poco antes de San Juan, pues más tarde la cabezuela ya está formando semilla y estaremos sembrándola con un preparado de manzanilla mal elaborado. También pierde su efecto si en las cabezuelas hay gusanos, otra razón para esta época de recolección.
De la ortiga se recoge toda la planta menos la raíz, cuando empieza a florecer, en días de Luz-Flor.
La valeriana preferentemente en días de Luz-Flor, alrededor de San Juan.
La corteza del roble en días de Tierra, sin líber.

El cuidado de las abejas

La colonia de abejas vive en una colmena de paja o en un cajón, aislada del mundo exterior. Además como protección, las abejas recubren su hogar con propóleo para defender a la colmena de lo nocivo. La unión directa con el mundo exterior se hace a través de las piqueras.
Cuando el apicultor quiere beneficiar a la colmena de las fuerzas cósmicas, tiene que crear en la colmena una situación parecida a la que crea el agricultor cuando cuida sus plantas. Este último trabaja el campo. Con el aire entran las fuerzas cósmicas en la tierra, que son absorbidas por la planta y puede aprovecharlas hasta los próximos trabajos.
El apicultor tiene que abrir la vivienda de la colmena e interrumpir la capa de propóleo. De esta manera se crea un desorden, por el que las fuerzas cósmicas entran en la colmena y pueden actuar hasta el siguiente control. Así el apicultor puede trasmitir fuerzas cósmicas a la colmena de manera acertada.
No es indiferente que tipo de fuerzas se trasmiten en los trabajos en determinados momentos. El apicultor puede intervenir conscientemente y utilizar los días para determinados trabajos que en ese momento son importantes para el desarrollo de la colmena y la producción de alimento de la misma. La colmena recompensa al apicultor y le da parte de la miel de las sustancias almacenadas y bien elaboradas. Recomendamos los días de Tierra/Raíz cuando la colmena tiene que construir intensamente. Los trabajos en días de Luz/Flor estimulan la incubación y ayudan al aumento de la colmena. Los trabajos en días de Calor/Fruto fomentan la búsqueda de néctar. Los días húmedos de Hoja son desfavorables tanto para los trabajos como para la extracción de miel y la centrifugación de la misma.

Desde finales de los años setenta, la varroa está extendida en la mayoría de las colmenas europeas. Después de varios ensayos de incineración, recomendamos incinerar la varroa como de costumbre, triturarla y dinamizarla durante una hora para después pulverizarla entre los pasillos de los panales. La elaboración de la ceniza y su aplicación en la colmena se realizará en ambos casos con el Sol y la Luna ante Tauro.

Guía de tratamiento con Ácido oxálico.
Guía de tratamiento con Ácido fórmico.

El alimento de las abejas

Para el alimento de invierno utilizamos tisanas que hemos probado durante años y son beneficiosas para la salud de las colmenas. Ponemos en agua hervida milenrama, manzanilla, diente de león y valeriana. Después de 15 minutos la colamos. Ponemos en agua fría ortiga, cola de caballo y corteza de roble, lo hervimos durante diez minutos, lo colamos y lo añadimos a la preparación anterior. Son suficiente tres gramos de cada planta y medio litro de agua por cada tisana para 100 litros de alimento adicional para las abejas. Esto es importante en los años que ha habido mucho crecimiento de hojas. Tenemos que indicar una corrección: en el libro de apicultura hablamos de 10 gramos por planta. ¡Esto no es correcto! Esta indicación es para otra cantidad. Como decimos ahora, hay que coger 3 gramos. Pedimos disculpas.
El tema de este año en el cultivo para la cosecha de semillas y la multiplicación, por lo que tenemos que hablar del enjambre y otras opciones de multiplicación. Pero ya hablamos detalladamente el año pasado de los enjambres. Varios lectores nos han preguntado y queremos hablar del saco atrapa enjambres, que deberían de tener todos los apicultores que tengan sus colmenas en el bosque o en el huerto. Con este saco y un palo telescópico se llega a cualquier parte donde se haya puesto el enjambre, sin tener que hacer acrobacias con la escalera de mano. Colocamos el saco debajo del enjambre y golpeamos la rama de la que están colgados. El enjambre de abejas cae al saco y con una cuerda de desgarre cerramos el saco.
La mejor época para el traslarve no es hasta julio. Si empezamos antes con la cría, escogemos los días de flor. Las jóvenes reinas fecundadas en julio se añaden a las colmenas anteriormente fecundadas para que así haya un rejuvenecimiento, y además porque las colmenas de reinas fecundadas tan tarde son más débiles al año siguiente.

Elaboración de pan de centeno (ver pg. 39 de este enlace)

Podemos ver el desarrollo de todos los cereales de nuestros ensayos y probar su calidad de panificación, por esa razón hemos utilizado nuestros propios agentes leudantes sin otras sustancias. Además de leche agria, suero de mantequilla, suero de leche y sirope hemos probado con miel. Tenemos una receta que funciona muy bien desde hace años:

Removemos una cucharadita de café bien llena de miel multiflora en un vaso de agua a 50ºC para luego mezclarlo con 125 gramos de granos de centeno triturados. Esta primera masa se prepara la víspera y se conserva en un lugar caliente durante la noche. La temperatura ambiente ha de ser mantenerse entre 26º y 30º, si las temperaturas son bajas

puede ponerse al lado de una estufa o cerca de la cocina con un fuego abierto con llama pequeña. Al día siguiente añadimos la misma cantidad de centeno triturado y agua caliente o suero de leche. Por la tarde ya se puede mezclar esta levadura madre con el 60% de la harina que se va a hornear. Siempre utilizaremos agua caliente. Al día siguiente se pone algo de sal y se amasa. Podemos añadir semillas de lino, comino, hinojo o parecidos y lo guardamos en un lugar caliente. Al día siguiente se vuelve a amasar y se echa sal. Cuando empieza a subir la masa podemos formar los panes. Dejamos que aumenten bien su volumen y luego se meten en el horno precalentado y se hornean una hora. El centeno es fácil de digerir, después de haber pasado las 5 etapas del proceso de aumento de volumen. De la masa ya preparada podemos guardar unos 500 gramos. Cuando haya aumentado un poco, lo envolvemos en papel, lo colocamos en un cacharro y lo conservamos en la bodega. La nevera es demasiado fría. Si queremos volver a hacer pan cogemos la masa de la bodega. Añadimos a la masa una cucharadita de miel que ya hemos removido antes en un vaso de agua caliente y ponemos la masa en el cacharro en un lugar caliente. Por la tarde podemos utilizar esta levadura madre y continuar el proceso como describimos anteriormente. Se puede empezar desde el principio, pero lleva más días que este tipo de levadura madre. El centeno tiene que aumentar el volumen en 5 etapas, en el caso de trigo, cebada y avena son solo 3 etapas. El éxito depende de la temperatura ambiente del espacio donde se encuentra el horno. Lo ideal sería una temperatura de 25º a 28º C.
La primera masa ha de trabajarse en días de flor o fruto. Si escogemos los días de hoja y si en vez de miel multiflora, utilizamos miel de mielada que es bastante más oscura, puede suceder que el proceso de aumento de volumen de la masa sea mayor y que la masa salga del recipiente o que sobresalga de los moldes en el horno. Tendremos entonces un pan que se compone básicamente de agujeros. El pan de días de hoja no es tan bueno como el pan de días de flor o fruto.

La receta original la encuentran en la publicación "Sembrar, plantar y recolectar en armonía con el cosmos" de María Thun. (Publicado por Editorial Rudolf Steiner).

María Thun y la elaboración de pan

Desde muy pequeña Maria Thun había asistido a la fabricación del pan. La casa de los padres tenía un horno de pan. El cereal cultivado se utilizaba para hacer pan y bizcochos. El cereal que más se utilizaba era el centeno que era el que más se cultivaba en la región. Se usaba para hacer bizcochos o se vendía al molinero. La mayoría de los panes eran hogazas grandes elaboradas con levadura madre.

María Thun buscaba en sus ensayos con cereales no solo el mejor rendimiento, sino también la salud de la planta y una buena calidad de panificación.

Pronto se dio cuenta que la harina de las distintas cosechas del mismo cereal reaccionaba de manera diferente y decidió hacer ensayos de panificación.

Era lógico que nos preguntáramos cómo moler el grano que luego iba a ser horneado.

A lo largo de los años hemos probado diferentes molinos y hornos hasta encontrar el molino y el horno adecuados.

Los molinos que probamos eran molinos que solo podían triturar el grano o trituraban y molían harina fina. Hemos testado también molinos "compactos" para uso casero. Con este tipo de aparatos solo se podían moler pequeñas cantidades de harina, ya que se calentaban al poco tiempo y provocaban que la harina se calentase a su vez muy rápidamente. La harina que se calentaba antes de tiempo causaba problemas a la hora de subir. Si la harina se calienta cuando es molida, la capacidad de hinchamiento disminuye y hay que añadir más cantidad de agentes leudantes, como la levadura. De esta manera, el sabor del pan cambia y su estructura se vuelve más densa.

Molino de mano para triturar el grano

Recomendamos por esta razón que antes de comprar un molino se haga una prueba de molido. Para el uso doméstico encontramos robots estilo thermomix que trituran verdura, hornean pan, hacen bizcochos y muchas cosas más. Estos aparatos tienen también a veces la función de moler harina. Con estos electrodomésticos deberíamos pedir una prueba de demostración para ver si satisface nuestras expectativas.

Molino de cereales que puede moler desde grano triturado hasta harina gruesa

Cuando elegimos un horno sucede lo mismo que con el molino, tiene que satisfacer nuestras expectativas.

Para el uso casero es suficiente el horno de la cocina. No tiene importancia si es eléctrico o si es de leña, en ambos casos hay una bandeja de metal y no se calientan los muros. Si horneamos para un colectivo o grupo, entonces no es suficiente. Hemos hecho ensayos con hornos eléctricos grandes revestidos con chamota. Se podían hornear unas 6 u 8 hogazas grandes o una mayor cantidad de panes más pequeños. La repartición de calor es bastante buena. La ventaja de este horno, lo mismo que la cocina eléctrica, es que se mantiene siempre la misma temperatura.

Molino de cereales con sistema de cribado (Sichter). La cáscara y el germen se criban. Se consigue una harina muy fina.

El pan horneado en horno de leña tiene un sabor más intenso, así que construimos un homo de leña. Es un horno para un espacio pequeño. Está compuesto de partes de chamota y recubierto con ladrillos refractarios. Este horno tiene dos cámaras y se calienta en la inferior. Una vez que se ha llegado a la temperatura deseada, barremos la ceniza en el cajón de cenizas y así se puede hornear en ambas cámaras. En cada nivel caben cuatro hogazas grandes, es decir ocho en total. Hay que alcanzar una buena temperatura, porque si no, hay que intercambiar los panes en las cámaras. Este pan tiene el típico saber de horno de leña, el sabor está asegurado.

Horno eléctrico

Nuestro horno casero con dos cámaras

Horno público de pan en Brungershausen

Los hornos de leña tienen una vieja tradición. Los homos públicos de los pueblos que en parte estaban medio derruidos vuelven a utilizarse, y se hornea a intervalos. Para este tipo de hornos es imprescindible la leña seca, que mantiene las brasas mucho tiempo, como la leña de haya. Existe un homo público antiguo totalmente renovado en Schashagen. El interior está modernizado y pertenece a la familia Bonin. Aquí se hornean los panes y bizcochos del pueblo y los panes de la panadería.

En la imagen vemos el espacio de trabajo. A la derecha está la cámara de precalentamiento, donde se pone el pan en planchas durante la última fase de hinchamiento, para que la masa no se enfríe y evitar que se hunda. A la izquierda hay una mesa de trabajo. Detrás vemos una máquina para amasar, de la que no podemos prescindir cuando tenemos grandes cantidades de masa.

Horno en panadería en Hof Eichwerder, Schashagen

Eclipse solar del 20 de marzo de 2015

Esperábamos este eclipse con impaciencia. Los dos eclipses que hubieron podido verse en nuestra región en el pasado, fueron con tiempo nublado y no pudimos observar todo el proceso.

Los días anteriores al eclipse, los medios de comunicación y los meteorólogos daban información sobre las regiones de Alemania donde iba a verse el eclipse sin nubes. Retrasé unas horas un viaje al norte para poder hacer fotos y poder publicar imágenes propias y no tener que usar las de internet.

La mañana del 20 de marzo solo amaneció con algunas nubes cirrostrato en el cielo y teníamos la esperanza de poder ver el eclipse. Desde hace años, ya conocemos los efectos de un eclipse en el crecimiento de las plantas, pero un fenómeno de este tipo siempre genera una gran expectativa.

La primavera de 2014 no fue cálida, pero las abejas ya estaban activas, a pesar de que teníamos noches frescas. No habíamos empezado todavía los trabajos al aire libre.

El eclipse sucedió en un momento interesante: el día 19 de marzo la órbita de la luna estaba en perigeo, es decir cerca de la Tierra. El día 20 hubo un eclipse solar, es decir una influencia negativa. El día 21 hubo además un eclipse de Urano que tuvo un efecto negativo sobre el crecimiento de las plantas. Con estas constelaciones ya habíamos hecho ensayos en el pasado para ver la influencia de los astros en el crecimiento de las plantas. En esta ocasión se juntaban en poco tiempo tres acontecimientos negativos y no sabíamos cómo iba a plasmarse en las plantas.

A pesar de todo ello, la mañana del 19 de marzo empezamos a sembrar en macetas de los invernaderos. Elegimos plantar girasoles, calabacines, pepinos, rabanitos, lechugas y colinabos. La última siembra terminó el día 21 por la mañana.

Cielo de mañana antes del eclipse

Dos horas antes del eclipse solar cambió la atmósfera. Había mucha calma, no se oía ningún pájaro y las abejas apenas se atrevían a salir. Parecía que la naturaleza retenía el aire. La calma aumentó durante la fase de oscurecimiento del eclipse y terminó en la fase final del mismo.

Las abejas se normalizaron dos horas después de haber terminado el eclipse. Después de este momento casi fantasmal estábamos expectativos ante los resultados de las siembras. Poco después sucedió algo de lo que no nos gusta hablar.

Ensayo de siembras durante el eclipse solar

Estuvimos varios días fuera de casa. En esas fechas hubo noches frías de hasta -15ºC y además se estropeó la calefacción del invernadero. El frio paró, más bien terminó la fase de germinación de las plantas y no pudimos seguir observando el desarrollo.

Para los nuevos lectores que nos conocen solo desde el año pasado, incluimos imágenes de eclipses anteriores para que puedan ver el efecto impresionante de estas fuerzas.



Principio de eclipse



Máximo oscurecimiento



Final del eclipse

En esta primavera nos han preguntado como otras veces, si los eclipses solo tienen efecto en regiones en las que se pueden ver. En el pasado se ha constatado que estas constelaciones tienen un efecto global, es decir, en todo el planeta.

Colinabo sembrado durante eclipse el 26 de febrero de 1998

Así los demuestran los cálculos realizados en lugares muy alejados del lugar dónde se veían los eclipses. Si por ejemplo se observa un eclipse solar en América, sus efectos también se notarán en Alemania o en otras partes del planeta, aunque allí no sea visible.

El significado del cosmos para buscar explicaciones sobre el origen de la Tierra empieza a cobrar importancia en los medios de comunicación.

Colinabo sembrado en días de hoja



Colinabo sembrado en Oposición De Sol y Saturno

Hace 40 años, en círculos científicos el significado del cosmos era tabú para descifrar el fenómeno de la vida. Entretanto se habla y discute seriamente sobre el significado del cosmos y sus efectos sobre la evolución, aunque todavía faltan pruebas científicas.

Quizás les sea útil a los lectores un poco de fantasía. Imagínense que el cosmos es una orquesta de sinfonía con incontables compositores. Los instrumentos permiten apoyar o producir la armonía que se imagina el compositor o cómo la oye en su oído interno o mental. Si falla alguno de los instrumentos por unos pocos movimientos, el conjunto de la armonía se perturba o interrumpe durante un momento.

Colinabo sembrado en eclipse de Saturno El día 1 de marzo de 1998

Colinabo sembrado en eclipse de Saturno El día 29 de marzo de 1998

Lo mismo podemos imaginarnos con las constelaciones. Si todos los planetas pueden realizar la tarea encomendada en la Creación, entonces se mantiene la armonía necesaria para la vida. Al suceder un eclipse esta armonía se interrumpe por unos "pequeños compases" y después la orquesta sigue con la sinfonía.

No debemos dramatizar estas interrupciones, ya que después de una perturbación comienza una nueva etapa, que sirve para saltar la desarmonía y transformarla. Es un consuelo saber que las perturbaciones cósmicas pueden calcularse y el ser humano puede prepararse.

En los encuentros siempre hay gente que hace preguntas al respecto, que les cuesta aceptar que el estado del cosmos influye sobre la Tierra y la vida en ella. Son personas que se encuentran en proceso de entendimiento.

Con la siguiente imagen esperamos tener más aceptación.

Diferentes formas de frutos de raíz que han crecido influenciados por los diferentes momentos de siembra.

El rabanito es una planta que ha demostrado ser ideal para hacer ensayos. Con ella podemos observar los efectos de las fuerzas cósmicas y sus manifestaciones. Podemos ver el estado de cuatro tipos de frutos: de raíz, de hoja, de flor y de semillas. Durante un periodo de crecimiento, es decir, durante un año, podemos seguir la evolución de los tipos de frutos, desde la germinación hasta la maduración de la semilla. Al año siguiente podemos cultivar las semillas y comprobar cómo han actuado las constelaciones del año anterior hasta la formación de la semilla.

En el primer año vimos la influencia en el crecimiento de las plantas. En el segundo año cuando se recoge la cosecha de las semillas plantadas del año anterior, vemos cómo las constelaciones del año anterior han influido en la capacidad de regeneración.

Diferentes tintes de color de las cebollas según el día de la siembra

En nuestros ensayos siempre hemos valorado que no solo se tengan en cuenta las diferencias de calidad y cantidad para una hacer una conclusión sobre los cultivos, sino que siempre hemos pensado que es importante considerar también la capacidad de regeneración y las diferencias que surgen de las semillas.

Un cultivo que ha sido bien cuidado y que da buenos rendimientos, si por el contrario no tiene capacidad de regeneración, para nosotros no es interesante para su uso regular y no nos ayuda para el desarrollo.

Diferentes colores de las ciruelas Mirabel según el día de la siembra del árbol
De izquierda a derecha: 1º Venus oposición a Saturno el 6-2-1980. 2º Júpiter oposición al Sol el 24-2-1980. 3º-Marte en oposición al Sol el 25-2-1980 y 4º- Saturno en oposición al Sol el 13-3-1980

Los efectos del invierno de 2013/2014 en las abejas

El invierno de 2013/2014 fue tan caluroso, al menos en Alemania, que se podía decir que el otoño de 2013 iba a pasar directamente a la primavera de 2014, Nunca habíamos tenido una primavera que hacía aparecer tan rápido el calor. Era extraño que las colmenas se multiplicaran tanto y pronto estuvieron llenos los panales. Tuvimos una magnífica cosecha de miel de flores.

Muchos apicultores que no tenía experiencia con esta miel de flores tan temprana, vieron que la miel se quedaba pegada en las celdas, se caramelizaba y no podría centrifugarse.

Este estado positivo de las colmenas bajó considerablemente después de florecer las frambuesas. Las abejas procesaron poca mielada sin embargo.

A lo largo del verano hubo en muchas colmenas una plaga de ácaros de varroa. El invierno 2013/2014 fue muy cálido y muchas colmenas modernas de gran volumen se pasaron el invierno incubando.

No hubo ninguna pausa de incubación y los ácaros de la varroa proliferaron sin problema.

En las regiones que tienen un invierno con heladas y nieve durante semanas, se produce una pausa de incubación, y el ácaro de la varroa no termina de desarrollarse. Esta pausa no se produjo en muchas regiones y el ácaro pudo multiplicarse. Como las colmenas crecieron muy rápido, no se pudo ver el crecimiento paralelo de la varroa y apareció más fuerte en junio y julio. En ese momento la población de ácaros no era visible al ojo humano, pero se habían extendido tanto que sí se reconocían sus efectos de alimentarse de la sangre de las abejas.

Arriba zángano con alas sanas, abajo zángano con alas lisiadas por ataque de varroa.

Antes se pensaba que la varroa se multiplicaba en las celdas de incubación de los zánganos. Pero entretanto se ha comprobado que si bien prefiere a los zánganos, también invaden las celdas de las trabajadoras e incluso de las reinas. Este ácaro se nutre pinchando el sistema sanguíneo de la abeja a la altura del pecho, impidiendo que se desarrollen las alas y las abejas crecen lisiadas.

Poco a poco se vio la invasión de ácaros de varroa y la disminución del crecimiento de las colmenas.

La varroa existe en los países de habla alemana desde 1980. Al principio su control fue difícil ya que no se conocían sus costumbres ni cómo se multiplicaba. Es originaria de India donde vive de manera simbiótica con las abejas.

Rudolf Steiner dio consejos sobre cómo manejar las plagas en los cultivos y huertos. Decía que si quemamos la piel o las plumas del animal en una determinada constelación, después repartimos la ceniza en el lugar donde no debe extenderse la plaga, entonces los animales no se exterminaran, pero se reducirán considerablemente.

Estos consejos empujaron a Maria Thun a hacer infinidad de ensayos con incineraciones de pieles y plumas, de semillas de plantas adventicias. Con los años encontró las constelaciones adecuadas. Los buenos resultados nos dan la esperanza de poder encontrar el camino para controlar la varroa.

Los ácaros de la varroa, que en realidad es una araña, tienen una dura coraza de quitina. Los ensayos han demostrado que las constelaciones más adecuadas son las de la **luna y el sol ante Tauro** ♉. Para otro tipo de arañas se recomiendan otro tipo de constelaciones. Cuando hacemos incineraciones de ácaros, tenemos muy poca ceniza, por lo que elaboramos una potencia D8 con agua como sustancia de base.

Con el tiempo hemos constatado que la ceniza de D8 es la que funciona mejor. Generalmente la aplicación de tres veces de ceniza de potencia D8 de pieles, plumas o semillas funciona muy bien. En el desarrollo de la varroa no es posible aplicar la varroa tres veces para conseguir un buen efecto, aplicamos la D8 en primavera y otoño siempre que vamos a las colmenas.

La varroa vive de la sangre de la abeja, pero se multiplica sobre las crías de las abejas. Antes de que las celdillas sean operculadas se cuelan los ácaros y se sellan las celdillas una vez que los huevos son larvas. En esta fase es cuando los ácaros ponen sus huevos en las celdas. Sus crías crecen muy rápido y el efecto de la D8 no llega a las crías. Cuando nacen las abejas, las crías de ácaros ya son adultas y abandonan las celdillas.

La varroa puede multiplicarse también en invierno, a no ser que las temperaturas exteriores impidan una pausa de incubación.

Vamos a exponer todo el proceso de incineración y dinamización que ya tratamos el año pasado con la regulación de las babosas y escarabajos de la patata.

Para la incineración necesitamos aproximadamente una cuchara llena de ácaros y leña totalmente seca. Es muy buena la leña de abeto y haya. Los ácaros no pueden estar mezclados con restos de abejas ya que si no pueden perjudicarse en el tratamiento. Es importante que la madera deje unas buenas brasas. Hay maderas que queman rápido pero no dejan una brasa sólida. No podemos utilizar gas, aceite o electricidad, hemos comprobado que no dan buenos resultados. La ceniza que resulta no da los mismos

resultados que el fuego de leña. Necesitamos una estufa de la que podamos coger la ceniza. La estufa tiene que ser cerrada, no podemos hacer la incineración en una fogata o en una chimenea abierta. Lo mejor es un horno de leña o una estufa de leña.

El tamaño del fuego no debe ser mayor de unos 20 a 25 cm, ya que si no la relación de cantidad entre ácaros y leña es demasiado grande. También sirven las estufas de hierro fundido como las que había antes. La evacuación de humos tiene que poder desconectarse. También sirven las barbacoas que se pueden tapar con una tapadera.

Se colocan los ácaros en papel sobre las brasas de la barbacoa y luego se cubre con la tapa

El momento para la incineración es cuando el sol y la luna se encuentran ante tauro. Si en ese periodo hay un eclipse, entonces realizamos la incineración justo antes del momento máximo del eclipse. Hemos comprobado en varios ensayos que el efecto inhibidor de vida es más intenso justo antes del punto máximo del eclipse. De esta manera aumentamos el efecto de la ceniza.

Preparamos el fuego durante una constelación del sol y la luna ante tauro. Cuando ya tenemos unas buenas brasas, echamos los ácaros que tenemos dentro de una bolsita de papel. Se queman los ácaros y dejamos se la mezcla de leña y ácaros se conviertan en ceniza. Después de que se enfríe, colamos con un pequeño colador de cocina o miel la ceniza y la ponemos en un mortero o en un bol de porcelana y la trituramos durante una hora. No recomendamos los morteros de metal.

Trituramos durante una hora la ceniza colada

La ceniza se hace más fina con la trituración y nos da la impresión de que disminuye el tamaño. Al hacerse más fina se vuelve "pegajosa" y se pega a las paredes del mortero. Podemos retirarla con una pequeña viruta cuando trituramos. Después de una hora podemos empezar a elaborar la D8. Si tenemos una estufa cerca de la colmena podemos realizar todo allí. Tenemos que poner una malla que impida que salten las chispas para que no se produzca un fuego. Si realizamos las incineraciones en el lugar donde queremos regular las plagas entonces el efecto es mejor.

Podemos utilizar el fuego de leña de la cocina para incinerar

Necesitamos un gramo o un centímetro cúbico. Si no tenemos un medidor, peso u otra forma de medir, podemos coger un dedal de costura o una huevera.

Tomamos nueve unidades de ceniza de madera en el mortero y añadimos una unidad de la ceniza colada de madera y varroa, es decir la sustancia básica. Trituramos 3 minutos. Para estar totalmente atento al trabajo, recitamos en voz alta lo que estamos haciendo. Si aparece una visita inesperada, hemos pronunciado la potencia dónde estamos y no nos olvidamos.

Cuando empezamos con la dinamización, decimos por ejemplo que estamos elaborando la D1. Después de tres minutos triturando, decimos claro en voz alta, esto es la D1.

Ahora tenemos 10 unidades de D1. Añadimos 90 unidades de ceniza de leña en el mortero de D1 y trituramos 3 minutos. Durante la actividad repetimos que estamos elaborando la D2 y cuando terminamos decimos que esto es la D2. Algunos lectores pueden pensar que es ridículo, pero ayuda para concentrarse en el trabajo. De esta manera llegamos hasta la D8. A partir de la D4 el mortero seguramente se nos hace pequeño. Normalmente no tenemos morteros gigantes.

No debemos olvidar que toda la ceniza del mortero tiene la misma potencia y el mismo efecto. Tomamos un gramo o la cantidad de una huevera llena y continuamos potenciando, esa D4 por ejemplo, igual que hicimos con la D1. Recomendamos guardar todas las cenizas, ya sean D3, D4 o D5. Indicamos en el tarro con un papel o trozo de madera "varroa", la potencia y la fecha. Esta ceniza puede guardarse en un tarro de cristal cerrado varios años y puede dinamizarse si se necesita.

Esparcimos en loa panales la ceniza D8 con un salero.

Esparcir ceniza con un salero

Para poder realizar la incineración necesitamos suficientes ácaros. Los recogemos con una red que colocamos a partir de finales de junio en los panales de incubación. A partir de junio caen los restos de ácaros muertos, los ponemos en un recipiente de cristal con tapa y los guardamos bien. Los ácaros son de forma oval, de unos 1x1,5 milimetros y de color marrón rojizo. Se secan muy pronto y pueden almacenarse durante meses sin que se descompongan. Si en junio y julio caen unos 10 ácaros al día, podemos hablar de una plaga importante. La fecha de incineración suele ser en mayo, por lo que recomendamos algún producto para combatir la invasión, como ácido fórmico.

Vientre de ácaro de varroa. Les faltan tres patas.

Al aplicar la ceniza D8 no aniquilamos los ácaros, no nos corresponde.

Al aplicar la ceniza creamos una atmósfera dentro de la colmena que no es agradable para los ácaros y se reduce la multiplicación. Si en julio hay una invasión importante entonces podemos aplicar ácido fórmico, láctico u oxálico. En estos casos se puede consultar a los apicultores vecinos, asociaciones o al veterinario.

Loque americana (bacillus larvae)

En el mundo de los apicultores se habla de las plagas de loque americana. Queremos explicar métodos alternativos que en el pasado han demostrado ser eficaces. Ernst Perkiewicz demostró que funcionaba con éxito en muchas colmenas.

Cada país tiene muy diferentes directrices para tratar las plagas y no podemos declarar que éste sea un método eficaz de manera general. Sin embargo allí donde la ley ha permitido aplicarlo, este es el método más humano y respetuoso con las abejas.

Método de tratamiento

El tratamiento que vamos a explicar se realizará idealmente en días de luz-flor o en días de calor-fruto. Por la tarde, cuando las abejas ya están recogidas, las ponemos en los panales de miel, y dejamos que se sacien. Después las empujamos al cajón del enjambre con un embudo de metal, igual que como explicamos en la enjambrazón artificial. La reina viene a la colmena del enjambre. En el cajón vacío ponemos dos o tres cuadros de crías. Aquí pueden entrar las últimas abejas que lleguen volando, y cerramos el alza o cajón.

Colocamos la colmena del enjambre en un lugar fresco, seco y oscuro. Dejamos pasar 48 horas, es decir las dejamos pasar hambre. Es importante que no perturbemos las abejas durante esas 48 horas, por ejemplo encender la luz demasiado pronto va a provocar que se terminen antes sus reservas de comida y que luego pasen un hambre perjudicial. A veces se recomienda poner un litro de comida al enjambre, pero no es necesario. Si antes de traspasarlas han comido bien y pasan 48 horas sin ser molestadas, esto no es necesario. Las abejas terminan las reservas y luego se lamen entre ellas. Con los lametones se llevan los restos de comida y las esporas de los bacilos que van a parar a sus intestinos donde se destruyen. En esas 48 horas de ayuno las abejas se curan gracias a su sentido de limpieza lamiéndose mutuamente.

La noche del trasiegue cerramos la piquera del alza original de la colmena y rociamos con azufre las abejas en su interior, es decir las matamos. No puede salir ni una abeja, esto es muy importante. Es por eso que hay que hacerlo poco antes de anochecer.

Suponemos que todos los panales están infectados y por eso los enterramos a un metro bajo tierra, los quemamos y volvemos a tapar para que las otras abejas no se acerquen a los restos. Como no sabemos cuánto se ha extendido la loque, recomendamos que los panales que están dentro del alza, los recortemos y los declaremos panales infectados. Después los enviamos a un centro que trabaje con cera.

Limpiamos y rascamos bien el alza de la colmena. Para estar seguro de que no quedan esporas de bacilos quemamos sistemáticamente toda el alza y sus componentes. No debemos olvidar la piquera, la tabla de vuelo y la pared exterior. Para estar seguros que el flambeo es suficiente, pasamos la llama tan lento por la madera hasta que se vaya oscureciendo por el contacto con el fuego. Las herramientas que utilicemos y todo lo que

hayamos tocado con las manos lo flambeamos o lo desinfectamos con un desinfectante fuerte.

Con una llama de gas flambeamos y desinfectamos

Ponemos nuevos cuadros con panales de cera estampada desinfectada.

Cuando ya han pasado 48 horas de la enjambrazón artificial podemos pasar el enjambre a la nueva colmena. Tiene que ser la misma colmena en la que vivía antes la población de abejas, ya que si no se producirá una impredecible estampida de abejas. El enjambre artificial es decir la población anterior, ¡no se olvida de su lugar! El cajón del enjambre no lo vaciamos por completo para lo que haya en el suelo no caiga al cajón nuevo, Tenemos que desinfectar también el cajón del enjambre. Recomendamos lavarse bien las manos después de cada una de estas actividades para evitar la expansión de los bacilos. Tratamos a la población como un enjambre.

Si tenemos varias colmenas tenemos que realizar este trabajo con todas. Si no se puede hacer en un día, se termina en los días siguientes. Esto significa que al menos durante todo un día, no puede haber ninguna abeja de una colmena fuera, ya que solo una abeja puede volver a extender la loque. En este tipo de trabajo hay que tener cierta frialdad y si vemos una sola abeja libre, tenemos que matarla para evitar cualquier riesgo. Si tenemos muchas colmenas vamos a necesitar más que una tarde. En este caso empezamos por la mañana.

Con una espátula limpiamos el cajón

Plaga de gorgojo de trigo y su regulación

El gorgojo de trigo lo encontramos en campos de cereales, panaderías, molinos, silos de alimentación animal e incluso en los armarios de la cocina, en los granos, en el músli o en otros lugares. Este animal come también legumbres, guisantes o frutos secos. Se come el grano y deja solo la cáscara. Deposita sus huevos en las semillas y en cinco o seis semanas aparecen los nuevos escarabajos.

Los gorgojos prefieren los antiguos almacenes de semillas y granos que no son fáciles de limpiar. Le gusta que no se muevan las semillas. Los almacenes con paredes metálicas también favorecen la aparición del escarabajo, ya que por las diferencias de temperatura en las paredes aparecen humedades, y las semillas se ponen rancias, es decir ligeramente mohosas.

Pero también la mala calidad de las semillas favorece la multiplicación del escarabajo. En el pasado hemos repetido que la calidad de las semillas depende en gran parte del momento de la cosecha. El agricultor va a tener en cuenta que en el momento de la cosecha haya suficiente agua. Pero no solo el agua es importante para el momento de la cosecha, sino también la constelación. En las cosechas de semillas recomendamos los días de fruto, o los días de flor como segunda opción. Los días de fruto dan mejor calidad a los granos. Tenemos que evitar los días de hoja, incluso si hay un buen nivel de humedad. Las semillas que cosechamos en días de hojas son muy sensibles a los cambios de temperatura y humedad. Da la impresión que les falta la madurez de la cosecha de los días de fruto y reaccionan ansiosas a la humedad. Esto lo vemos porque desarrollan más fácilmente moho, y por tanto son más susceptibles de ser atacadas por el gorgojo. Un enemigo natural del gorgojo es la avispa (lariophagus distinguendus), que pone sus huevos en las larvas del gorgojo, que terminan muriendo. También les podemos hacer la vida difícil si esparcíamos en los almacenes polvo de diatomea.



Gorgojo del trigo

Recomendamos también las incineraciones para la regulación de este escarabajo. Es el mismo proceso que con la incineración de la varroa. Es mejor si elaboramos bastante cantidad de D8. Echamos la ceniza en el almacén ya limpio y esparcimos la ceniza especialmente en las esquinas y ranuras. Así no le invitamos a pasar al almacén de al lado.

PREDICCIONES METEOROLÓGICAS Y POSICIÓN DE LOS PLANETAS EN EL AÑO -2016-

POR: PABLO SAN MIGUEL HERAS
(Elaboración y Distribución de Preparados Biodinámicos)
Pedidos al TF: 650 306 111 – pablo.sanmiguel@hotmail.es

-Las relaciones entre el Macrocosmos y el Microcosmos del Hombre y de la Naturaleza-

En el concepto antroposófico del hombre se hace alusión en numerosas conferencias de Rudolf Steiner a que el ser humano es un reflejo del Macrocosmos y su cuerpo está constituido de tal manera que los órganos internos representan a nivel microcósmico la actividad de nuestro sistema planetario (Sol-corazón, Júpiter-hígado, Venus-riñones,…) en el exterior las constelaciones tienen su reflejo en las distintas partes del cuerpo, empezando por la Aries-cabeza y terminando en los Piscis-pies.

También descubrimos impresionantes relaciones entre las respiraciones diarias que vienen a ser unas 25920 si partimos de una media de 18 veces por minuto, y los años que tarda el punto vernal del Sol en recorrer los 360º del zodiaco, sabiendo que el Sol tarda 72 años en recorrer un grado, de nuevo aparece la cifra de 25920 años. Por otra parte el corazón late una media de 72 veces por minuto y la vida media del Hombre encarnado sobre la Tierra, viene siendo de 72 años, que es lo que tarda el punto Vernal del Sol en desplazarse un grado.

Los ritmos de la reproducción están regidos por la Luna, así el ciclo menstrual de la mujer aunque se ha emancipado en cierto modo del ciclo exterior de la Luna, conserva interiormente el ritmo de los 28 días que dura el ciclo lunar.

Respecto a los ciclos anuales podemos encontrar relaciones de desarrollo regidos por periodos de siete años, de manera que en la vida de un ser humano podemos observar los tres primeros periodos de 7 años en los que se desarrolla el *Cuerpo*, cada uno de ellos regido por la Luna, Mercurio y Venus. Luego un segundo periodo de desarrollo del *Alma*, de otros tres ciclos de 7 años regidos solo por el Sol, que nos lleva hasta los 42 años, y un tercer periodo de desarrollo del *Espíritu*, de tres ciclos de 7 años regidos por Marte, Júpiter y Saturno, que nos lleva hasta los 63 años de edad. En este mundo materialista regido por el sistema decimal somos muy dados a celebrar los aniversarios múltiplos de 5 o de 10, pero en realidad deberíamos estar más atentos a los múltiplos de 7 años, en los que estamos en relación profunda con los ritmos del cosmos y experimentamos cambios de gran importancia en nuestra vida.

Sin embargo si queremos tener una correcta orientación espacial, el ritmo a observar no ha de ser el del 7 que es el adecuado para orientarnos en el *Tiempo*, para situarnos correctamente en el *Espacio* hemos de tener una distribución regida por el 12. Por este motivo la antigua sabiduría iniciática hizo una distribución espacial de las constelaciones por las que transitaban los planetas, en 12 sectores o signos zodiacales.

En esta ocasión se ha escogido un pequeño párrafo de una conferencia de Rudolf Steiner en 1920, para tratar de llamar la atención del lector hacia la toma de conciencia, de cómo todos los seres y reinos que formamos el Cuerpo de la Tierra, estamos en conexión viva con el Cosmos. Se trata del primer tomo de un libro que contiene 16 conferencias en las que se pone de manifiesto las fuerzas creadoras, que interactúan desde todas las direcciones del Universo sobre la Tierra.

Esto puede ser de gran ayuda también, a la hora de comprender un poco más, el porqué y el cómo de la elaboración de los preparados biodinámicos. El motivo por el que ciertas sustancias y partes de plantas se colocan dentro de envoltorios específicos a modo de piel envolvente, creando un *espacio interior* sobre el que las fuerzas del cosmos pueden transformar esas sustancias en algo *único*, y el por qué ha de ser realizado el proceso en determinados periodos de *tiempo*.

…Ustedes ven que ahí nos damos cuenta de ciertas relaciones entre lo que sucede en el interior del organismo humano y lo que exteriormente existe en el macrocosmos. Ahora bien, ustedes no necesitan más que estudiar lo que pasa con estas fuerzas orgánicas. Estas fuerzas orgánicas ¿cómo se forman pues en el hombre? Estas fuerzas orgánicas se forman de tal manera en el hombre que al seguir de cerca la vida humana mientras se formen los órganos, ciertamente podemos ver con bastante exactitud que la formación de las fuerzas orgánicas está tan relacionada con el ciclo anual como el metabolismo con el transcurso diario. El metabolismo está relacionado con el transcurso diario. Observen al niño a partir de la concepción hasta que, como bien se dice, ve la luz del mundo; pero luego por cierto los órganos siguen desarrollándose especialmente en los primeros meses, de modo que en efecto, como ya dijimos, tenemos que ver con un ciclo anual. Luego tenemos nuevamente un ciclo anual hasta que aparecen los dientes. En síntesis, en la formación de órganos tenemos un ciclo anual. Pero este ciclo anual está en concordancia con las fuerzas de movimiento en el hombre, de un modo similar a como las condiciones de fuerza anuales, las condiciones de fuerza de primavera, verano, otoño, invierno lo están con los movimientos de los planetas. Ahí tenemos que ver absolutamente con algo que en el hombre corresponde otra vez a ciertas condiciones en el macrocosmos. La única forma de estudiar estas cosas es comparando los detalles uno con otro. Hoy sólo puedo señalar a ustedes ciertas relaciones, de lo contrario necesitaríamos mucho tiempo para ello si estudiáramos cada relación en particular. Sin embargo encontrarán esta concordancia cuanto más exactamente observen ciertas relaciones en el hombre que existen ahí en la formación de los órganos, mientras los órganos se formen; una vez terminados, el hombre se arranca, pues, de estas fuerzas. Mirando hacia esto, y viéndolo en conexión con las fuerzas de movimiento, ustedes encontrarán por doquier una relación análoga a lo que sucede en las metamorfosis climáticas anuales en su relación con las fuerzas de movimientos de los planetas. Sólo que se requiere en efecto que uno no parta de que el corazón sea precisamente una bomba, sino que hay que considerar este corazón en cierto modo como una criatura del movimiento sanguíneo. Hay que colocar el corazón dentro del movimiento sanguíneo viviente. De la misma manera sin embargo hay que colocar también el movimiento solar dentro del movimiento planetario. La observación desprejuiciada de las condiciones internas humanas simplemente nos muestra que tenemos que hablar, sí, de una rotación de la Tierra alrededor de su eje mediante la que se genera el movimiento aparente del cielo de las estrellas —lo cual corresponde al movimiento del metabolismo respecto de la configuración exterior humana—, pero que no podemos hablar, si comprendemos el interior humano que está en conexión con el macrocosmos, de una traslación de la Tierra alrededor del Sol en el ciclo anual porque aquello que se mueve en dirección al corazón no lo debemos en absoluto concebir de otra forma que las demás corrientes de movimiento en el hombre. Por eso hay que reconocer que no tenemos que ver con un movimiento de la Tierra alrededor del Sol sobre una elipse, sino que tenemos que ver con un movimiento de la Tierra en el ciclo anual. Éste sin embargo corresponde a un movimiento del Sol, quiere decir que Tierra y Sol se mueven juntos, no que uno gire en torno del otro en el ciclo anual. Sólo por fijarse en la apariencia exterior se llegó a esta traslación de la Tierra alrededor del Sol en el ciclo anual. En realidad, uno tiene que ver con un movimiento de los dos cuerpos celestes que transcurre en el espacio con una determinada conexión entre ambos.

He aquí algo que para el futuro ha de ser esencialmente corregido en la así llamada cosmovisión copernicana. Pero además ha de comprenderse aún de otro modo la conexión del hombre con la naturaleza Macrocósmica….

Extracto de la sexta conferencia de Rudolf Steiner en Dornach, el 18 de abril de 1920
"Correspondencias entre el Microcosmos y el Macrocosmos" Tomo I - Pg. 108 a 110
Publicado por ECE Editorial Científico Espiritual de la Obra de Rudolf Steiner

-PREDICCIONES METEOROLÓGICAS EN RELACIÓN A LOS ASPECTOS PLANETARIOS DE 2016-

-ENERO DE 2016-

Este año también como en 2015, empezamos el año bajo la influencia de la Cuadratura de Urano y Plutón, aunque ya no estarán a 90º exactos hasta dentro de muchos años, aún se encuentran dentro de un orbe de 5º y por lo tanto su influencia aún se notará en los huracanes, el vulcanismo, los terremotos y las crisis socio-económicas, al menos hasta el 2018 o incluso hasta el 2020.
La primera semana puede hacer mal tiempo propio del invierno, debido al Nodo ascendente de Mercurio el día 3, a una Cuadratura de Venus y Neptuno el día 5, otra de Sol y Urano el día 7, a la Conjunción de Sol y Plutón el día 6 y a la proximidad de la Luna Nueva el día 10.
Marte se encuentra en Virgo hasta el día 20 y traerá tiempo muy frío, tiene el apoyo de Júpiter hasta el día 20 y de Mercurio en Capricornio hasta el día 12.
Saturno en Escorpio y Urano en Piscis esperamos que traigan precipitaciones que aumenten las reservas de los acuíferos, Venus en su tránsito por Escorpio les apoya en esa tendencia hasta el día 22, el 13 Venus y Urano forman Trígono-Agua. El Perigeo de la Luna es el día 15 y también contribuye a la formación de borrascas y las precipitaciones. Una Cuadratura del día 20 entre Mercurio y Urano puede ocasionar fuertes temporales.
En la segunda quincena el tiempo mejorará por varios cambios de constelación: el día 12 Mercurio retrógrado, regresa a Sagitario, el día 21 Marte entrará en Libra, ese mismo día Júpiter retrógrado regresa a Leo y el 23 Venus entra en Sagitario junto a Plutón y Mercurio, por lo que se incrementan los impulsos de Luz y Calor y además la Luna Llena es el día 24, lo que favorece la formación de altas presiones y tiempo despejado. Solo el Sol desde el día 19 está en Capricornio por lo que las heladas serán de menor intensidad.
Puede ser un mes muy conflictivo y accidentado, ya que hay Quintiles los días 2, 3, 9, 17, 20 y 25. Se puede observar ya desde el día anterior que los accidentes, atentados y conflictos se incrementan por esos días, por lo que recomendamos mantener la atención y la calma por esas fechas.
La Luna Nueva es el día 10 y la Luna Llena será el día 24, para ver una imagen más precisa de las posiciones de los planetas se pueden ver las cartas 1 y 2 de los días 9 y 23 respectivamente.



Carta 1: 9 de enero de 2016



Carta 2: 23 de enero de 2016

-FEBRERO DE 2016-

Continuaremos durante todo el mes de febrero bajo los efectos de la Cuadratura de Plutón y Urano a 91º, por lo que es muy posible que continúen las tendencias a fuertes temporales en diversas manifestaciones, esto suele ser más intenso en las zonas tropicales, sus fuerzas afectan también al vulcanismo y los terremotos. Los últimos años en nuestro país también hemos padecido durante esta cuadratura, fuertes temporales en las costas que han destrozado rompeolas y paseos marítimos.
En nuestras latitudes sin embargo la influencia de Júpiter en Leo y de Marte en Libra, favorecen la formación de Anticiclones y temperaturas diurnas por encima de lo normal.
El día 6 Júpiter forma Trígono-Calor con Mercurio en su tránsito por la constelación de Sagitario, y el día 10 lo hace también con Venus, serán fechas favorables para la siembras de plantas clasificadas en el grupo de frutos-semillas. La plantación de árboles frutales aunque tardía puede también verse beneficiada por estos impulsos.
La Luna Nueva es el día 8 y el Perigeo del día 11 coincide con el Nodo descendente de Mercurio, el día 14 es el Nodo descendente de Venus, por lo que en esos días hay muchas posibilidades de que el tiempo esté revuelto y se produzcan algunas precipitaciones.
El día 16 el Sol entra en Acuario, junto a Neptuno y ambos apoyan con su impulso luminoso a Marte en su tránsito por Libra.
El 13 Mercurio y el 16 Venus entran en Capricornio, por lo que pueden bajar las temperaturas e intensificarse las heladas si el tiempo está despejado.
Saturno se encuentra en Escorpio constelación del elemento Agua, está a 123º de Urano en Acuario, esto es casi un Trígono-Agua, es muy posible que esas fuerzas favorezcan las precipitaciones y equilibren los impulsos de Luz y calor que quieren predominar desde Libra-Acuario y desde Leo-Sagitario, veremos si en nuestro país lo consiguen o si tendrán que esperar hasta más adelante.
Los Quintiles y sus hermanos menores los Biquintiles, traerán un mes muy conflictivo: el 5, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 28 hay que tener más atención, para evitar accidentes en el manejo de las máquinas y en las relaciones humanas.
La Luna Nueva es el día 8 y la Luna Llena será el día 22, junto a la Luna Llena de enero esta es una de las que mejor se ven brillar durante muchas horas, ya que se encuentra en las constelaciones más visibles del hemisferio Norte.
Ver las cartas 3 y 4 de los días 6 y 20 respectivamente



Carta 3: 6 de febrero de 2016



Carta 4: 20 de febrero de 2016

-MARZO DE 2016-

El día 28 de febrero Marte deja la constelación de Libra y pasa a la de Escorpio, donde se encuentra Saturno, lo que aumenta las fuerzas del Agua. El día 11 el Sol entra en Piscis y el día 17 entrará Mercurio, ambos formarán Trígono-Agua con Marte el día 24 y el día 26. El día 30 Mercurio y Saturno también formarán Trígono-Agua y durante gran parte del mes Urano y Saturno se encuentran a 122º por lo que se puede considerar dentro de un orbe de 3º del efecto del Trígono-Agua. Esperamos que esto ayude a recuperar el caudal de los ríos y las reservas de los pantanos, esto es más probable durante la Semana Santa y después, ya en el mes de abril.
Por otra parte a primeros de mes hay que contar con que Júpiter en fase retrógrada estará en Trígono-Calor con Plutón el día 16 y simultáneamente formará Oposiciones con los planetas que transitan por la región de Acuario, el día 8 con el Sol, el 15 con Mercurio y el 25 con Venus, esto favorece la formación de Anticiclones persistentes y tiempo muy despejado con ausencia de nubes. También son momentos excelentes para realizar plantaciones de árboles y arbustos de todo tipo, que nos recompensarán con un crecimiento vigoroso y buenas cosechas de frutos.
Las abejas se verán favorecidas por una temprana floración que les aporte abundante alimento y fuerzas que impulsen un buen desarrollo de la cría, pronto habrá que ampliarles el espacio de la colmena y renovar los cuadros más viejos.
La Luna Nueva es el día 9, ese día sobre las 3 de la mañana se producirá un eclipse total de Sol no visible en nuestro país, la Luna Llena será el día 23.
Este año la Semana Santa será muy pronto ya que la primera Luna Llena después del 21 de marzo es el miércoles 23 y por lo tanto el Jueves Santo es el 24. Mientras no se decida establecer por política inconsciente una fecha fija para la Semana Santa todos los años, existe la esperanza de que la humanidad comprenda que es una importante fiesta movible, porque depende de ritmos cósmicos, en particular de una relación entre el Sol, la Tierra y la Luna y del paso del Sol por el punto Vernal que marca el inicio de la primavera.
Plutón y Urano siguen dentro de un orbe de 3º del efecto Cuadratura y por consecuencia en las zonas tropicales hay riesgo de fuertes huracanes y tormentas, también los Volcanes pueden ser muy activos en estos periodos. El 18 Marte está en Sesqui-cuadratura (135º) con Urano lo que intensifica las mismas fuerzas de tornados y vendavales.
El día 10 será el Perigeo de la Luna, y el día 31 el Nodo ascendente de Mercurio cuyo efecto dura hasta el día 1 de abril, el tiempo puede estar más revuelto por esas fechas, al igual que en Viernes Santo el día 25, en estos días hay que evitar realizar cualquier siembra, laboreo del suelo o trabajos con las plantas, que introducirían un impulso perjudicial para su desarrollo.
Hay cinco Quintiles alguno menos que el mes pasado, son el 4, 7, 11, 19, y 21, por eso esperemos que no haya muchos accidentes y conflictos en marzo.
Ver las Cartas 5 y 6 de los días 5 y 19 de marzo respectivamente.



Carta 5: 5 de marzo de 2016



Carta 6: 19 de marzo de 2016

También este mes se producen de forma simultánea Trígonos-Calor, Trígonos-Agua y Oposiciones Luz-Calor, esta combinación de fuerzas cósmicas esperemos que favorezca un desarrollo equilibrado y armonioso en las plantas.
En primer lugar podemos ver que Júpiter continúa en fase retrógrada en la constelación de Leo, lo que por un lado le distancia de la formación de Trígono-Calor con Plutón, pasará de los 123º, pero por otra parte, le acerca a la Oposición más precisa con Neptuno a 182º. Mercurio el día 5 entra en Aries y el día 14 formará Trígono-Calor con Júpiter y el 17 con Plutón. Son impulsos muy favorables para el desarrollo de plantas de flor, fruto y semilla, pero sin embargo habrá que ser muy cuidadoso y evitarlos en las siembras de raíces y hojas o de lo contrario se espigarán rápidamente y no serán productivas en el ámbito que nos interesan como alimento.
Como contrapeso de los impulsos de Luz y Calor, tenemos a Marte y a Saturno en Escorpio que intensifican el elemento Agua con el apoyo de los planetas que transitan por Piscis como Urano, el Sol y Venus. Se forman Varios Trígonos-Agua, el día 5 del Sol con Saturno, el día 12 de Venus con Marte y el día 18 de Venus con Saturno. Esto además de favorecer las lluvias es muy interesante aprovecharlo para realizar las siembras de hojas como acelgas, lechugas, repollos, etc. Los que tendrán menos tendencia al espigado prematuro. Hay que seguir las indicaciones de la hoja de siembras con sumo cuidado, pues algunos de estos trígonos coinciden con periodos de raya por nodos que han de ser evitados, o corremos el riesgo de que los cultivos sean atacados luego por hongos y otras plagas.
Hay varios días con mayor tendencia a mal tiempo, o bueno, según se mire si uno desea la lluvia que riega los cultivos. El día 1 por el Nodo ascendente de Mercurio, el día 6 por una Cuadratura del Sol con Plutón, el día 7 por el Perigeo de la Luna, el 19 por otra Cuadratura entre Venus y Plutón y del 27 al 29 por el Nodo descendente de Marte, además Mercurio entrará el día 26 en Tauro y favorece durante una semana la formación de tormentas primaverales.
Puede ser un mes muy conflictivo pues hay muchos Quintiles y Bi-quintiles, el 1, 5, 7, 10, 11, 21, 22, 26 y 29 en los que hay que estar muy despierto y atento con el manejo de máquinas. Júpiter y Urano están muy cerca de la formación de Bi-quintil, en un orbe de 3º y como se desplazan muy lentamente sus efectos se pueden prolongar más de un mes.
La Luna Nueva es el día 7 y la Luna Llena el día 22.
Vean las cartas 7 y 8 del 9 y el 23 respectivamente.



Carta 7: 9 de abril de 2016



Carta 8: 23 de abril de 2016

-MAYO DE 2016-

Mercurio que entró en la constelación de Tauro el día 26 de abril, al estar en fase retrógrada regresa el día 3 a Aries, y eso marcará el clima del mes con el impulso calórico. En Aries también se encuentra Venus desde el 29 de abril hasta el 19 de mayo, y el Sol hasta el día 14. Como también hay planetas en las otras constelaciones de Fuego, (como Júpiter que sigue en Leo y Plutón en Sagitario), se Van a formar seis Trígonos-Calor a lo largo del mes, los días 3, 7, 10, 13, 14 y 31. Son impulsos excelentes para realizar siembras y plantaciones de hortalizas del grupo de fruto, pero hay que evitarlas en los otros grupos de plantas si no queremos que haya un espigado prematuro. Por otra parte puede haber temperaturas más altas de lo conveniente en los cultivos de secano, ya que en zonas de llanuras extensas, pueden predominar las fuerzas de Luz y Calor en un momento muy delicado para el crecimiento y desarrollo de los cereales, por ejemplo.
A este impulso también contribuye con su apoyo la Oposición entre Júpiter y Neptuno, en realidad se encuentran a 182º, pero dentro del orbe de 3º de los 180º, así estarán todo el mes por lo que las fuerzas de Luz y Calor crearán grandes zonas de altas presiones persistentes.
Los días con más posibilidades de lluvias serán los que aparecen marcados con raya en la hoja de siembras, como el día 6 que coincide el Perigeo con la Luna Nueva, y el 8 y el 9 por el Nodo descendente de Mercurio. También pueden contar con un apoyo importante en este sentido del elemento Agua de parte de Marte y Saturno, que se encuentran en Escorpio y además ambos en fase retrógrada, lo que intensifica el impuso de esta constelación que puede favorecer las lluvias, sobre todo a final de mes cuando Venus y el Sol les apoyen con el elemento Tierra a su paso por la constelación de Tauro.
Este mes no hay Cuadraturas que puedan favorecer la formación de tormentas, pero si hay algunos hermanos menores las Sesquicuadraturas, los días 5, 22 y 26, ya se verá si consiguen traer algunas precipitaciones.
Lo más probable es que esta primavera sea en general más calurosa de lo normal, lo que hará que muchas frutas y cultivos maduren antes de lo normal y en algunos casos se pueden ver mermadas las cosechas de cereales, aunque como ya se ha comentado cabe la esperanza de que Escorpio proporcione el agua suficiente para el secano.
Este mes hay tres posiciones conflictivas de Quintiles y Bi-quintiles el 1, 19 y 30.
La Luna Nueva será el día 6 y la Luna Llena el día 21.
Ver las cartas 9 y 10 de los días 7 y 21 respectivamente.



Carta 9: 7 de mayo de 2016



Carta 10: 21 de mayo de 2016

-JUNIO DE 2016-

Empieza el mes con dos Cuadraturas importantes de Neptuno, que además coinciden con la proximidad de la Luna Nueva el día 5 y con el Perigeo el día 3, por lo que hay muchas posibilidades de que se formen tormentas por esos días, ya que además los días 6 y 7 tenemos el efecto del Nodo ascendente de Venus, esperemos que ese año no sean tormentas de granizo tan dañinas como las del año pasado.
Saturno en Escorpio también estará en Cuadratura con Neptuno en Acuario el día 18, ya veremos qué tipo de fuerzas se manifiestan en este caso, ya que es algo que suele ocurrir cada 15 o 20 años aproximadamente y además en trasfondos zodiacales diferentes.
El día 8 Mercurio en avance regresa a la constelación de Tauro junto a Venus y al Sol, y con el apoyo de Saturno en Escorpio y de Urano en Piscis puede traer tormentas la primera mitad del mes, sin embargo no contará con la ayuda de Marte, ya que sigue en fase retrógrada y el día 6 regresa a la constelación luminosa de Libra, desde la que incrementa las fuerzas de Luz.
En la segunda quincena parece que vuelven a ser predominantes las fuerzas de Luz y Calor, pues de nuevo Júpiter se encuentra a 120º de Plutón en Trígono que será duradero y que es del elemento Fuego, exactamente ocurre el día 26, pero su efecto se puede prolongar al menos dos semanas. Venus también entra en Géminis el día 17 y el Sol lo hace el día 21, lo que incrementará las fuerzas de Luz en los días más largos del año en nuestro hemisferio norte, además el día 27 Venus forma Trígono-Luz con Neptuno, aunque al día siguiente tenemos los efectos del Nodo ascendente de Mercurio, es posible que en esta ocasión no llegue a manifestarse el tiempo muy revuelto.
No obstante en las zonas de montaña es posible que los cuatro últimos días del mes el tiempo de nuevo esté más revuelto y tormentoso, tanto por el efecto del mencionado Nodo, como por el Perigeo de la Luna que será el día 1 de Julio.
Este mes hay numerosos Quintiles y Bi-quintiles el 1, 2, 7, 8, 17, 19, 20, 21, 22, 25, y 29 en los que hay que mantener la atención más despierta en el manejo de máquinas o herramientas, para evitar graves accidentes y situaciones de conflicto.
La Luna Nueva es el día 5 y la Luna Llena el día 20.
Ver las cartas 11 y 12 de los días 4 y 18 respectivamente.



Carta 11: 4 de junio de 2016



Carta 12: 18 de junio de 2016

-JULIO DE 2016-

Aunque con diferentes posiciones planetarias a las que hubo en julio de 2015 en que padecimos sucesivas olas de calor, este año también hay un gran predominio de las fuerzas de Luz y de Calor.
Júpiter al igual que el año anterior continúa en Leo, pero además este año muy cerca del Trígono-Calor con Plutón en Sagitario, es decir dentro de un orbe de 3º. Sin embargo Marte no está en Géminis como en 2015, pero su impulso luminoso si cabe es más intenso, porque se encuentra en Libra y se formarán cinco Trígonos-Luz con Venus, Sol y Mercurio en su tránsito por la constelación de Géminis, éstos a su vez también forman Trígono-Luz con Neptuno en Acuario. Esto ocurrirá los días 3, 5, 6, 11 y 17. Este tipo de fuerzas incrementan los anticiclones persistentes, el tiempo muy luminoso y despejado, suele ser seco y son raras las precipitaciones durante el tiempo que dura la manifestación de estas fuerzas.
A esto hay que sumar que a la vez se forman Oposiciones de los Planetas que pasan por Géminis con Plutón en Sagitario, también están cerca de una Oposición de similares características Júpiter y Neptuno, en ambos casos con un trasfondo zodiacal de Luz y Calor.
Por lo tanto no sería nada raro que de nuevo tengamos que padecer oleadas de calor tan intensas como en el verano del 2015. Este mes no hay ningún planeta en constelaciones de Tierra que ayude a refrescar un poco el ambiente y al menos baje las temperaturas por las noches.
En la segunda quincena Venus, Mercurio y el Sol entrarán en la constelación de Cáncer, se forman dos Trígonos-Agua con Saturno en Escorpio los días 19 y 20, coincidiendo con la Luna Llena, será difícil que esto traiga precipitaciones y de hacerlo sería en las zonas del Norte Cantábrico y Pirineos, el año pasado durante las posiciones de Perigeo lunar se formaron algunas tormentas, que debido a los fuertes contrastes de calor y frío entre las capas altas y bajas de la atmósfera, fueron en muchos casos de pedriscos muy dañinos. En Julio tenemos dos Perigeos, el día 1 y el día 27, ya veremos si en este año ocurre algo parecido. Cuando la Luna se acerca al máximo posible a la Tierra, se produce una tensión electromagnética, el aire se siente agitado se muestra tempestuoso, el calor es de bochorno desagradable, los insectos se ponen muy molestos, algunas personas sensibles se encuentran mal en esos días y finalmente esa tensión se descarga en forma de tormentas, en algunas ocasiones hubo terremotos y erupciones volcánicas, si además coincide con Cuadraturas o Quintiles. En este caso hay dos Cuadraturas de Urano los días 11 y 16. Saturno y Urano están todo el mes dentro de del orbe de una Sesquicuadratura cerca de los 135º, su efecto es menor que la Cuadratura, pero de las mismas características.
En cuanto a Quintiles y Bi-quintiles también este mes hay muchos el 1, 2, 7, 8, 9, 17, 25, 28 y 29 en años anteriores, solo se hacía mención de los Quintiles (72º), pero en los últimos años hemos observado que también hay muchos accidentes y conflictos en los días de Biquintil a 144º (72º+72º).
La Luna Nueva es el día 4 y la Luna Llena es el 20.
Ver las Cartas 13 y 14 de los días 9 y 23 respectivamente.



Carta 13: 9 de julio de 2016



Carta 14: 23 de julio de 2016

-AGOSTO DE 2016-

Hay cambios muy relevantes en este mes que se irán apreciando de forma progresiva según avancen los días. Para empezar a finales de julio, Marte regresó de nuevo a Escorpio, además el día 1 el Sol y Saturno están en Trígono-Agua, como es la Luna Nueva el día 2 y hay un Nodo descendente de Mercurio el día 5, hay muchas posibilidades de que el mes empiece con precipitaciones.
Aunque aún continuará haciendo calor, porque Mercurio, Venus y desde el día 11 el Sol pasan por la región veraniega de Leo y forman Trígonos-Calor con Plutón en Sagitario los días 11 y 18 y a su vez están en Oposición Luz-Calor con Neptuno en Acuario los días 7 y 14, por lo que es muy probable que entre el 7 y el 18 predomine el buen tiempo en general al coincidir la Luna Llena por esas fechas el tiempo anticiclónico y despejado se verá reforzado.
Júpiter entra en Virgo el día 6, Mercurio el día 19 y Venus el día 25. Las fuerzas que expresa esta constelación son otoñales, por lo que a medida que avance el mes veremos que las noches se van haciendo más frías, se anticipará el otoño y los efectos de la gota fría en las costas del Mediterráneo ya se pueden empezar a manifestar en la segunda quincena, en particular los días 21 y 22 por el Perigeo de la Luna y el 26 por la Cuadratura de Marte y Neptuno.
Saturno y Neptuno están todo el mes a 91º, dentro del orbe del efecto Cuadratura, por lo que en las zonas tropicales puede haber grandes temporales este mes e incluso terremotos en las regiones más sísmicas, ambos son planetas lentos y sus relaciones angulares duran varios meses, julio, agosto, septiembre, octubre,… ya se verá hasta cuando dura y con qué intensidad se manifiesta.
Hay otras Sesquicuadraturas (135º) de efecto más débil que las Cuadraturas el 6, 13 y 22 que pueden traer también tendencia a tormentas, será a final de mes cuando más se aprecien sus efectos meteorológicos, al intensificarse las fuerzas de Tierra y Agua en detrimento de las de Luz y Calor.
Las posiciones conflictivas de Quintil y Biquintil son el 4, 13, 20, 25, 29 y 31.
La Luna Nueva es el día 2 y la Luna Llena el día 18.
Ver las cartas 15 y 16 de los días 6 y 20 respectivamente:



Carta 15: 6 de agosto de 2016



Carta 16: 20 de agosto de 2016

-SEPTIEMBRE DE 2016-

Comienza septiembre con la Luna Nueva, Venus, Júpiter y Mercurio en la constelación Otoñal de Virgo y además Mercurio comenzó su fase retrógrada el día 30 de agosto por lo que se intensifican las fuerzas del elemento Tierra en los primeros días.
Marte y Saturno continúan en Escorpio y favorecen las precipitaciones, al menos en momentos en que son apoyados por cuadraturas de los planetas lejanos.
La Cuadratura exacta entre Saturno y Neptuno sucederá el día 10 y el día 11 hay otra de más corta duración entre Venus y Plutón, por esos días los temporales en zonas tropicales pueden ser muy fuertes.
El día 2 el Sol en Leo está en Oposición con Neptuno en Acuario, lo que intensifica las fuerzas de Luz y Calor con efectos opuestos a los antes mencionados, en estos casos las zonas de altas y bajas presiones se acercan mucho y se establecen algo así como fronteras climáticas, y en zonas cercanas relativamente, se producen anticiclones y no muy lejos de estos hace mal tiempo.
El Día 7 hay un Trígono-Calor entre el Sol y Plutón, sus fuerzas serán muy favorables para una buena maduración de las cosechas de otoño, luego el día 16 el Sol entra en Virgo y dará un impulso hacia el otoño, pero por otra parte será contrarrestado por Mercurio que el día 10 regresa a Leo y llega a situarse en Trígono-Calor con Plutón los días 21 y 23. Serán los últimos Trígonos de este tipo que habrá este año, sus fuerzas madurativas del elemento fuego se irán debilitando con la llegada del otoño, pero darán muy buena calidad a las últimas cosechas del año.
Las fuerzas de Tierra y Agua también se van a manifestar simultáneamente a las de Luz y Calor, el día 17 Marte y Urano están en Trígono-Agua, por lo que el tiempo se puede manifestar muy cambiante de un día para otro, el 18 será el perigeo, dos días después de la Luna Llena, luego vienen los Trígonos de Calor el 21 y 23 y de nuevo tendencia a mal tiempo el 24 por el Nodo ascendente de Mercurio y el 26 por el nodo descendente de Venus.
El día 25 Marte entrará en Sagitario, ya veremos si eso nos trae un pequeño veranillo durante el próximo mes de octubre o si se equilibran las fuerzas de Tierra de la constelación de Virgo y nos traen unas temperaturas suaves y agradables. Si hay suficiente humedad en el suelo será un buen año para la recogida de setas en los bosques.
Los días conflictivos DC serán el 3, 16, 21, 24, 26 y 27.
La Luna Nueva es el día 1 y La Luna Llena el 16.
Ver las cartas 17 y 18 de los días 10 y 24 respectivamente:



Carta 17: 10 de septiembre de 2016



Carta 18: 24 de septiembre de 2016

-OCTUBRE DE 2016-

El día 1 Venus entra en la constelación de Libra hasta el día 16, ambos son muy afines pues se expresan muy bien en el elemento Luz y además el 1 se forma Trígono-Luz con Neptuno en Acuario, cuentan con el apoyo de Marte y Plutón en Sagitario, lo que puede traer algunos días en que durante el día tengamos temperaturas muy agradables y días luminosos, que se alternarán con días cada vez más otoñales.
Las fuerzas otoñales llegarán desde la constelación de Virgo, Mercurio entrará el día 3 en esa región junto a Júpiter y al Sol, por lo que las noches ya serán muy frías y las heladas irán cambiando el color de las hojas, las nieblas en zonas de montaña, son otra de las manifestaciones de las fuerzas de Virgo. Cuentan con el apoyo de las fuerzas de Escorpio en la que continúa Saturno y Venus desde el día 16, por lo que en la segunda quincena serán más intensas las fuerzas de Tierra y Agua que las de Luz y Calor.
Este mes hay cuatro Cuadraturas, el día 7 y 16 de Plutón, el día 26 de Neptuno y el 29 de Urano, son días en que hay muchas posibilidades de precipitaciones y de grandes temporales en zonas tropicales. El Perigeo de la Luna será el 17 lo que también traerá mal tiempo, y aunque coincide con la Luna Llena que suele traer días despejados, es posible que en este caso no sea así.
Hay dos Lunas Nuevas este mes, el día 1 y el día 30 en ambos casos coinciden con Trígonos-Luz, por una parte la Luna Nueva tiende a las bajas presiones y los Trígonos-luz a las altas presiones, si dominan unas u otras dependerá de las zonas en que nos encontremos, pero en general parece que hay muchas fuerzas de Tierra y Agua, por lo que la balanza se inclinará en nuestras latitudes hacia las bajas presiones, las nieblas y las fuerzas otoñales no demasiado frías aún, predominarán.
Los Quintiles este mes son los días 7, 8, 16, 17, y el 26. Son periodos de gran conflictividad y riesgo de accidentes de todo tipo, que se pueden manifestar desde uno o dos días antes y después.
Hay Luna Nueva los días 1 y 30, y Luna Llena el día 16.
Ver las cartas 19 y 20 de los días 8 y 22 respectivamente:



Carta19: 8 de octubre 2016



Carta 20: 22 de octubre 2016

-NOVIEMBRE DE 2016-

Noviembre será un mes cada vez más otoñal, incluso se puede decir que invernal, cada vez se intensificarán más las fuerzas de Tierra y Agua a medida que avance el mes.
Mercurio y el Sol entran en la región de Libra, ambos forman Trígono-Luz con Neptuno en Acuario, pero dado que coincide con la Luna Nueva y el Nodo descendente de Mercurio, es muy probable que encuentren muchas dificultades para expresar sus fuerzas luminosas.
El día 5 Venus forma Trígono-Agua con Urano en Piscis lo que también favorece las precipitaciones y otras formas de manifestación de este elemento en lo meteorológico.
El día 7 Marte deja la constelación de Sagitario, en la que favorecía el elemento Fuego y por tanto unas temperaturas cálidas, para entrar en Capricornio, ésta es una constelación que activa las fuerzas invernales, por lo que ya nevará en muchas zonas de montaña y en general bajarán mucho las temperaturas
La Luna Llena coincide con el Perigeo el día 14, por lo que tendremos mareas muy altas y fuerte oleaje en las zonas costeras, si hay muchas precipitaciones, puede haber desbordamientos de ríos.
En la segunda quincena se van a intensificar aún más las fuerzas de Tierra y Agua por varias causas: el día 11 Mercurio entra en Escorpio con Saturno y el día 26 forma Trígono-Agua con Urano. El día 19 el Sol también entra en Escorpio por lo que habrá cuatro planetas en constelaciones de Agua.
Júpiter y Plutón están en Cuadratura el día 24, pero como son planetas de desplazamiento lento, estarán más de un mes en un orbe de 3º, por lo que el efecto de esta Cuadratura se dejará sentir desde finales de octubre hasta mediados de diciembre, tanto en el mal tiempo como en el vulcanismo o en temporales en las zonas tropicales. Otras dos Cuadraturas más traerán mal tiempo, el día 18 un a de Neptuno y el Día 29 otra de Urano, esta última coincide además con la Luna Nueva, lo que puede hacer de este mes uno de los más lluviosos del año.
Tan solo Plutón y Venus desde el día 11 están en una constelación de Calor, pero en esta época del año su efecto puede aumentar las precipitaciones en forma de lluvia y evitar heladas nocturnas.
La Luna Llena es el día 14 y la Luna Nueva el día 29.
Los días conflictivos DC de Quintil y Biquintil serán el 1, 7, 11, 12, 19, 21, 22 y 30.
Ver las cartas 21 y 22 de los días 5 y 19 de noviembre respectivamente.



Carta 21: 5 de noviembre de 2016



Carta 22: 19 de noviembre de 2016

-DICIEMBRE DE 2016-

Las fuerzas invernales se van a intensificar aún más en diciembre, lo que en cierta lógica estacional es normal, ya que nos acercamos al invierno en el Hemisferio Norte, aunque no siempre esa lógica acompaña al transcurrir del tiempo estacional, pero en este caso sí será así.
El día 2 Marte y Júpiter forman Trígono-Frío, por lo que ya puede haber importantes nevadas en muchas zonas de nuestro hemisferio, puede que ya comiencen algunas olas de frío. Luego el día 15 Marte deja la fría región de Capricornio para entrar en Acuario, más luminoso, pero también muy frío en esta época del año, las heladas serán más intensas con el paso de los días cada vez más cortos en horas de sol. Además el Sol y Neptuno están en Cuadratura el día 1. Desde el día 6 hasta el día 30 Venus transita por la región invernal de Capricornio, por lo que aunque Marte la deja el día 15, seguirán llegando sus fuerzas a través de Venus el resto del mes.
El día 12 hay Trígono-Agua del Sol y Urano y el día 25 de Saturno y Urano, este último al ser entre planetas muy lentos se encontrará dentro del orbe de 3º durante todo el mes y además en Navidad coincide con otro Trígono-Frío entre Venus y Júpiter. Esta combinación de fuerzas intensificadas de Tierra y Agua puede traer grandes nevadas en el periodo Navideño hasta el final del año.
El día 13 es el Perigeo de la Luna, por segundo mes consecutivo coincide con la Luna Llena, y seguramente con mucha humedad por lo que entrarán fuerzas lunares en exceso en el suelo y luego en primavera las plantas son atacadas por hongos, para prevenirlo hay que aplicar sobre el suelo el preparado 508 de Cola de Caballo, preferiblemente la semana antes de cada Luna llena durante todo el periodo de otoño e invierno. El día 20 también hará mal tiempo por el Nodo ascendente de Mercurio.
Júpiter y Urano estarán casi todo el mes en una Oposición con trasfondo zodiacal de los elementos Tierra y Agua, según María Thun en este caso lo que ocurría, es un aumento notable en el caudal de los manantiales que afluyen desde el interior de la Tierra.
El día 2 Mercurio entrará en Sagitario y realizará su fase retrógrada ante esta constelación desde el día 19, esto intensifica las fuerzas de Calor, pero en esta época del año esas fuerzas se suelen manifestar en forma de precipitaciones, al menos en años anteriores con circunstancias parecidas así se ha observado. En cierto modo será un contrapeso que equilibre la balanza en la que hay un claro predominio de fuerzas de Tierra y Agua.
La Luna Llena es el día 14 y la Luna Nueva el 29.
Solo hay Quintiles este mes los días 2, 15, 19, 22 y 23, esperemos que el mal tiempo no aumente el riesgo de accidentes.
Ver las cartas 23 y 24 del 10 y del 24 de diciembre respectivamente.



Carta 23: 10 de diciembre 2016



Carta 24: 24 de diciembre de 2016

En el calendario de 2015 se publicó un folleto informativo que está colgado en la web de la Asociación en formato pdf y que se puede descargar en el siguiente enlace:
El impulso de Steiner para la agricultura.

Recomendaciones bibliográficas

1. Curso de agricultura biológico-dinámica, Rudolf Steiner GA 327 Ed. R.S.
2. Sobre las abejas, Rudolf Steiner GA 351
3. Die Biene, Haltung und Pflege (La abeja, conducta y cuidados), Matthias K. Thun.
4. El control de las plagas. María Thun. 88 páginas Ed. Rudolf Steiner, Madrid.
5. Constelaciones y agricultura biodinámica, María Thun.
6. Kosmologische und Evolutionsaspekte (Cosmología y aspectos evolutivos). Para los cálculos astronómicos sirvieron las efemérides Raphael´s astromical Ephemeris of the Planet for 2013, Londres, así como la experiencia adquirida en los ensayos.
7. La elaboración y empleo de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. Scheibe, H. Heilmann.
8. Las acciones de los planetas y los procesos vitales en el ser humano y en la tierra. B.C.J. Lievegoed.
9. Sembrar plantar y recolectar en armonía con el cosmos. María Thun. Ed. R.S.
10. ¿Qué es la agricultura biodinámica? Herbert Koepf. Ed. R.S.
11. La granja y el huerto biodinámicos (Tierra y pan). Kjell Arman. Ed. R.S.
12. La fertilidad de la tierra, su conservación y renovación. Ehrenfried Pfeiffer. Ed. Antroposófica. 388 pág. Disponible en Ed. R.S.
13. Cultivar en armonía con la Luna y el Cielo. Xavier Florín. Ed. Susaeta.

Asociación de Agricultura Biodinámica de España

Se fundó el 28 de abril de 1981 en Canarias. Allí el 19 de febrero de 1987 volvió a fundarse con ámbito nacional. Sus fines son promover, guiar y proteger el método agrícola biodinámico, sus prácticas y principios. Para ello, la Asociación apoya las publicaciones y la comunicación, el asesoramiento, conferencias, cursillos, reuniones con los grupos regionales, el suministro de los preparados, etc.

Ser miembro de la Asociación está abierto a cualquier persona con interés en promocionar actividades como las mencionadas. La cuota anual es de xxx euros. Los miembros reciben descuentos en cursos.

Los Preparados Biodinámicos.

Solicitud de preparados biodinámicos en España.

Caja de preparados para el compost

Compost inoculado con preparados biodinámicos

LA ACCIÓN DE LOS PLANETAS EN LOS CULTIVOS Y EN EL HOMBRE


CURSO DE ASTRONOMIA
ANTROPOSÓFICA

CURSO SOBRE AGRICULTURA BIODINÁMICA

ELABORACIÓN Y EMPLEO DE PREPARADOS BIODINÁMICOS

MARIA THUN
EL CONTROL DE LAS PLAGAS

La Fertilidad de la tierra

plantas para curar plantas

CURSO DE ZOOLOGÍA

biodinámica: guía práctica

Matthias K. Thun
LA ABEJA
CONDUCTA Y CUIDADOS

Apicultura respetuosa con las abejas


María Thun
Sembrar, plantar y recolectar en armonía con el Cosmos

En esta quincuagésima cuarta edición del calendario de Maria Thun® continuamos el trabajo comenzado en el calendario del año anterior y presentamos diferentes molinos y hornos. Mencionamos también los que han resultado ser los mejores en nuestros ensayos de horneo.

Dedicamos un espacio al gorgojo de trigo y su regulación. En el año 2015 pudimos asistir al último eclipse solar que habrá durante años y comentamos otras constelaciones interesantes.

Los apicultores podrán consultar las posibilidades de reducir las plagas de varroa y loque americana.

Incluimos las recomendaciones para los horticultores, jardineros, agricultores y viticultores. Deseamos mucho éxito a los lectores con este calendario de Maria Thun®.

ISBN: 978-84-92843-60-2

9 788492 843602

Editorial Rudolf Steiner